OBSERVACIONES DEL PÁGALO DEL POLO SUR (*CATHARACTA MACCORMICKI*) EN EL CARIBE COLOMBIANO

Observations of the South Polar Skua (*Catharacta maccormicki*) on the Caribbean coast of Colombia

Felipe A. Estela

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR

Asociación para el Estudio y Conservación de las Aves Acuáticas en Colombia - Calidris. Carrera 24 F Oeste # 3-25, Cali, Colombia.

Correo Electrónico: faestela@telesat.com.co

ABSTRACT

Four recent observations of the South Polar Skua (*Catharacta maccormicki*) on the Caribbean coast of Colombia are presented, and the field identification of the members of the genus *Catharacta* is discussed.

Key Words: *Catharacta maccormicki*, Colombia, distribution, identification, South Polar Skua

RESUMEN

Se presentan cuatro observaciones recientes del Págallo del Polo Sur (*Catharacta maccormicki*) en la costa del Caribe en Colombia, y se discute la identificación en el campo de los miembros del género *Catharacta*.

Palabras clave: *Catharacta maccormicki*, Colombia, distribución, identificación, Págallo del Polo Sur

Los págalos o salteadores (Aves: Stercorariidae) son aves marinas poco conocidas en Colombia y en general en zonas tropicales. Su identificación es compleja, ya que presentan varias fases de coloración y en muchos casos pueden ser confundidos con juveniles de gaviotas. En las costas de Colombia se han registrado cuatro especies de págalos: *Catharacta skua*, *Stercorarius pomarinus*, *S. parasiticus* y *S. longicaudus* (Hilty & Brown 1986). Recientemente se ha documentado con ejemplares de museo, la presencia de las tres especies del género *Stercorarius* (Ortiz-von Halle 1990; Estela et al. 2004), registradas previamente de manera visual. Con seguridad la identificación de estas aves representa una de las mayores dificultades a que se puede enfrentar un ornitólogo en ambientes marinos, por lo cual es muy importante tomar la mayor cantidad posible de detalles del plumaje y tamaño de las aves observadas.

Hilty & Brown (1986) consideran que *C. skua* ocurre en las costas de Colombia, pero hacen la salvedad que la forma más probable es *maccormicki*, basándose en la distribución conocida para cada forma, y sin darle el estatus de especie por ser lo aceptado en su época. La taxonomía del género *Catharacta* es compleja (Devillers 1977; Olsen & Larsson 1997). Anteriormente se reconocía una única especie, el Págallo Grande (*Catharacta skua*), la cual contenía cuatro subespecies: *C. s. skua*, *C. s. maccormicki*, *C. s. chilensis* y *C. s. antarctica*. En la actualidad y teniendo en cuenta las revisiones sistemáticas del género se considera que las cuatro formas anteriores tienen estatus de especies válidas (Furness 1996; Olsen & Larsson 1997). También existe la controversia sobre la validez del género e incluir todas sus especies dentro

de *Stercorarius*, lo cual es seguido por ejemplo por Remsen et al. (2004).

Catharacta skua es la especie más grande del género; su plumaje es café oscuro con abundantes flecos pálidos de gris o ante en todo el cuerpo. Se encuentra en el Océano Atlántico, generalmente en el hemisferio norte (Olsen & Larsson, 1996) y en el Caribe en Puerto Rico, Belice, Cuba y algunas Antillas menores (Raffaele et al. 1998), además de Guyana y Guyana Francesa (Stotz et al. 1996) y Surinam y las Antillas Holandesas (Rodner et al. 2001). De *C. skua* existen registros visuales en La Guajira y Cartagena para la costa Caribe y la bahía de Buenaventura en la costa Pacífica (Estela et al. 2004). Infortunadamente la presencia de esta especie no está documentada con ejemplares de museo.

Catharacta maccormicki es más pequeño que la anterior especie, tiene fases de coloración oscura y clara, y por lo general presenta la cabeza, nuca y partes ventrales café claro con tonos de anteoado grisáceo a vináceo, contrastante con el dorso y las alas más oscuras; es más uniforme en coloración, con pocos flecos pálidos en comparación con *C. skua*. También presenta variación de tamaño, relacionado al sexo y a la coloración (Ainley et al. 1985). Se encuentra en todos los océanos (Olsen & Larsson, 1996), en el Caribe se encuentra reportado en la mayoría de Antillas (Raffaele et al. 1998), Trinidad y Tobago, México (Stotz et al. 1996), Panamá (Ridgely & Gwyne 1989), Costa Rica (Stiles & Skutch 1989) y en la pequeña franja de la península de La Guajira que corresponde a Venezuela, hacia el interior del golfo de Maracaibo (Hilty, 2002).

En general *maccormicki* se diferencia de las otras especies en que dorsalmente la cabeza es más clara que la espalda, incluso en los individuos más oscuros, y ventralmente el plumaje no presenta contrastes. De las otras dos formas del hemisferio sur, *antarctica* se asemeja a los individuos más oscuros de *maccormicki* pero tiene la coronilla notoriamente más oscura que el resto del plumaje y con abundantes flecos blanquecinos o anteados en el dorso, el cuello y a veces en el pecho y abdomen. *C. chilensis* tiene tonos rojizos o canela en el plumaje, especialmente por debajo, y la coronilla es notablemente más oscura que el resto del cuerpo. Uno de los caracteres más importantes para diferenciar estas especies es el tamaño de las manchas blancas en las primarias, lo cual es muy útil en ejemplares de colección pero en campo es de difícil determinación; en general estas manchas son más extensas en *maccormicki* y más pequeñas en *chilensis*.

En esta nota presento cuatro observaciones de págalos en la costa Caribe colombiana durante el año 2001, que corresponden al plumaje de *C. maccormicki*. Estas observaciones fueron hechas en la bahía de Cispata, zona estuarina del río Sinú, en el departamento de Córdoba.

PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN ANTERO, 25 febrero de 2001: Un individuo en un espolón rocoso, observando un grupo de 35 gaviotines (*Sterna maxima* y *Sterna caspia*) que se encontraban posados en los pilotes de un antiguo muelle derruido. El págalo acosaba continuamente a los gaviotines que llegaban al muelle, tratando de robarles el alimento que traían.

EL MISMO SITIO, 16 marzo de 2001: Un págalo posado frente a un grupo de 28 gaviotines (*Sterna sandvicensis* y *S. maxima*). Durante una hora atacó a tres gaviotines cuando llegaban al muelle.

CIÉNAGA MESTIZOS, MUNICIPIO DE SAN ANTERO, 18 marzo de 2001: Un págalo posado en árboles muertos de mangle, junto a un grupo de pelícanos (*Pelecanus occidentalis*), fragatas (*Fregata magnificens*) y gaviotines (*S. maxima* y *S. sandvicensis*).

TINAJONES MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DE VIENTO, 3 abril de 2001: A 100 m de la costa observé, desde una lancha a menos de siete metros, durante dos minutos un págalo acosando un gaviotín (*S. maxima*), hasta que el gaviotín soltó un pequeño pez. Posteriormente el págalo atacó otros gaviotines que pasaban por esta zona.

Los págalos observados presentaban la nuca y la cabeza mucho más clara que el resto del cuerpo. En general eran aves café uniforme no muy oscuro con la cabeza café claro, casi ante muy contrastante con el resto del cuerpo, y en la coronilla se presentaban algunos visos grisáceos, pero en ningún caso una "gorra" oscura como tienen *C. antarctica* y *chilensis*. Esta coloración es propia de *C. maccormicki*,

ya que el plumaje de *C. skua* es oscuro uniforme con flecos claros en todo su cuerpo. Durante los ataques a los gaviotines se podía observar que los págalos, a pesar de ser mucho más robustos y de alas más anchas, tenían la envergadura muy similar, y cuando perseguían a *S. caspia* tenían menor envergadura. En cambio, *C. skua* es más grande y con envergadura considerablemente mayor que la de los gaviotines (ver medidas en Tuck & Heinzel 1978; Harrison 1983; Robbins et al. 1983). En mis observaciones no pude precisar el tamaño relativo de las manchas blancas en las alas.

Por la coloración de estos págalos y especialmente por su tamaño, comparado con el de los gaviotines que perseguía, considero que las observaciones corresponden a *C. maccormicki*. Su presencia en la costa Caribe colombiana es razonable por haberse encontrado en muchas otras localidades del Caribe. La colecta de ejemplares es necesaria para poder resolver claramente las especies presentes en las costas colombianas, pero dadas las dificultades que representa coleccionar estas aves, muy ágiles y veloces y generalmente en aguas abiertas, se vuelve imprescindible detallar las observaciones al máximo, teniendo en cuenta toda la coloración y el tamaño relativo a otras aves presentes.

Mi presencia en Cispata hizo parte del proyecto "Plan de Seguimiento y Monitoreo de la Zona Deltaico Estuarina del Río Sinú" realizado por INVEMAR y financiado por Empresa Urrá S. A. E. S. P. Luis Germán Naranjo, Sergio Córdoba y Mateo López corrigieron versiones preliminares del manuscrito. F. Gary Stiles me ayudó muchísimo con comentarios muy pertinentes sobre las diferencias en la coloración de las distintas especies de estos págalos.

LITERATURA CITADA

- AINLEY, D. G., L. B. SPEAR & R. C. WOOD. 1985. Sexual color and size variation on the South Polar Skua. *Condor* 87: 427-428.
- DEVILLERS, P. 1997. The skuas of the North American Pacific coast. *Auk* 94: 417-429.
- ESTELA, F. A., L. G. NARANJO & R. FRANKE-ANTE. 2004. Registros de págalos (Aves: Stercoraridae) en las costas de Colombia. *Boletín Investigaciones Marinas y Costeras*, en imprenta.
- FURNESS, R. W. 1996. Family Stercoraridae (Skuas). En: Del Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal (eds.). *Handbook of the Birds of the World. Hoatzin to Auks*. Vol 3. Lynx Edicions, Barcelona.
- HARRISON, P. 1983. *Seabirds, an identification guide*. Houghton Mifflin Company, Boston.
- HILTY, S. L. & W. L. BROWN. 1986. *A guide to the birds of Colombia*. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- HILTY, S. L. 2002. *Birds of Venezuela, Second Edition*. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- OLSEN, K. M. & H. LARSSON. 1997. *Skuas and Jaegers*. Yale

- University Press, New Haven, CT.
- ORTIZ - VON HALLE, B. 1990. Adiciones a la avifauna de Colombia de especies arribadas a la Isla Gorgona. *Caldasia* 16: 209-214.
- RAFFAELE, H., J. WILEY, O. GARRIDO, A. KEITH & J. RAFFAELE. 1998. A guide to the birds of the West Indies. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- RIDGELEY, R. S. & J. A. GWYNNE, JR. 1989. A guide to the birds of Panamá, with Costa Rica, Nicaragua and Honduras. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- REMSSEN, J. V., JR., A. JARAMILLO, M. A. NORES, M. B. ROBBINS, T. S. SCHULENBERG, F. G. STILES, J. M. C. DA SILVA, D. F. STOTZ, AND K. J. ZIMMER. 2004. Version [Junio 2004]. A classification of the bird species of South America. American Ornithologists' Union. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html>
- ROBBINS, C., B. BRUUN & H. ZIMM. 1983. A guide to field identification birds of North America. Golden Press, New York.
- RODNER, C., M. LENTINO & R. RESTALL. 2000. Checklist of the birds of northern South America. Yale University Press, New Haven, CT.
- STILES, F. G. & A. F. SKUTCH. 1989. A guide to the birds of Costa Rica. Cornell University Press, Ithaca, NY.
- STOTZ, D. F., J. W. FITZPATRICK, T. A. PARKER III & D. K. MOSKOVITZ. 1996. Neotropical Birds, ecology and conservation. University of Chicago Press, Chicago, IL.
- TUCK, G. & H. HEINZEL. 1978. Guía de Campo de las Aves Marinas de España y del Mundo. Ediciones Omega. Barcelona.

Recibido 15.VII.2004,
Aceptado 20.VIII.2004.