

Lista de chequeo de las aves de Colombia: Una síntesis del estado del conocimiento desde Hilty & Brown (1986)

Checklist of the birds of Colombia: A synthesis of the state of knowledge since Hilty and Brown (1986)

Jorge Enrique Avendaño¹, Clara Isabel Bohórquez², Loreta Rosselli³, Diana Arzuza-Buelvas⁴, Felipe A. Estela^{5,6}, Andrés M. Cuervo⁷, F. Gary Stiles⁸ & Luis Miguel Renjifo⁹

¹Laboratorio de Biología Evolutiva de Vertebrados, Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

²Asociación Bogotana de Ornitología, Bogotá, Colombia

³Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A., Bogotá, Colombia

⁴Manchester Museum, University of Manchester, UK

⁵Asociación para el Estudio y Conservación de las Aves Acuáticas en Colombia – CALIDRIS

⁶Departamento de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas, Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia

⁷Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Villa de Leyva, Colombia

⁸Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

⁹Departamento de Ecología y Territorio, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

✉ jorgeavec@gmail.com, cibohorquez@hotmail.com, lrosselli@yahoo.com, dianaestherarzuza@yahoo.com, felipe.estela@gmail.com, acuervo@humboldt.org.co, fgstiles@unal.edu.co, lmrenjifo@javeriana.edu.co

Resumen

La taxonomía y conocimiento de la distribución de la avifauna colombiana ha sufrido grandes cambios desde la publicación de “A Guide to the Birds of Colombia” por Hilty & Brown (1986), a tal punto que hoy no se sabe con precisión cuántas y cuáles especies de aves existen en el territorio colombiano. Presentamos la lista de chequeo de la avifauna de Colombia a agosto de 2017 con base en la revisión de 340 referencias relacionadas con la distribución de la avifauna colombiana. En total, reportamos 1909 especies de aves para el territorio continental e insular del país, de las cuales 216 han sido adicionadas principalmente a partir de 1986. Aunque existe información novedosa sobre distribución para cerca del 66% de la avifauna colombiana, la mayoría de las publicaciones (87%) y registros (53%) se concentran al occidente de la cordillera Oriental (región transandina). Con base en esta información identificamos aquellas áreas del país con vacíos de conocimiento que ameritan mayor interés por parte de los investigadores. Además, estimulamos a la comunidad ornitológica a publicar la información inédita represada, al igual que mejorar la evidencia que soporta los registros novedosos para el país.

Palabras clave: Ampliaciones de distribución, avifauna colombiana, biodiversidad, endemismo, especies nuevas

Abstract

The taxonomy and knowledge of the distribution of Colombian avifauna has undergone great changes since the publication of “A Guide to the Birds of Colombia” by Hilty & Brown (1986) to the extent that we are unaware of how many and which species inhabit the Colombian territory. Here, we present a checklist of the birds of Colombia updated to August 2017 with a review of 340 references dealing with the distribution of Colombian birds. In sum, we report 1909 species for continental and insular Colombia, 216 of which have been added mainly since 1986. Although there are new data on distribution from 66% of the Colombian avifauna, most publications (87%) and new records (53%) are concentrated to the west of the Eastern cordillera (trans-Andean region). Based on the data we identify those regions of the country with knowledge gaps, which deserve more interest from researchers. Moreover, we encourage the ornithological community to publish their unpublished data and to improve the evidence supporting future new records for the country.

Key words: biodiversity, Colombian avifauna, endemism, new species, range extensions

Introducción

El estudio de la avifauna colombiana ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de la ornitología de Suramérica y del Neotrópico en general. Importantes síntesis sobre la taxonomía y zoogeografía de la aves colombianas tales como Chapman (1917), Todd & Carriker (1922), Meyer de Schauensee (1948-52, 1966), Olivares (1969, 1974), Haffer (1975), entre otros, consolidaron las bases de la ornitología colombiana, a la vez que potenciaron el desarrollo ornitológico en países limítrofes, por ejemplo a manera de guías de campo (Meyer de Schauensee & Phelps Jr 1978). Estos trabajos estimularon el estudio de aspectos relacionados con la ecología, evolución, comportamiento y conservación de las aves. Sin embargo, el desarrollo científico de la ornitología y diversos procesos de conservación a nivel nacional y regional fue acelerado de manera dramática con la publicación de la obra de Hilty & Brown (1986) sobre las aves de Colombia, la cual se considera que marcó un hito histórico en la ornitología Neotropical (Freile & Córdoba-Córdoba 2008, Córdoba-Córdoba 2009, Naranjo 2009).

Tres décadas han pasado desde la publicación de la primera edición de "A Guide to the Birds of Colombia" por S. L. Hilty & W. L. Brown (1986). En su momento, la guía describía 1698 especies para el territorio continental e islas del Pacífico, además de 10 especies registradas solo hasta el momento para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Quince años más tarde, la traducción de la guía al castellano por Humberto Álvarez-López vino acompañada de 31 nuevas especies para el país. Sin embargo, para ese entonces la estructura taxonómica y sistemática de las aves neotropicales comenzaba a tambalearse producto del advenimiento de técnicas moleculares (Sibley & Ahlquist 1990) y varias obras taxonómicas (Ridgely & Gwynne

1989; Ridgely & Tudor 1989; Fjeldså & Krabbe 1990; Ridgely & Tudor 1994; Isler & Isler 1999).

Numerosos estudios en sistemática (filogenéticos, morfológicos y comportamentales), además de monografías taxonómicas y reportes sobre nuevos taxones y ampliaciones de distribución que competen a la avifauna colombiana han sido publicados desde Hilty & Brown (1986). Esto deja abierta la pregunta sobre cuántas y cuáles especies de aves existen en el territorio colombiano de acuerdo al conocimiento actual de la sistemática del grupo. Varios autores han tratado de dar respuesta a estos interrogantes (Salaman *et al.* 2001, 2008, McMullan & Donegan 2014, Donegan *et al.* 2009, 2016, Remsen *et al.* 2017). Sin embargo, diferentes criterios taxonómicos y operativos, así como la velocidad a la que son actualizados los diferentes listados dados para el país, han resultado en diferentes cifras sobre la diversidad de la avifauna colombiana. Por un lado, la adopción del sistema de puntuación de especies de Tobias *et al.* (2010) por parte del Handbook of the Birds of the World (del Hoyo & Collar 2014, 2016) ha influenciado un incremento más abrupto en el número de especies colombianas debido a separaciones taxonómicas (*v. gr.* Donegan *et al.* 2014, 2015, 2016), sin embargo, debido a que estas separaciones se basan en diferentes tipologías, pueden no tener sentido biológico. De otro lado, aunque el South American Classification Committee de la American Ornithological Society, (SACC; Remsen *et al.* 2017) se basa en un enfoque más riguroso en cuanto a la delimitación taxonómica de las especies, su ámbito geográfico restringido principalmente a Suramérica continental, así como la pausada actualización de la lista de especies para Colombia han resultado en una estimación menos extensa de la avifauna del país.

Con el propósito de resolver estas diferencias

presentamos una lista actualizada a agosto de 2017 de la avifauna continental e insular colombiana (Anexo 1). Es nuestro interés que la comunidad ornitológica cuente con una lista de chequeo de la avifauna colombiana lo más actualizada posible siguiendo el estándar de clasificación del South American Classification Committee, (SACC).

Complementamos esta contribución con los cambios taxonómicos efectuados desde Hilty & Brown (Anexo 2), además de un listado de especies cuya presencia en el país no ha sido documentada formalmente, o corresponden a separaciones taxonómicas aun no implementadas en el SACC (Anexo 3). Finalmente, presentamos un listado de las referencias bibliográficas relacionadas con ampliaciones de distribución de las aves terrestres y acuáticas colombianas publicadas desde 1986 (Anexo 4).

Materiales y métodos

Para actualizar el listado de especies de aves de Colombia partimos del total de especies dado por Hilty & Brown (1986, 2001). Posteriormente, realizamos búsquedas bibliográficas a través de Google Académico (<https://scholar.google.com/>) empleando las palabras Colombia y aves más las siguientes palabras clave: ampliación de distribución, inventario, listado de especies, nueva especie, nuevo registro y taxonomía. En total, consultamos 340 citas bibliográficas publicadas posteriormente a Hilty & Brown (1986) y relacionadas con ampliaciones de distribución de las aves colombianas hasta agosto de 2017, con algunas contribuciones en prensa sometidas durante el año en curso. Cabe resaltar que los registros novedosos incluidos dentro de esta revisión corresponden a aquellos formalmente publicados en revistas científicas sujetas a revisión por pares, y otros documentados en libros y guías

de campo (e.g. ABO 2000, McNish 2003). Por lo tanto, no se incluyeron registros proporcionados en informes técnicos, repositorios de registros biológicos (e.g. eBird) o comunicaciones personales.

Por otra parte, la lista de chequeo cubre Colombia continental e islas del Caribe (San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y Pacífico (Gorgona, Malpelo). Así mismo, cada especie fue incluida en la lista de chequeo si su presencia en el área es apoyada en evidencia tangible sujeta a verificación, tal como un espécimen de museo o un registro fotográfico, filmico o sonoro publicado. Especies cuya presencia es soportada sólo por registros visuales formalmente publicados son categorizadas como especies hipotéticas (Anexo 1). En el caso particular de las especies introducidas, sólo se incluyen en el listado aquellas para las que se tiene evidencia de su reproducción exitosa en libertad y mantenimiento de una o más poblaciones viables (Baptiste & Múnera 2010). En cuanto a endemismo, una especie se considera endémica de Colombia cuando su distribución geográfica está contenida totalmente dentro de los límites políticos del país (en el sentido tradicional, Stiles 1998). Para la actualización de la lista de especies endémicas partimos de Stiles (1998), Chaparro-Herrera *et al.* (2013) y Remsen *et al.* (2017).

La taxonomía empleada en esta lista de chequeo sigue a Remsen *et al.* (2017), versión 28 de abril. La clasificación presentada consiste principalmente de los rangos de Orden, Familia, Género y Especie. No hemos incluido subespecies debido a la complejidad de la variación geográfica de las subespecies colombianas y su delimitación diagnóstica. Para una sinopsis de la distribución y diagnosis de las subespecies colombianas recomendamos seguir a Dickinson (2003), Dickinson & Christidis (2014) y Dickinson

& Remsen (2013). Los nombres en inglés siguen a Remsen *et al.* (2017) y la American Ornithological Society (Chesser *et al.* 2017) para los taxones fuera del área del SACC.

Resultados

Lista de especies y cambios taxonómicos. — En total reportamos 1909 especies para Colombia pertenecientes a 31 órdenes y 90 familias. Del total de especies, 1887 cuentan con registros en el territorio continental, mientras que 17 especies adicionales han sido reportadas únicamente para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y otras cinco sólo en isla Malpelo (Tabla 1). De esta manera, desde Hilty & Brown (1986) se han adicionado 216 especies a la avifauna colombiana, mientras otros 15 taxones han sido eliminados debido a fusiones taxonómicas (Anexo 2) o su presencia en el país ha sido invalidada (Anexo 3). Es de notar, que a pesar de que 53 familias cuentan con al menos una nueva especie desde 1986, aproximadamente el 51% de las adiciones (110 especies) se concentran en ocho familias (Procellariidae (9 especies), Laridae (8), Trochilidae (20), Thamnophilidae (15), Rhinocryptidae (10), Furnariidae (12), Tyrannidae (25), Thraupidae (11), lo cual se relaciona con diferentes énfasis a nivel de campo y sistemática que han tenido estos grupos en las últimas décadas.

Por su parte, la cronología de las adiciones de especies muestra una tasa de crecimiento casi constante a partir de 1990 (Fig. 1), con un promedio de 6.8 especies/año (intervalo 1-18). Esta tasa de adición ha sido principalmente afectada por el tipo de categoría de las adiciones, específicamente primeros registros, y no por la temporalidad de los mismos independientemente de si se evalúa por año o por períodos de cinco años ($F(2,10)=7.1$, $P<0.01$, $R^2=0.83$). De hecho, la tasa de adición fue afectada principalmente por

Tabla 1. Listado de especies exclusivas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, e isla Malpelo. La mayoría de las especies corresponden a migratorias boreales regulares y/o erráticas (denotadas con X), comparado con el menor número de especies residentes (R). Entre corchetes se indican especies hipotéticas.

| Especie | San Andrés | Providencia y Santa Catalina | Malpelo |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------|---------|
| <i>Anas strepera</i> | X | | |
| <i>Mergus serrator</i> | X | X | |
| <i>Anous minutus</i> | | | R |
| <i>Gygis alba</i> | | | R |
| <i>Pterodroma phaeopygia</i> | | | X |
| <i>Ardenna pacifica</i> | | | X |
| [<i>Puffinus puffinus</i>] | X | | |
| <i>Fregata minor</i> | | | R? |
| [<i>Phalacrocorax auritus</i>] | X | X | |
| <i>Pelecanus erythrorhynchos</i> | X | | |
| <i>Leptotila jamaicensis</i> | R | | |
| [<i>Empidonax minimus</i>] | X | | |
| <i>Vireo griseus</i> | R | | |
| <i>Vireo crassirostris</i> | | | R |
| <i>Vireo caribaeus</i> | R | | |
| [<i>Anthus rubescens</i>] | X | | |
| [<i>Passerculus sandwichensis</i>] | X | | |
| <i>Passerina ciris</i> | X | | |
| <i>Limnothlypis swainsonii</i> | X | | |
| <i>Leiothlypis ruficapilla</i> | X | | |
| <i>Setophaga americana</i> | X | | |
| <i>Icterus leucopteryx</i> | R | | |

las especies registradas por primera vez en el país (133), seguida por separaciones taxonómicas (63), mientras el efecto de las especies nuevas para la ciencia (20) no fue significativo. Cabe resaltar que, entre estos tres tipos de adiciones, la tasa de primeros registros ha sido más amplia ($\bar{x}=20.8$, intervalo =14-33) a lo largo de períodos de cinco años que en el caso de las separaciones taxonómicas ($\bar{x}=10.3$, intervalo =7-13) y nuevas especies para la ciencia ($\bar{x}=3.2$, intervalo =1-6). Es de notar también que la mayoría de especies reportadas por primera vez en el país se




Figura 1. Número de especies de aves adicionadas para Colombia desde 1986 hasta agosto de 2017 totalizado en períodos de cinco años, con excepción del período 2016-2017. La tasa de adición de especies ha venido en incremento desde 1991 favorecida principalmente por el alto número de especies registradas por primera vez en el país.

concentran en regiones fronterizas tales como el piedemonte amazónico, sur del departamento del Chocó, Darién, Amazonía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En contraste, la mayoría de especies nuevas para la ciencia han sido descubiertas a lo largo de las cordilleras Central y Occidental (Fig. 2).

De otro lado, la taxonomía empleada en Hilty & Brown (1986) ha sufrido por lo menos 300 modificaciones. Entre las más notables está la adopción de la nomenclatura científica y el orden lineal taxonómico propuesto por el SACC (en esencia Dickinson 2003), reemplazando el sistema propuesto por Meyer de Schauensee (1966) y la AOU (1957). Por consiguiente, varias familias han desaparecido (*e.g.* Cochlearidae, Phalaropodidae, Dendrocolaptidae, Rupicolidae, Coerebidae, Tersinidae, Catamblyrhynchidae), han sido reestructuradas (Scolopacidae, Capitonidae, Furnariidae, Formicariidae, Conopophagidae, Tyrannidae, Cotingidae, Pipridae, Troglodytidae, Thaupidae, Fringillidae) o nombradas (Semnornithidae, Sapayoidae, Thamnophilidae, Grallariidae, Oxyruncidae, Tityridae,

Donaciobiidae, Emberizidae, Cardinalidae). Sin embargo, la mayoría de modificaciones se concentran a niveles taxonómicos inferiores debido a transferencias de taxones a nivel de familia, hasta asignación de estado específico a subespecies, cambios de nombres genéricos y específicos debido a prioridad taxonómica, entre otros. Un listado de los cambios taxonómicos efectuados desde Hilty & Brown (1986), con su respectiva actualización es presentado en el Anexo 2.

Situación de la avifauna colombiana. — Del total de especies registradas para Colombia, las especies residentes, hipotéticas y erráticas se han incrementado notablemente desde Hilty & Brown (1986) (Tabla 2), en comparación con las migratorias boreales y australes. Sin embargo, se desconoce con precisión el estado para cerca de 14 especies ya sea como residentes o migratorias. Por otra parte, la evidencia actual indica que el endémico Zambullidor Cira (*Podiceps andinus*) permanece como la única especie extinta del país y por ende globalmente (Amaya-Villarreal & Renjifo 2016). Además, dos especies exóticas han logrado establecer poblaciones viables en libertad, *Columba livia* (ABO 2000) y *Lonchura malacca* (Carantón-Ayala *et al.* 2008, Baptiste & Múnera 2010, López-O. *et al.* 2013), mientras que *Passer domesticus* ha colonizado varias regiones del país, particularmente en la costa Pacífica y La Guajira (Negret & Ortiz 1989, López-Victoria & Estela 2007; Freeman *et al.* 2012; Murillo-Pacheco *et al.* 2013). Hilty & Brown (1986) dieron para el país un total de 40 especies hipotéticas, de las cuales se han reportado 25 de ellas con algún tipo de evidencia (foto, espécimen, grabación, rastreo satelital). Sin embargo, del total actual de la avifauna colombiana, 57 especies son consideradas hipotéticas, lo que indica que en las últimas tres décadas 42 especies nuevas para el país han sido documentadas únicamente por observaciones. Las especies hipotéticas muestran




Figura 2. Distribución de especies de aves adicionadas para Colombia desde Hilty & Brown (1986), basada en 133 especies reportadas por primera vez para el país (círculos verdes) y 20 especies nuevas para la ciencia (círculos blancos). Cada círculo indica una localidad donde se ha registrado una o más especies (según su diseño). El signo de interrogación (?) corresponde a localidad incierta asignada a *Laterallus jamaicensis*. En isla Gorgona se han reportado por primera vez siete especies, mientras que once especies han sido registradas por primera vez para isla Malpelo y el Pacífico. El recuadro de las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Malpelo no siguen la misma escala de la figura principal.

un patrón marcado de concentración y adición por regiones, principalmente en la Amazonía (15 especies; 9 de ellas nuevas desde Hilty & Brown (1986), Costa Pacífica (17; 12), el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (8; 8), Caribe-SNSM (8; 4), Chocó-Darién (3; 3), Andes (4; 4), Orinoquía (1; 1) y Magdalena-Cauca (1; 1).

La mayoría de estas especies (38) son migratorias boreales y australes cuya presencia en el país puede considerarse errática, mientras que el resto de especies (20) probablemente son residentes con distribuciones localizadas.

Especies endémicas. — El número y composición de especies endémicas de Colombia también se ha visto modificado a causa de la dinámica taxonómica y avances investigativos de los últimos años. De las 66 especies endémicas reportadas para Colombia (Stiles 1998), cinco han sido suprimidas por fusiones taxonómicas (*Crypturelurus saltuarius*, *C. colombianus*, *Molothrus armenti*, *Sporophila insulata* y *Catamenia oreophila*) y seis por ampliaciones de distribución hacia otro país (*Capito quinticolor*, *Veniliornis chocoensis*, *Grallaria alleni*, *G. rufocinerea*, *Vireo masteri* y *Conirostrum rufum*). Entre tanto, 28 especies han sido adicionadas, 13 de las cuales representan especies nuevas para la ciencia (*Eriocnemis isabellae*, *Chlorostilbon olivaresi*, *Cercomacroides parkeri*, *Grallaria kaestneri*, *G. urraoensis*, *Scytalopus rodriguezi*, *S. stilesi*, *S. alvarezlopezi*, *Phylloscartes lanyoni*, *Lipaugus weberi*, *Thryophilus sernai*, *Henicorhina negreti* y *Atlapetes blancae*) y 15 que corresponden a taxones anteriormente tratados como subespecies que fueron elevados a la categoría de especie (*Ortalis columbiana*, *Anthocephala berlepschi*, *Oxypogon stubelii*, *O. cyanolaemus*, *O. guerinii*, *Chaetocercus astreans*, *Hapalopsittaca fuertesi*, *Drymophila hellmayri*, *D. caudata*, *Scytalopus sanctaemartae*, *S. canus*, *Clibanornis rufipectus*, *Trocholodus monticola*, *Henicorhina anachoreta* y *Arremon basilicus*). En total, adicionando tres especies endémicas que no fueron incluidas en su momento por Stiles (1998), *Coeligena orina*, *Cranioleuca hellmayri* reportada en Perijá en la literatura (Venezuela) y *Anisognathus melanogenys*, las aves endémicas de Colombia suman 83 especies. Esta cifra difiere del total de 79 especies dado por Chaparro-

Tabla 2. Estado de la avifauna colombiana, indicando el número de especies adicionadas por categoría desde Hilty & Brown (1986). Nótese el significativo incremento en especies residentes, erráticas e hipotéticas desde 1986. Por propósitos de categorización, 16 especies con poblaciones residentes y migratorias han sido incluidas dentro de las especies residentes. Las especies con estado no confirmado en Colombia son tratadas como estado incierto.

| Estado | No. de especies | Adiciones |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| Residentes | 1632 | 131 |
| Migratorias australes | 15 | 1 |
| Migratorias boreales | 124 | 10 |
| Erráticas | 63 | 25 |
| Introducidas | 3 | 2 |
| Extintas | 1 | - |
| Incierto | 14 | 5 |
| Hipotéticas | 57 | 42 |
| Total | 1909 | 216 |

Herrera *et al.* (2014) debido a la fusión de *Mimus magnirostris* con *M. gilvus*, la adición reciente de *A. berlepschi*, *O. stubelii*, *O. cyanolaemus*, *O. guerini*, *S. alvarezlopezi* y *H. anachoreta*, e invalidez taxonómica de *Heliangelus zusii* debido a su probable origen híbrido (Pérez-Emán *et al.* en revisión). A su vez difiere del total de 79 especies según el SACC (Remsen *et al.* 2017), debido a la inclusión de dos especies no continentales (*V. caribeus* y *V. approximans*), así como de tres especies no consideradas endémicas o aún no debidamente reconocidas (*Rallus semiplumbeus*, *S. alvarezlopezi* y *C. hellmayri*) o invalidadas (*H. zusii*) por este comité.

Distribución de la información novedosa a nivel geográfico. — En total, logramos identificar 340 contribuciones publicadas desde 1986 relacionadas con primeros registros para el país, ampliaciones de distribución geográfica y/o altitudinal de especies previamente conocidas y especies nuevas para la ciencia. En general, la tasa de publicación de nuevos registros ha experimentado un incremento progresivo desde 1986 (Fig. 3), siendo los períodos entre 2001 y

2015, así como un mayor énfasis en datos de la región Andina, los factores que más han afectado de manera significativa la tasa de publicación ($F(12,36)= 8.3$, $P<0.001$, $R^2= 0.74$). Dado que la mayor parte de la avifauna colombiana se encuentra localizada al occidente de la cordillera Oriental con 947 especies, seguida de la región Orinoquía-Amazonía con 400 especies y 562 especies compartidas entre ambas regiones, no es sorprendente que la mayoría de publicaciones se concentren al occidente de la cordillera Oriental (trans-Andes; 85.9%) comparado con la región al oriente de la misma cordillera (cis-Andes; 14.1%). A menor escala, se presenta una mayor concentración de publicaciones en los Andes (49.7%), seguido de la región Amazonía-Orinoquía (14.1%), Caribe-Sierra Nevada de Santa Marta (12.1%) y costa Pacífica (9.1%). Regiones como los valles de los ríos Magdalena y Cauca, el Chocó y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina concentran el 7.6%, 5.0% y 2.4%, respectivamente, de las contribuciones con registros novedosos desde 1986.

A pesar de estas diferencias regionales en el esfuerzo de publicación, cabe destacar que para 1187 especies se ha reportado por lo menos una ampliación a nivel de distribución geográfica y de igual forma para 435 especies a nivel altitudinal. Lo anterior indica que desde 1986, se han publicado nuevos registros de distribución para 1255 especies que representan el 66% de la avifauna colombiana. Tal como se esperaría, la mayoría de los registros (53%) se concentran en especies transandinas, seguidas por especies cis-trans (32%) y finalmente las cisandinas (15%).

Discusión

A través de la dinámica taxonómica e investigativa de los últimos 30 años, la avifauna colombiana se ha mantenido como una de las




Figura 3. Número de publicaciones (n=340) relacionadas con ampliaciones de distribución de la avifauna colombiana posteriores a Hilty & Brown (1986) hasta agosto de 2017, totalizado en períodos de cinco años. La tasa de publicación ha venido en incremento desde 1986, con la mayoría de las contribuciones concentradas en los Andes.

más diversas de Suramérica con 1909 especies de aves distribuidas en su territorio continental y marino (Tabla 1). Aunque Brasil ha sobrepasado recientemente esta cifra con cerca de 1919 especies (Piacentini *et al.* 2015), el enfoque operativo del Comité Brasileño de Registros Ornitológicos, principalmente influenciado por el Concepto Unificado de Especie (de Queiroz 2005, Aleixo 2007), ha resultado en un mayor número de separaciones taxonómicas, comparado con el enfoque más conservador del Concepto Biológico de Especie implementado por el SACC (Remsen *et al.* 2017).

Bajo el enfoque sistemático y ámbito geográfico del SACC, Colombia posee un mayor número de especies que cualquier otro país suramericano y del planeta, incluso sin contabilizar las 17 especies exclusivas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Tabla 3). Es evidente que estas cifras son el resultado de una nueva ola de exploración y caracterización ornitológica iniciada principalmente a partir de 1990, la cual fue catalizada por varios factores como la consolidación de las asociaciones ornitológicas

del país, la maduración de los programas de biología en varias universidades, la potenciación de los museos, la llegada al país de varios investigadores nacionales y extranjeros y la aparición de varias revistas ornitológicas nacionales (Hilty & Brown 1986, 2001; Naranjo 2008, Córdoba-Córdoba 2009, Freile *et al.* 2014). La manera como estos actores influyeron en el conocimiento de la diversidad y distribución de la avifauna colombiana resultó en la adición de 216 especies posterior a Hilty & Brown (1986). En este sentido es evidente que la exploración y caracterización biológica de la avifauna del país ha sido el factor responsable del incremento de especies en el país, en contraste con el menor pero cada vez más creciente número de estudios sobre taxonomía y sistemática.

No obstante, aunque actualmente el 97% de las especies registradas en el país se encuentran respaldadas por algún tipo de evidencia sujeta a corroboración, es necesario que los investigadores traten en lo posible de documentar la mayor cantidad de información asociada a sus registros, no sólo a nivel de evidencia tangible (*i.e.* especímenes, fotos, grabaciones de vocalizaciones), sino también en cuanto a descripciones morfológicas detalladas así como datos de comportamiento y hábitat que son claves en la determinación taxonómica (ver Remsen 1977). La calidad en la documentación de los registros tiene implicaciones importantes en el inventario de las aves colombianas en distintas escalas geográficas. Por ejemplo, en la lista de chequeo no incluimos 35 especies (Anexo 3) reportadas para el país por otros autores dadas varias razones tales como (i) que en la mayoría de casos los registros no han sido formalmente publicados (*i.e.* corresponden a comunicaciones personales o informes de campo referenciados en otros trabajos), (ii) su presencia en Colombia es inferida con base en guías de campo, (iii) la evidencia actual presenta alta

Tabla 3. Comparación de totales de especies de aves entre los cinco países suramericanos con mayor diversidad aviar. Por propósito de análisis se utilizó el listado de especies por países del SACC (versión 28 abril 2017), actualizando el listado para Colombia con base en la información de este estudio. El total para Colombia difiere del dado en la Tabla 1 dado que no se incluyeron para este análisis 31 especies que están (i) fuera del ámbito geográfico del SACC (*i.e.* Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y/o (ii) no han sido formalmente incluidas en dicho listado. Las especies endémicas no se consideran para el total de cada país.

| | Colombia | Perú | Brasil | Ecuador | Venezuela |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Residentes | 1637 | 1615 | 1607 | 1452 | 1244 |
| Migratorias | 139 | 136 | 115 | 107 | 100 |
| Erráticas | 61 | 39 | 69 | 55 | 30 |
| Introducidas | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Extintas | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Hipotéticas | 37 | 60 | 24 | 54 | 18 |
| Endémicas | 78* | 106 | 228 | 33 | 44 |
| TOTAL | 1878 | 1852 | 1823 | 1674 | 1399 |

*No incluye a *H. zusii* y otras cinco especies no reconocidas por el SACC (ver texto).

incertidumbre taxonómica, (iv) no han sido formalmente descritas, o (v) corresponden a separaciones taxonómicas que no han sido formalmente reconocidas por el SACC. Varios de estos factores explican la diferencia de 28 especies entre el presente estudio y las 1937 especies reportadas para Colombia por Donegan *et al.* (2016). En este sentido, la documentación técnica y publicación formal de los registros es necesaria para consolidar el conocimiento sobre la diversidad y distribución de las aves colombianas.

Aunque Colombia figura entre los 12 países Neotropicales con mayor número de estudios sobre diferentes aspectos de la biología aviar publicados entre 1996 y 2011, la relación de publicaciones por especie es 0.34 (Freile *et al.* 2014). A nivel de información novedosa sobre distribución geográfica es de destacar que la tasa de publicación de este tópico se ha incrementado en los últimos años, tanto así que hoy el 66% de las especies colombianas cuentan con información novedosa acerca de su distribución, no obstante, en muchos casos el número de

registros nuevos por especie no es mayor a uno.

Así mismo, la mayoría de adiciones y ampliaciones de distribución provienen de regiones al occidente de la cordillera Oriental (trans-Andes) y zonas costeras. En la región transandina se han logrado avances significativos en el conocimiento de la avifauna marina (Estela *et al.* 2010), al igual que varios sectores de los Andes, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Chocó y los valles secos interandinos (Strewe 2000; Salaman *et al.* 2002a,b; Strewe & Navarro 2003, 2004; Krabbe *et al.* 2006; Donegan *et al.* 2010; Cuervo *et al.* 2008a,b; Ayerbe-Quiñones & López-O. 2011; Losada-Prado & Molina-Martínez 2011; Suárez-Sanabria & Cadena 2013; López-O. *et al.* 2014). No obstante, algunas regiones como los valles del Magdalena y Cauca, el Darién, Catatumbo y los bosques secos del Caribe han permanecido poco documentados en las últimas décadas (Naranjo & Estela 1999; Estela & López-Victoria 2005, Laverde-R. *et al.* 2005; Avendaño 2012; Olaciregui *et al.* 2016; Renjifo *et al.* 2017). Por su parte, la información sobre la distribución y composición de la avifauna de la Orinoquía y

Amazonía es bastante escasa. Basta mirar que para la Amazonía colombiana solo se cuenta con siete inventarios de mediano a largo plazo (Cuadros 1993, Bennett-Defler 1994, Stiles *et al.* 1995, Cadena *et al.* 2000, Álvarez-R *et al.* 2003, Stiles 2010, Stiles & Beckers 2015), mientras la Orinoquía solo cuenta con dos (Rojas & Piragua 2000, Ocampo-Peña & Etter 2013). Este patrón de baja documentación a nivel de nuevos registros e inventarios para regiones como la Orinoquía, Amazonía y norte de la costa Caribe fue encontrado en un análisis bibliométrico que incluyó estudios publicados en varios grupos de vertebrados y plantas en Colombia entre 1990 y 2011, lo cual probablemente es un reflejo de las dificultades históricas de acceso a estas zonas por problemas de orden público (Arbeláez-Cortés 2013), así como de la menor visibilidad de un buen número de inventarios publicados en informes técnicos comparados con aquellos publicados en revistas arbitradas. Con la disminución del conflicto es de esperar el avance de los investigadores a regiones otrora inaccesibles; por consiguiente, el llamado es a dirigir los esfuerzos de investigación a estas regiones que en conjunto albergan la mitad de las especies del país.

De otro lado, la ornitología colombiana ha sido fortalecida por estudios en los campos de la taxonomía y sistemática a nivel neotropical, tanto así que 63 especies han sido adicionadas producto de separaciones taxonómicas en las últimas décadas. Aun así, creemos que el papel de los investigadores colombianos en campos como la taxonomía, filogenética, genética de poblaciones y ecología de las aves colombianas y Neotropicales puede ser mayor, para lo cual un punto estratégico es el fortalecimiento de las colecciones biológicas (pieles de estudio, tejidos, esqueletos, especímenes en líquido, huevos, nidos) y datos accesorios (grabaciones de cantos, fotografías, videos) (Cuervo *et al.* 2006). Por

ejemplo, algunas especies han sido incluidas en la lista de chequeo (Anexo 1) gracias a un único espécimen (*e.g. Conothraupis speculigera*; Lobo-y-Henriques *et al.* 2012) o grabación (*Turdus sanchezorum*; O'Neill *et al.* 2011). No obstante, en general la representatividad de las aves colombianas en diferentes aspectos de documentación es aún incompleta. Por ejemplo, a nivel de especímenes de museo, la colección de aves del Instituto de Ciencias Naturales, la más grande del país con alrededor de 40,000 especímenes, conserva pieles de ca. 1,580 especies y unas 2,200 subespecies de las 2,500 estimadas para el país (F. G. Stiles obs. personal), lo cual denota un vacío de muestreo para 329 especies y 300 subespecies. A nivel de series de especímenes de esta colección, las cifras actuales indican que ca. 60 especies incluyen más de 100 especímenes, mientras ca. 650 están representadas por 10 o menos, lo cual restringe la posibilidad o implicaciones de diferentes estudios a nivel de variación fenotípica y genética (Cuervo *et al.* 2006; F. G. Stiles obs. personal).

Así mismo, la colección de tejidos de aves mantenida por el Instituto Alexander von Humboldt con 8,007 muestras (individuos) ha contribuido en la ejecución de al menos 48 estudios sobre sistemática filogenética y filogeografía de aves Neotropicales (E. Arbeláez-Cortés com. pers.). No obstante, sólo 1,042 (~55%) de las 1909 especies del país cuentan con muestras de tejido en esta colección, y en promedio se cuenta con menos de 7,6 muestras por especie (E. López com. pers.) restringiendo así el alcance de diferentes estudios filogeográficos y de genética de poblaciones a nivel regional. Esta brecha de muestreo y representatividad de las aves colombianas en estudios filogenéticos y filogeográficos a nivel internacional es producto en parte de regulaciones excesivamente estrictas sobre la recolecta científica y aún más, el acceso a

recursos genéticos (Nemogá & Rojas 2007, Fernández 2011). No obstante, cambios sustanciales en la normatividad de recolección de especímenes y acceso al material genético de los mismos desde el 2013 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2013a, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2013b), seguramente impactarán en el conocimiento sobre la variabilidad genética e historia evolutiva de la avifauna colombiana y Neotropical, para lo cual es necesario un esfuerzo colaborativo interinstitucional dirigido a llenar vacíos de muestreo a nivel taxonómico y geográfico.

La documentación y estudio de las vocalizaciones de las aves colombianas ha venido en incremento en las últimas décadas principalmente por el trabajo realizado en el Banco de Sonidos Animales (hoy Colección de Sonidos Ambientales - CSA) del Instituto Alexander von Humboldt, y numerosos ornitólogos que han publicado guías sonoras regionales (e.g. Álvarez *et al.* 2007; Boesman 2012) o depositado sus grabaciones en xeno-canto. Para agosto de 2017, la CSA registraba 14,546 grabaciones de 1024 especies (IAvH 2012), mientras que xeno-canto.org reportaba un total de 19,272 grabaciones de 1,322 especies colombianas. Sin embargo, es imprescindible seguir grabando las vocalizaciones de las aves colombianas ya que el número de grabaciones por especie, población o tipo de vocalización en muchos casos es bajo.

El desarrollo de la ornitología colombiana en las próximas décadas dependerá de la recolección, calidad y disponibilidad de la información entre la comunidad científica. Por lo tanto, hacemos un llamado a los ornitólogos a publicar la información de inventarios y ampliaciones de distribución represados en informes técnicos, trabajos de grado e incluso libretas de campo, así como a continuar documentando diferentes aspectos de la biología de las aves. De este

esfuerzo mancomunado no sólo dependerá nuestro conocimiento de las aves colombianas, sino la conservación de las mismas.

Agradecimientos

Agradecemos a la Asociación Colombiana de Ornitológia por la invitación a participar en este proyecto. Especial agradecimiento a M. F. Gómez, N. Giraldo, A. M. Amaya-Villarreal, S. de la Zerda, D. Forero y T. Celeita por su acompañamiento y la colaboración prestada en el transcurso del proyecto. M. L. Isler y M. B. Robbins prestaron asesoría sobre el estado de varias especies en Colombia. C. A. Medina facilitó el acceso a la Colección de Aves y Centro de Documentación del Instituto Alexander von Humboldt. E. Arbeláez-Cortés y E. López compartieron información de la Colección de Tejidos. Este proyecto fue financiado por la Unidad Especial del Sistema de Parques Nacionales como parte del proyecto de actualización de la guía de campo de aves de Colombia. Agradecemos a N. J. Bayly, S. L. Hilty, L. G. Naranjo, A. Rico-Guevara y un revisor anónimo por sus comentarios y aportes en el manuscrito.

Literatura citada

- ABO. 2000. Aves de la Sabana de Bogotá, Guía de Campo. ABO, CAR, Bogotá, Colombia.
- AMAYA-VILLARREAL, A. M. & L. M. RENJIFO. 2016. *Podiceps andinus*. Págs. 55-56 en: L. M. Renjifo, M. F. Gómez, J. Burbano-Girón & J. Velásquez-Tibatá (eds.) Libro Rojo de Aves de Colombia, Volumen II: Ecosistemas abiertos, secos, insulares, acuáticos continentales, marinos, tierras altas del Darién y Sierra Nevada de Santa Marta y bosque húmedos del centro, norte y oriente del país. Editorial Pontificia Universidad Javeriana e Instituto Alexander von Humboldt. Bogotá D.C., Colombia.
- ALEIXO, A. 2007. Conceitos de espécie e o eterno conflito entre continuidade e operacionalidade: uma proposta de normatização de critérios para o reconhecimento de espécies pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Revista Brasileira de Ornitológia 15: 297-

- 310.
- ÁLVAREZ-R, M., V. CARO-RAMÍREZ, O. LAVERDE & A. M. CUERVO. 2007. Guía sonora de las aves de los Andes colombianos. Banco de Sonidos Animales, Instituto Alexander von Humboldt & Cornell Laboratory of Ornithology, Ithaca, New York.
- ÁLVAREZ-R, M., A. M. UMAÑA, G. D. MEJÍA, J. CAJAO, P. VON HILDEBRAND & F. GAST. 2003. Aves del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, Amazonía-Provincia de la Guyana, Colombia. Biota Colombiana 4: 49-63.
- AMERICAN ORNITHOLOGISTS' UNION. 1957. Check-list of North American Birds, 5th ed. American Ornithologists' Union, Washington, D.C.
- ARBELÁEZ-CORTÉS, E. 2013. Knowledge of Colombian biodiversity: published and indexed. Biodiversity and Conservation 22: 2875-2906.
- AVENDAÑO, J. E. 2012. La avifauna de las tierras bajas del Catatumbo, Colombia: inventario preliminar y ampliaciones de rango. Boletín SAO 21: 1-14.
- AYERBE-QUIÑONES, F. & J. P. LÓPEZ-O. 2011. Adiciones a la avifauna del valle alto del río Patía, un área interandina del suroccidente colombiano. Boletín SAO 20: 1-17.
- BAPTISTE M. P. & C. MÚNERA. 2010. Análisis de riesgo de vertebrados terrestres introducidos en Colombia. Págs. 149-199 en: M. P Baptiste , N. Castaño, D. Cárdenas, F. P. Gutiérrez, D. L. Gil & C.A. Lasso (eds). Análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies introducidas para Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
- BENNETT-DEFLER, S. 1994. Las aves de la Estación Biológica Caparú: una lista preliminar de especies. Trianea 5: 379-400.
- BOESMAN, P. 2012. Birds of Colombia MP3 - Sound Collection. BirdSounds.nl
- CADENA, C. D., M. ÁLVAREZ-R, J. L. PARRA, I. JIMÉNEZ, C. A. MEJÍA, M. SANTAMARÍA, A. M. FRANCO, C. A. BOTERO, G. D. MEJÍA, A. M. UMAÑA, A. CALIXTO, J. ALDANA & G. A. LONDOÑO. 2000. The birds of CIEM, Tinigua National Park, Colombia: an overview of 13 years of ornithological research. Cotinga 13: 46-54.
- CARANTÓN-AYALA, D. A., K. CERTUCHE-CUBILLOS, C. DÍAZ-JARAMILLO, R. PARRA-HERNÁNDEZ, J. SANABRÍA-MEJÍA & M. MORENO-PALACIOS. 2008. Aspectos biológicos de una nueva población del Capuchino Cabeza Negra (*Lonchura malacca*, Estrildidae) en el alto valle del Magdalena, Tolima. Boletín SAO 18: 54-63.
- CHAPARRO-HERRERA, S., M. Á. ECHEVERRY-GALVIS, S. CÓRDOBA-CÓRDOBA & A. SUA-BECERRA. 2013. Listado actualizado de las aves endémicas y casi-endémicas de Colombia. Biota Colombiana 14: 113-150.
- CHAPMAN, F. M. 1917. The distribution of birdlife in Colombia. Bulletin of the American Museum of Natural History 36: 1-169.
- CHESSER, R. T., K. J. BURNS, C. CICERO, J. L. DUNN, A. W. KRATTER, I. J. LOVETTE, P. C. RASMUSSEN, J. V. REMSEN JR, J. D. RISING, D. F. STOTZ & K. WINKER. 2017. Fifty-eighth supplement to the American Ornithological Society's Check-list of North American Birds. The Auk: Ornithological Advances 134: 751-773.
- CÓRDOBA-CÓRDOBA, S. 2009. Historia de la ornitología colombiana: sus colecciones científicas, investigadores y asociaciones. Boletín SAO 19: 1-26.
- CUADROS, T. 1993. Distribución ecológica de la avifauna de Araracuara (Amazonas). Revista ICNE 4: 15-30.
- CUERVO, A. M., C. D. CADENA & J. L. PARRA. 2006. Seguir colectando aves en Colombia es imprescindible: Un llamado a fortalecer las colecciones ornitológicas. Ornitología Colombiana 4: 51-58.
- CUERVO, A. M., P. C. PULGARÍN & D. CALDERÓN. 2008a. New distributional bird data from the Cordillera Central of the Colombian Andes, with implications for the biogeography of northwestern South America. Condor 110: 526-537.
- CUERVO, A. M., P. C. PULGARÍN, D. CALDERÓN-F, J. M. OCHOA-QUINTERO, C. A. DELGADO-V, A. PALACIO, J. M. BOTERO & W. A. MÚNERA. 2008b. Avifauna of the northern Cordillera Central of the Andes, Colombia. Ornitología Neotropical 19: 495-515.
- DE QUEIROZ, K. 2005. Ernst Mayr and the modern concept of species. Proceedings of the National Academy of Sciences, 102: 6600-6607.
- DEL HOYO, J. & N. J. COLLAR. 2014. The HBW–BirdLife International illustrated checklist of the birds of the world, vol. 1: Non-passerines. Lynx Edicions, Barcelona.
- DEL HOYO, J. & N. J. COLLAR. 2016. The HBW–BirdLife International illustrated checklist of the birds of the world, vol. 2: Passerines. Lynx Edicions, Barcelona.
- DICKINSON, E. C. 2003. The Howard and Moore complete checklist of the birds of the world, Revised and enlarged 3rd Edition. Christopher Helm, London.
- DICKINSON, E. C. & L. CHRISTIDIS. 2014. The Howard and Moore complete checklist of the birds of the world, vol. 2: Passerines. Fourth edition. Aves Press, Eastbourne, UK.
- DICKINSON, E. C. & J. V. REMSEN JR. 2013. The Howard and Moore complete checklist of the birds of the world, vol. 1: Non-passerines. Fourth edition. Aves Press, Eastbourne, UK.
- DONEGAN, T. M., J. E. AVENDAÑO, E. R. BRICEÑO-L, J. C. LUNA, C. ROA, R. PARRA, C. TURNER, C. SHARP & B. HUERTAS. 2010. Aves de la Serranía de los Yariguíes y tierras bajas circundantes, Santander, Colombia. Cotinga 32: 72-89.
- DONEGAN, T. M., P. SALAMAN & D. CARO. 2009. Revision of the status of various bird species occurring or reported

- in Colombia. Conservación Colombiana 8: 80-86.
- DONEGAN, T. M., A. QUEVEDO, J. C. VERHELST, O. CORTÉS, J. A. PACHECO & P. SALAMAN. 2014. Revision of the status of bird species occurring or reported in Colombia 2014. Conservación Colombiana 21: 3-11.
- DONEGAN, T. M., A. QUEVEDO, J. C. VERHELST, O. CORTÉS-HERRERA, T. ELLERY & P. SALAMAN. 2015. Revision of the status of bird species occurring or reported in Colombia 2015, with discussion of BirdLife International's new taxonomy. Conservación Colombiana 23: 3-48.
- DONEGAN, T. M., J. C. VERHELST, T. ELLERY, O. CORTÉS-HERRERA & P. SALAMAN. 2016. Revision of the status of bird species occurring or reported in Colombia 2016 and assessment of BirdLife International's new parrot taxonomy. Conservación Colombiana 24: 12-37.
- ESTELA, F. A. & M. LÓPEZ-VICTORIA. 2005. Aves de la parte baja del río Sinú, Caribe colombiano; inventario y ampliaciones de distribución. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras 34: 7-42.
- ESTELA, F. A., M. LÓPEZ-VICTORIA, L. F. CASTILLO & L. G. NARANJO. 2010. Estado del conocimiento sobre aves marinas en Colombia, después de 110 años de investigación. Boletín SAO 20: 2-21.
- FERNÁNDEZ, F. 2011. The greatest impediment to the study of biodiversity in Colombia. Caldasia 33: 2-5.
- FREEMAN, B. G., S. L. HILTY, D. CALDERÓN-F, T. ELLERY & L. E. URUEÑA. 2012. New and noteworthy bird records from central and northern Colombia. Cotinga 34: 5-16.
- FREILE, J. F., & S. CÓRDOBA-CÓRDOBA. 2008. Historia de la ornitología en la región andina: el ejemplo de Colombia y Ecuador. Ornitología Neotropical 19: 381-389.
- FREILE, J. F., H. F. GREENEY & E. BONACCORSO. 2014. Current Neotropical ornithology: Research progress 1996-2011. The Condor 116: 84-96.
- HAFFER, J. 1975. Avifauna of northwestern Colombia, South America. Bonner Zoologische Monographien, no. 7. Bonn.
- HILTY, S. L. & W. L. BROWN. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 996 pp.
- HILTY, S. L. & W. L. BROWN. 2001. Guía de las aves de Colombia. Princeton University Press, American Bird Conservancy-ABC, Universidad del Valle, Sociedad Antioqueña de Ornitología-SAO, Cali. 1030 pp.
- ISLER, M. L. & P. R. ISLER. 1999. The tanagers: natural history, distribution, and identification. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C.
- INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT. 2012. Colección de Sonidos Animales. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá, Colombia. (accedido a través del portal de datos del SIB Colombia, <http://data.sibcolombia.net/datasets/resource/4/>, 2017-07-31)
- KRABBE, N. K., P. FLÓREZ, G. SUÁREZ, J. CASTAÑO, J. D. ARANGO & A. DUQUE. 2006. The birds of páramo de Frontino, western Andes. Ornitología Colombiana 4: 39-50.
- LAVERDE-R, O., F. G. STILES & C. MÚNERA-R. 2005. Nuevos registros e inventario de la avifauna de la Serranía de las Quinchas, un área importante para la conservación de las aves (AICA) en Colombia. Caldasia 27: 247-265.
- LOBO-Y-HENRIQUES, J. C., Y. J. BATES & D. WILLARD. 2012. First Record for the Black-and-white Tanager *Conothraupis speculigera* in Colombia. Conservación Colombiana 17: 45-51.
- LÓPEZ-O, J. P., J. E. AVENDAÑO, N. GUTIÉRREZ-PINTO & A. M. CUERVO. 2014. The birds of Serranía de Perijá: The northernmost avifauna of the Andes. Ornitología Colombiana 14: 62-93.
- LÓPEZ-ORDÓÑEZ, J. P., J. O. CORTÉS-HERRERA, C. A. PAEZ-ORTÍZ & M. F. GONZÁLEZ-ROJAS. 2013. Nuevos registros y comentarios sobre la distribución de algunas especies de aves en los Andes Occidentales de Colombia. Ornitología Colombiana 13: 21-36.
- LÓPEZ-VICTORIA, M. & F. A. ESTELA. 2007. Una lista anotada de las aves de la isla Malpelo. Ornitología Colombiana 5: 40-53.
- LOSADA-PRADO, S. & Y. MOLINA-MARTÍNEZ. 2012. Avifauna del bosque seco tropical en el departamento del Tolima (Colombia): análisis de la comunidad. Caldasia 33: 271-194.
- McMULLAN, M. & T. M. DONEGAN. 2014. Field Guide to the Birds of Colombia. Second edition. Fundación ProAves, Bogotá.
- MCNISH, T. 2003. Lista de chequeo de la fauna terrestre del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. M & B Producciones y Servicios Ltds, Bogotá.
- MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1948-1952. The birds of the Republic of Colombia. Caldasia 22-26: 251-1212.
- MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1966. The species of birds of South America with their distribution. Livingston Press. Narbeth, PA.
- MEYER DE SCHAUENSEE, R. & W. H. PHELPS JR. 1978. A Guide to the Birds of Venezuela. Princeton University Press, Princeton NJ.
- MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 2013a. Decreto No.1376 por el cual se reglamenta el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá, D.C.
- MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 2013b. Decreto No. 1375 por el cual se reglamentan las colecciones biológicas. Ministerio de Ambiente y

- Desarrollo Sostenible. Bogotá, D.C.
- MURILLO-PACHECO, J. I., W. F. BONILLA-ROJAS & J. C. DE LAS CASAS. 2013. Listado y anotaciones sobre la historia natural de las aves del litoral de San Andrés de Tumaco, Nariño (Colombia). *Biota Colombiana* 14: 273-287.
- NARANJO, L.G. 2008. El arcano de la ornitología colombiana. *Ornitología Colombiana* 7: 5-16.
- NARANJO, L. G. & F. A. ESTELA. 1999. Inventario de la avifauna de un área suburbana de Cali. *Boletín SAO* 10: 11-27.
- NEGRET, A. J. & B. ORTIZ. 1989. Historia de la colonización del Gorrión Europeo (*Passer domesticus*) en América y los primeros ejemplares para Colombia. *Novedades Colombianas, Nueva Época* 1: 21-28.
- NEMOGÁ, G. R. & D. A. ROJAS. 2007. Algunas lecciones sobre el acceso a recursos genéticos en Colombia. Dos estudios de caso. *Acta Biológica Colombiana* 14: 137-160.
- OCAMPO-PEÑUELA, N. & A. ETTER. 2013. Contribution of different forest types to the bird community of a savanna landscape in Colombia. *Ornitología Neotropical* 24: 35-53.
- OLACIREGUI, C., A. QUEVEDO, F. GONZÁLEZ & L. F. BARRERA. 2016. Range extensions and noteworthy records of birds from the Serranía de Abibe, north-west Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 136: 243-262.
- OLIVARES, A. 1969. Aves de Cundinamarca. Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia. Editorial Tercer Mundo.
- OLIVARES, A. 1974. Aves de la Orinoquía Colombiana. Centro de Desarrollo Integrado 'Las Gaviotas' Orinoquía Colombiana. Imprenta Nacional. Bogotá.
- O'NEILL, J. P., D. F. LANE & L. N. NAKA. 2011. A cryptic new species of thrush (Turdidae: *Turdus*) from western Amazonia. *The Condor* 113: 869-880.
- PÉREZ-EMÁN, J. L., J. P. FERREIRA, N. GUTIÉRREZ-PINTO, A. M. CUERVO, L. N. CÉSPEDES, C. C. WITT & C. D. CADENA. 2017. An extinct hummingbird species that never was: a cautionary tale about sampling issues in molecular phylogenetics. *bioRxiv* 149898.
- PIACENTINI, V. D. Q., A. ALEIXO, C. E. AGNE, G. N. MAURÍCIO, J. F. PACHECO, G. A. BRAVO, G. R. R. BRITO, L. N. NAKA, F. OLMO, S. POSSO, L. F. SILVEIRA, G. S. BETINI, E. CARRANO, I. FRANZ, A. C. LEES, L. M. LIMA, D. PIOLI, F. SCHUNCK, F. RAPOSO DO AMARAL, G. A. BENCKE, M. COHN-HAFT, L. F. A. FIGUEIREDO, F. C. STRAUBE & E. CESARI. 2015. Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee. *Revista Brasileira de Ornitología* 23: 90-298.
- REMSEN, J. V., JR 1977. On taking field notes. *American Birds* 31: 946-953.
- REMSEN, J. V., JR., J. I. ARETA, C. D. CADENA, S. CLARAMUNT, A. JARAMILLO, J. F. PACHECO, J. PÉREZ-EMÁN, M. B. ROBBINS, F. G. STILES, D. F. STOTZ & K. J. ZIMMER. 2017. A classification of the bird species of South America. *American Ornithological Society*. Version 28 April. <http://>
- www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm
- RENIFO, L. M., A. REPIZZO, J. M. RUIZ-OVALLE, S. OCAMPO & J. E. AVENDAÑO. 2017. New bird distributional data from Cerro Tacarcuna, with implications for conservation in the Darién highlands of Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 137: 46-66.
- RIDGELY, R. S. & J. GWYNNE. 1989. *A Guide to the Birds of Panama with Costa Rica, Nicaragua and Honduras*, 2 ed. Princeton University Press, Princeton NJ.
- RIDGELY, R. S. & G. TUDOR. 1989. *The Birds of South America. Volume 1: The Oscine Passerines*. University of Texas Press, Austin, USA.
- RIDGELY, R. S. & G. TUDOR. 1994. *The Birds of South America. Volume 2: The Suboscine Passerines*. University of Texas Press, Austin, USA.
- ROJAS, R. & W. PIRAGUA. 2000. Afinidades biogeográficas y aspectos ecológicos de la avifauna de Caño Limón, Arauca, Colombia. *Crónica forestal y del Medio Ambiente* 15: 1-26.
- SALAMAN, P. G. W., T. CUADROS, J. G. JARAMILLO & W. H. WEBER. 2001. *Lista de Chequeo de las Aves de Colombia*. Sociedad Antioqueña de Ornitología, Medellín, Colombia.
- SALAMAN, P. G. W., T. M. DONEGAN & A. M. CUERVO. 2002a. New distributional bird records from Serranía de San Lucas and adjacent Central Cordillera of Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 122: 285-303.
- SALAMAN, P. G. W., F. G. STILES, C. I. BOHÓRQUEZ, M. ÁLVAREZ-R, A. M. UMAÑA, T. M. DONEGAN & A. M. CUERVO. 2002b. New and noteworthy bird records from the east slope of the Andes of Colombia. *Caldasia* 24: 157-189.
- SALAMAN, P., N. BAYLY, R. BURRIDGE, M. GRANTHAM, M. GURNEY, A. QUEVEDO, L. E. UREÑA & T. M. DONEGAN. 2008. Sixteen bird species new for Colombia. *Conservación Colombiana* 5: 80-85.
- SIBLEY, C. G. & J. E. AHLQUIST. 1990. *Phylogeny and Classification of Birds*. Yale Univ. Press, New Haven, Connecticut.
- STILES, F. G. 1998. Especies de aves endémicas y casi endémicas de Colombia. Págs. 378-385 y 428-432 en: Chaves, M. E. & N. Arango. (Eds.). *Informe Nacional sobre el estado de la biodiversidad 1998-Colombia*. Instituto Alexander von Humboldt, PNUMA, Ministerio del Medio Ambiente, Santa Fé de Bogotá.
- STILES, F. G. 2010. La avifauna de la parte media del Río Apaporis, departamentos de Vaupés y Amazonas, Colombia. *Revista Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* 132: 381-390.
- STILES, F. G., & J. BECKERS. 2015. Un inventario de las aves de la región de Inírida, Guainía, Colombia. *Ornitología Colombiana* 15: 19-50.
- STILES, F. G., J. L. TELLERÍA & M. DÍAZ. 1995. Observaciones sobre la composición, ecología y zoogeografía de la

- avifauna de la Sierra de Chiribiquete, Caquetá, Colombia. *Caldasia* 17: 481-500.
- STREWE, R. & C. NAVARRO. 2003. New distributional records and conservation importance of the San Salvador valley, Sierra Nevada de Santa Marta, northern Colombia. *Ornitología Colombiana* 1: 29-41.
- STREWE, R. & C. NAVARRO. 2004. New and noteworthy records of birds from the Sierra Nevada de Santa Marta region, north-eastern Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 124: 38-51.
- SUÁREZ-SANABRIA, N. & C. D. CADENA. 2014. Diversidad y estructura de la avifauna del Valle de Lagunillas, Parque Nacional Natural El Cocuy, Colombia. *Ornitología Colombiana* 14: 48-61.
- TOBIAS, J. A., N. SEDDON, C. N. SPOTTISWOODE, J. D. PILGRIM, L. D. C. FISHPOOL, & N. J. COLLAR. 2010. Quantitative criteria for species delimitation. *Ibis* 152: 724-746.
- TODD, W. E. C. & M. A. CARRIKER, JR. 1922. The birds of the Santa Marta region of Colombia: a study in altitudinal distribution. *Annals of Carnegie Museum* 14.

Recibido: 13 de febrero de 2017 *Aceptado:* 28 de agosto de 2017

Editor Ad hoc

Alejandro Rico-Guevara

Evaluadores

Steven Hilty / Nick Bayly / Luis Germán Naranjo / Anónimo

Citación: AVENDAÑO, J. E., C. I. BOHÓRQUEZ, L. ROSELLI, D. ARZUAZA-BUELVAS, F. A. ESTELA, A. M. CUERVO, F. G. STILES & L. M. RENJIFO. 2017. Lista de chequeo de las aves de Colombia: Una síntesis del estado del conocimiento desde Hilty & Brown (1986). *Ornitología Colombiana* 16:eA01.

Anexo 1. Lista de chequeo de las aves de Colombia

La nomenclatura y taxonomía siguen al SACC (Remsen *et al.* 2017, versión abril 28).

Estado: R=residente; R-E=endémico; Mb=migratorio boreal; Ma=migratorio austral; MI=migratorio intratropical; V=errático; EX=extinto; Int=introducido; ?=incierto; H=especie hipotética.

Evidencia: Esp=espécimen depositado en un museo nacional o extranjero; Foto=fotografía publicada; Grab=registro sonoro o filmico depositado y/o publicado; Obs=observación documentada y/o publicada. Los superíndices indican la fuente bibliográfica (Anexo 4) de las especies nuevas para el país (especies nuevas y primeros registros) adicionadas posterior a Hilty & Brown (1986).

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|--------------|-----------|----------------------------------|------------------------------|--------|------------------------|
| Tinamiformes | Tinamidae | <i>Nothocercus julius</i> | Tawny-breasted Tinamou | R | |
| Tinamiformes | Tinamidae | <i>Nothocercus bonapartei</i> | Highland Tinamou | R | |
| Tinamiformes | Tinamidae | <i>Tinamus tao</i> | Gray Tinamou | R | |
| Tinamiformes | Tinamidae | <i>Tinamus osgoodi</i> | Black Tinamou | R | |
| Tinamiformes | Tinamidae | <i>Tinamus major</i> | Great Tinamou | R | |
| Tinamiformes | Tinamidae | <i>Tinamus guttatus</i> | White-throated Tinamou | R | |
| Tinamiformes | Tinamidae | <i>Crypturellus berlepschi</i> | Berlepsch's Tinamou | R | |
| Tinamiformes | Tinamidae | <i>Crypturellus cinereus</i> | Cinereous Tinamou | R | |
| Tinamiformes | Tinamidae | <i>Crypturellus soui</i> | Little Tinamou | R | |
| Tinamiformes | Tinamidae | <i>Crypturellus obsoletus</i> | Brown Tinamou | R | |
| Tinamiformes | Tinamidae | <i>Crypturellus undulatus</i> | Undulated Tinamou | R | |
| Tinamiformes | Tinamidae | <i>Crypturellus duidae</i> | Gray-legged Tinamou | R | |
| Tinamiformes | Tinamidae | <i>Crypturellus erythropus</i> | Red-legged Tinamou | R | |
| Tinamiformes | Tinamidae | <i>Crypturellus kerriae</i> | Choco Tinamou | R | |
| Tinamiformes | Tinamidae | <i>Crypturellus variegatus</i> | Variegated Tinamou | R | |
| Tinamiformes | Tinamidae | <i>Crypturellus brevirostris</i> | Rusty Tinamou | H | Obs ^{229,230} |
| Tinamiformes | Tinamidae | <i>Crypturellus casiquiare</i> | Barred Tinamou | R | |
| Anseriformes | Anhimidae | <i>Anhima cornuta</i> | Southern Screamer | R | |
| Anseriformes | Anhimidae | <i>Chauna chavaria</i> | Northern Screamer | R | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Dendrocygna bicolor</i> | Fulvous Whistling-Duck | R | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Dendrocygna viduata</i> | White-faced Whistling-Duck | R | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Dendrocygna autumnalis</i> | Black-bellied Whistling-Duck | R | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Oressochen jubatus</i> | Orinoco Goose | R | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Cairina moschata</i> | Muscovy Duck | R | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Sarkidiornis melanotos</i> | Comb Duck | R | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Amazonetta brasiliensis</i> | Brazilian Teal | R-Ma? | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Merganetta armata</i> | Torrent Duck | R | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas americana</i> | American Wigeon | Mb | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas strepera</i> | Gadwall | V | Foto ²⁹⁸ |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas crecca</i> | Green-winged Teal | V | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas andium</i> | Andean Teal | R | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas acuta</i> | Northern Pintail | Mb | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas georgica</i> | Yellow-billed Pintail | R | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas bahamensis</i> | White-cheeked Pintail | R | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas puna</i> | Puna Teal | H | Obs ³²³ |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas discors</i> | Blue-winged Teal | Mb-R | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas cyanoptera</i> | Cinnamon Teal | R-Mb | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas clypeata</i> | Northern Shoveler | Mb | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Netta erythrophthalma</i> | Southern Pochard | R | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Aythya collaris</i> | Ring-necked Duck | V | Esp ³¹⁸ |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Aythya affinis</i> | Lesser Scaup | Mb | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Melanitta americana</i> | Black Scoter | H | Obs ¹⁰⁷ |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Mergus serrator</i> | Red-breasted Merganser | Mb | Foto ³⁵⁵ |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|--|
| Anseriformes | Anatidae | <i>Nomonyx dominicus</i> | Masked Duck | R | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Oxyura jamaicensis</i> | Ruddy Duck | R-Mb? | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Chamaepetes goudotii</i> | Sickle-winged Guan | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Penelope argyrotis</i> | Band-tailed Guan | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Penelope ortonii</i> | Baudo Guan | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Penelope montagnii</i> | Andean Guan | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Penelope jacquacu</i> | Spix's Guan | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Penelope purpurascens</i> | Crested Guan | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Penelope perspicax</i> | Cauca Guan | R-E | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Pipile cumanensis</i> | Blue-throated Piping-Guan | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Aburria aburri</i> | Wattled Guan | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Ortalis cinereiceps</i> | Gray-headed Chachalaca | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Ortalis garrula</i> | Chestnut-winged Chachalaca | R-E | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Ortalis ruficauda</i> | Rufous-vented Chachalaca | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Ortalis erythroptera</i> | Rufous-headed Chachalaca | R | Foto ³²³ Obs ³³⁶ |
| Galliformes | Cracidae | <i>Ortalis columbiana</i> | Colombian Chachalaca | R-E | Esp ^{87,312} |
| Galliformes | Cracidae | <i>Ortalis guttata</i> | Speckled Chachalaca | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Ortalis motmot</i> | Variable Chachalaca | H | Obs ³²⁴ |
| Galliformes | Cracidae | <i>Nothocrax urumutum</i> | Nocturnal Curassow | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Crax rubra</i> | Great Curassow | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Crax alberti</i> | Blue-billed Curassow | R-E | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Crax daubentoni</i> | Yellow-knobbed Curassow | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Crax alector</i> | Black Curassow | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Crax globulosa</i> | Wattled Curassow | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Mitu tomentosum</i> | Crestless Curassow | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Mitu salvini</i> | Salvin's Curassow | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Mitu tuberosum</i> | Razor-billed Curassow | R | |
| Galliformes | Cracidae | <i>Pauxi pauxi</i> | Helmeted Curassow | R | |
| Galliformes | Odontophoridae | <i>Rhynchortyx cinctus</i> | Tawny-faced Quail | R | |
| Galliformes | Odontophoridae | <i>Colinus cristatus</i> | Crested Bobwhite | R | |
| Galliformes | Odontophoridae | <i>Odontophorus gujanensis</i> | Marbled Wood-Quail | R | |
| Galliformes | Odontophoridae | <i>Odontophorus atrifrons</i> | Black-fronted Wood-Quail | R | |
| Galliformes | Odontophoridae | <i>Odontophorus erythrops</i> | Rufous-fronted Wood-Quail | R | |
| Galliformes | Odontophoridae | <i>Odontophorus hyperythrus</i> | Chestnut Wood-Quail | R-E | |
| Galliformes | Odontophoridae | <i>Odontophorus melanotus</i> | Dark-backed Wood-Quail | R | |
| Galliformes | Odontophoridae | <i>Odontophorus speciosus</i> | Rufous-breasted Wood-Quail | R | Grab ²⁴⁸ |
| Galliformes | Odontophoridae | <i>Odontophorus dialeucus</i> | Tacarcuna Wood-Quail | R | |
| Galliformes | Odontophoridae | <i>Odontophorus strophioides</i> | Gogeted Wood-Quail | R-E | |
| Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | <i>Phoenicopterus ruber</i> | Greater Flamingo | R | |
| Podicipediformes | Podicipedidae | <i>Tachybaptus dominicus</i> | Least Grebe | R | |
| Podicipediformes | Podicipedidae | <i>Podilymbus podiceps</i> | Pied-billed Grebe | R | |
| Podicipediformes | Podicipedidae | <i>Podiceps andinus</i> | Colombian Grebe | E-EX | |
| Podicipediformes | Podicipedidae | <i>Podiceps occipitalis</i> | Silvery Grebe | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columba livia</i> | Rock Pigeon | Int | Obs ¹⁷ |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Patagioenas leucocephala</i> | White-crowned Pigeon | R | Esp ²²⁰ Obs ¹²⁵ |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Patagioenas speciosa</i> | Scaled Pigeon | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Patagioenas corensis</i> | Bare-eyed Pigeon | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Patagioenas fasciata</i> | Band-tailed Pigeon | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Patagioenas cayennensis</i> | Pale-vented Pigeon | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Patagioenas plumbea</i> | Plumbeous Pigeon | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Patagioenas subvinacea</i> | Ruddy Pigeon | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Patagioenas nigrirostris</i> | Short-billed Pigeon | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Patagioenas goodsoni</i> | Dusky Pigeon | R | |

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|--|
| Columbiformes | Columbidae | <i>Geotrygon purpurata</i> | Purple Quail-Dove | R | Esp ¹¹⁰ |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Geotrygon saphirina</i> | Sapphire Quail-Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Geotrygon montana</i> | Ruddy Quail-Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Geotrygon violacea</i> | Violaceous Quail-Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Leptotrygon veraguensis</i> | Olive-backed Quail-Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Leptotila verreauxi</i> | White-tipped Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Leptotila cassinii</i> | Gray-chested Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Leptotila conoveri</i> | Tolima Dove | R-E | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Leptotila plumbeiceps</i> | Gray-headed Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Leptotila rufaxilla</i> | Gray-fronted Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Leptotila jamaicensis</i> | Caribbean Dove | R | Esp ⁸⁷ |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Leptotila pallida</i> | Pallid Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Zentrygon frenata</i> | White-throated Quail-Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Zentrygon linearis</i> | Lined Quail-Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Zentrygon goldmani</i> | Russet-crowned Quail-Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Zenaida asiatica</i> | White-winged Dove | V | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Zenaida auriculata</i> | Eared Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Zenaida macroura</i> | Mourning Dove | V | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columbina passerina</i> | Common Ground-Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columbina minuta</i> | Plain-breasted Ground-Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columbina talpacoti</i> | Ruddy Ground-Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columbina buckleyi</i> | Ecuadorian Ground-Dove | R | Esp ²⁵¹ Obs ²²⁶ |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columbina squammata</i> | Scaled Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columbina picui</i> | Picui Ground-Dove | Ma | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columbina cruziana</i> | Croaking Ground-Dove | R | Esp ^{251,226} Foto ²⁹⁸ |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Claravis pretiosa</i> | Blue Ground-Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Claravis mondetoura</i> | Maroon-chested Ground-Dove | R | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Metriopelia melanoptera</i> | Black-winged Ground-Dove | R | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Crotophaga major</i> | Greater Ani | R-MI | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Crotophaga ani</i> | Smooth-billed Ani | R | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Crotophaga sulcirostris</i> | Groove-billed Ani | R | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Tapera naevia</i> | Striped Cuckoo | R | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Dromococcyx phasianellus</i> | Pheasant Cuckoo | R | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Dromococcyx pavoninus</i> | Pavonine Cuckoo | R | Esp ⁸³ Grab ⁸³ |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Neomorphus geoffroyi</i> | Rufous-vented Ground-Cuckoo | R | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Neomorphus radiolosus</i> | Banded Ground-Cuckoo | R | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Neomorphus rufipennis</i> | Rufous-winged Ground-Cuckoo | H | Obs ³³² |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Neomorphus pucheranii</i> | Red-billed Ground-Cuckoo | R | Grab ¹⁷⁰ |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Coccycua minuta</i> | Little Cuckoo | R | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Coccycua pumila</i> | Dwarf Cuckoo | R | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Coccycua cinerea</i> | Ash-colored Cuckoo | H | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Piaya cayana</i> | Squirrel Cuckoo | R | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Piaya melanogaster</i> | Black-bellied Cuckoo | R | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Coccyzus melacoryphus</i> | Dark-billed Cuckoo | R | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Coccyzus americanus</i> | Yellow-billed Cuckoo | Mb | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Coccyzus euleri</i> | Pearly-breasted Cuckoo | V | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Coccyzus minor</i> | Mangrove Cuckoo | V | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Coccyzus erythrophthalmus</i> | Black-billed Cuckoo | Mb | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Coccyzus lansbergii</i> | Gray-capped Cuckoo | R | |
| Steatornithiformes | Steatornithidae | <i>Steatornis caripensis</i> | Oilbird | R | |
| Nyctibiiformes | Nyctibiidae | <i>Nyctibius grandis</i> | Great Potoo | R | |
| Nyctibiiformes | Nyctibiidae | <i>Nyctibius aethereus</i> | Long-tailed Potoo | R | |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|---|
| Nyctibiiformes | Nyctibiidae | <i>Nyctibius griseus</i> | Common Potoo | R | |
| Nyctibiiformes | Nyctibiidae | <i>Nyctibius maculosus</i> | Andean Potoo | R | |
| Nyctibiiformes | Nyctibiidae | <i>Nyctibius bracteatus</i> | Rufous Potoo | R? | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Chordeiles nacunda</i> | Nacunda Nighthawk | R | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Chordeiles pusillus</i> | Least Nighthawk | R | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Chordeiles rupestris</i> | Sand-colored Nighthawk | R | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Chordeiles acutipennis</i> | Lesser Nighthawk | R-Mb | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Chordeiles minor</i> | Common Nighthawk | Mb | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Lurocalis semitorquatus</i> | Short-tailed Nighthawk | R | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Lurocalis rufiventris</i> | Rufous-bellied Nighthawk | R | Esp ⁸⁷ |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Nyctiprogne leucopyga</i> | Band-tailed Nighthawk | R | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Nyctipolus nigrescens</i> | Blackish Nightjar | R | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Systellura longirostris</i> | Band-winged Nightjar | R | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Nyctidromus albicollis</i> | Common Pauraque | R | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Uropsalis segmentata</i> | Swallow-tailed Nightjar | R | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Uropsalis lyra</i> | Lyre-tailed Nightjar | R | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Setopagis heterura</i> | Todd's Nightjar | R | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Hydropsalis cayennensis</i> | White-tailed Nightjar | R | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Hydropsalis maculicaudus</i> | Spot-tailed Nightjar | R | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Hydropsalis climacocerca</i> | Ladder-tailed Nightjar | R | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Nyctiphrynus rosenbergi</i> | Choco Poorwill | R | Esp ^{281,312} Obs ³⁵⁷ |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Nyctiphrynus ocellatus</i> | Ocellated Poorwill | R | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Antrostomus carolinensis</i> | Chuck-will's-widow | Mb | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Antrostomus rufus</i> | Rufous Nightjar | R | |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Cypseloides cherriei</i> | Spot-fronted Swift | R | |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Cypseloides cryptus</i> | White-chinned Swift | R | |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Cypseloides niger</i> | Black Swift | Mb | Esp ³²⁹ |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Cypseloides lemosi</i> | White-chested Swift | R | |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Streptoprocne rutila</i> | Chestnut-collared Swift | R | |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Streptoprocne zonaris</i> | White-collared Swift | R | |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Chaetura spinicaudus</i> | Band-rumped Swift | R | |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Chaetura cinereiventris</i> | Gray-rumped Swift | R | |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Chaetura egrebia</i> | Pale-rumped Swift | V | Foto ¹⁷⁰ |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Chaetura pelagica</i> | Chimney Swift | Mb | |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Chaetura chapmani</i> | Chapman's Swift | R | |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Chaetura viridipennis</i> | Amazonian Swift | R? | Esp ²⁰³ |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Chaetura meridionalis</i> | Sick's Swift | Ma | |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Chaetura brachyura</i> | Short-tailed Swift | R | |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Aeronautes montivagus</i> | White-tipped Swift | R | |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Tachornis furcata</i> | Pygmy Swift | R | |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Tachornis squamata</i> | Fork-tailed Palm-Swift | R | |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Panyptila cayennensis</i> | Lesser Swallow-tailed Swift | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Topaza pyra</i> | Fiery Topaz | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Florisuga mellivora</i> | White-necked Jacobin | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Eutoxeres aquila</i> | White-tipped Sicklebill | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Eutoxeres condamini</i> | Buff-tailed Sicklebill | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Glaucis aeneus</i> | Bronzy Hermit | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Glaucis hirsutus</i> | Rufous-breasted Hermit | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Threnetes ruckeri</i> | Band-tailed Barbthroat | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Threnetes leucurus</i> | Pale-tailed Barbthroat | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Phaethornis rupurumii</i> | Streak-throated Hermit | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Phaethornis atrimentalis</i> | Black-throated Hermit | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Phaethornis striigularis</i> | Stripe-throated Hermit | R | |

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|-------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------------|
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Phaethornis griseogularis</i> | Gray-chinned Hermit | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Phaethornis ruber</i> | Reddish Hermit | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Phaethornis augusti</i> | Sooty-capped Hermit | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Phaethornis anthophilus</i> | Pale-bellied Hermit | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Phaethornis hispidus</i> | White-bearded Hermit | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Phaethornis yaruqui</i> | White-whiskered Hermit | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Phaethornis guy</i> | Green Hermit | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Phaethornis syrmatophorus</i> | Tawny-bellied Hermit | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Phaethornis bourcieri</i> | Straight-billed Hermit | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Phaethornis longirostris</i> | Long-billed Hermit | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Phaethornis malaris</i> | Great-billed Hermit | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Doryfera ludovicae</i> | Green-fronted Lancebill | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Doryfera johannae</i> | Blue-fronted Lancebill | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Schistes geoffroyi</i> | Wedge-billed Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Colibri delphinae</i> | Brown Violetear | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Colibri thalassinus</i> | Green Violetear | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Colibri coruscans</i> | Sparkling Violetear | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Androdon aequatorialis</i> | Tooth-billed Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliothryx barroti</i> | Purple-crowned Fairy | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliothryx auritus</i> | Black-eared Fairy | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Polytmus guainumbi</i> | White-tailed Goldenthroat | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Polytmus theresiae</i> | Green-tailed Goldenthroat | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Avocettula recurvirostris</i> | Fiery-tailed Awlbill | V | Foto ¹⁷⁰ |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chrysolampis mosquitis</i> | Ruby-topaz Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Anthracothorax prevostii</i> | Green-breasted Mango | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Anthracothorax nigricollis</i> | Black-throated Mango | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliangelus mavora</i> | Orange-throated Sunangel | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliangelus amethysticollis</i> | Amethyst-throated Sunangel | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliangelus strophianus</i> | Gorgeted Sunangel | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliangelus exortis</i> | Tourmaline Sunangel | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Discosura conversii</i> | Green Thorntail | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Discosura popelairii</i> | Wire-crested Thorntail | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Discosura langsdorffi</i> | Black-bellied Thorntail | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Discosura longicaudus</i> | Racket-tailed Coquette | R | Esp ⁸ |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Lophornis delattrei</i> | Rufous-crested Coquette | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Lophornis stictolophus</i> | Spangled Coquette | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Lophornis chalybeus</i> | Festive Coquette | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Phlogophilus hemileucurus</i> | Ecuadorian Piedtail | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Adelomyia melanogenys</i> | Speckled Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Anthocephala floriceps</i> | Santa Marta Blossomcrown | R-E | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Anthocephala berlepschi</i> | Tolima Blossomcrown | R-E | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Aglaiaocercus kingi</i> | Long-tailed Sylph | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Aglaiaocercus coelestis</i> | Violet-tailed Sylph | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Oreotrochilus chimborazo</i> | Ecuadorian Hillstar | R | Foto ³⁰⁴ |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Opisthoprora euryptera</i> | Mountain Avocetbill | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Lesbia victoriae</i> | Black-tailed Trainbearer | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Lesbia nuna</i> | Green-tailed Trainbearer | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Ramphomicron dorsale</i> | Black-backed Thornbill | R-E | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Ramphomicron microrhynchum</i> | Purple-backed Thornbill | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chalcostigma ruficeps</i> | Rufous-capped Thornbill | V | Esp ³⁰⁷ |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chalcostigma stanleyi</i> | Blue-mantled Thornbill | R? | Esp ²⁹⁸ Obs ¹¹² |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chalcostigma heteropogon</i> | Bronze-tailed Thornbill | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chalcostigma herrani</i> | Rainbow-bearded Thornbill | R | |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Oxypogon stabelii</i> | Buffy Helmetcrest | R-E | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Oxypogon cyanolaemus</i> | Blue-bearded Helmetcrest | R-E | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Oxypogon guerinii</i> | Green-bearded Helmetcrest | R-E | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Metallura tyrianthina</i> | Tyrian Metaltail | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Metallura iracunda</i> | Perija Metaltail | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Metallura williami</i> | Viridian Metaltail | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Haplophaedia aureliae</i> | Greenish Puffleg | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Haplophaedia lugens</i> | Hoary Puffleg | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Eriocnemis isabellae</i> | Gorgeted Puffleg | R-E | Esp ⁷¹ |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Eriocnemis vestita</i> | Glowing Puffleg | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Eriocnemis derbyi</i> | Black-thighed Puffleg | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Eriocnemis godini</i> | Turquoise-throated Puffleg | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Eriocnemis cupreoventris</i> | Coppery-bellied Puffleg | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Eriocnemis luciani</i> | Sapphire-vented Puffleg | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Eriocnemis mosquera</i> | Golden-breasted Puffleg | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Eriocnemis mirabilis</i> | Colorful Puffleg | R-E | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Eriocnemis aline</i> | Emerald-bellied Puffleg | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Aglaeactis cupripennis</i> | Shining Sunbeam | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Coeligena coeligena</i> | Bronzy Inca | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Coeligena wilsoni</i> | Brown Inca | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Coeligena prunellei</i> | Black Inca | R-E | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Coeligena torquata</i> | Collared Inca | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Coeligena phalerata</i> | White-tailed Starfrontlet | R-E | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Coeligena orina</i> | Dusky Starfrontlet | R-E | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Coeligena lutetiae</i> | Buff-winged Starfrontlet | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Coeligena bonapartei</i> | Golden-bellied Starfrontlet | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Coeligena helianthea</i> | Blue-throated Starfrontlet | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Lafresnaya lafresnayi</i> | Mountain Velvetbreast | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Ensifera ensifera</i> | Sword-billed Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Pterophanes cyanopterus</i> | Great Sapphirewing | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Boissonneaua flavescens</i> | Buff-tailed Coronet | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Boissonneaua matthewsi</i> | Chestnut-breasted Coronet | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Boissonneaua jardini</i> | Velvet-purple Coronet | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Ocreatus underwoodii</i> | Booted Racket-tail | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Urochroa bougueri</i> | White-tailed Hillstar | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Urosticte benjamini</i> | Purple-bibbed Whitetip | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Urosticte ruficrissa</i> | Rufous-vented Whitetip | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliodoxa gularis</i> | Pink-throated Brilliant | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliodoxa schreibersii</i> | Black-throated Brilliant | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliodoxa aurescens</i> | Gould's Jewelfront | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliodoxa rubinoides</i> | Fawn-breasted Brilliant | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliodoxa jacula</i> | Green-crowned Brilliant | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliodoxa imperatrix</i> | Empress Brilliant | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliodoxa leadbeateri</i> | Violet-fronted Brilliant | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Patagona gigas</i> | Giant Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Sternoclyta cyanopectus</i> | Violet-chested Hummingbird | R | Esp ⁶⁹ |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliomaster longirostris</i> | Long-billed Starthroat | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliomaster furcifer</i> | Blue-tufted Starthroat | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chaetocercus mulsant</i> | White-bellied Woodstar | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chaetocercus bombus</i> | Little Woodstar | H | Obs ³⁰⁴ |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chaetocercus heliodor</i> | Gorgeted Woodstar | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chaetocercus astreans</i> | Santa Marta Woodstar | R-E | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chaetocercus jourdanii</i> | Rufous-shafted Woodstar | R | |

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|--|
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Calliphlox amethystina</i> | Amethyst Woodstar | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Calliphlox mitchellii</i> | Purple-throated Woodstar | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chlorostilbon melanorhynchus</i> | Western Emerald | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chlorostilbon gibsoni</i> | Red-billed Emerald | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chlorostilbon mellisugus</i> | Blue-tailed Emerald | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chlorostilbon olivaresi</i> | Chiribiquete Emerald | R-E | Esp ³¹⁶ |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chlorostilbon russatus</i> | Coppery Emerald | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chlorostilbon stenurus</i> | Narrow-tailed Emerald | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chlorostilbon poortmani</i> | Short-tailed Emerald | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chlorestes notata</i> | Blue-chinned Sapphire | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Klais guimeti</i> | Violet-headed Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Phaeochroa cuvierii</i> | Scaly-breasted Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Campylopterus largipennis</i> | Gray-breasted Sabrewing | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Campylopterus falcatus</i> | Lazuline Sabrewing | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Campylopterus phainopeplus</i> | Santa Marta Sabrewing | R-E | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Campylopterus villaviscensio</i> | Napo Sabrewing | R | Esp ³⁰⁶ Foto ³⁰⁴ |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chalybura buffonii</i> | White-vented Plumeleteer | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chalybura urochrysia</i> | Bronze-tailed Plumeleteer | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Thalurania colombica</i> | Purple-crowned Woodnymph | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Thalurania furcata</i> | Fork-tailed Woodnymph | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Taphrospilus hypostictus</i> | Many-spotted Hummingbird | R | Esp ⁶⁹ |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Leucippus fallax</i> | Buffy Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Leucippus chlorocercus</i> | Olive-spotted Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Amazilia tzacatl</i> | Rufous-tailed Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Amazilia castaneiventris</i> | Chestnut-bellied Hummingbird | R-E | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Amazilia versicolor</i> | Versicolored Emerald | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Amazilia franciae</i> | Andean Emerald | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Amazilia fimbriata</i> | Glittering-throated Emerald | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Amazilia amabilis</i> | Blue-chested Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Amazilia rosenbergi</i> | Purple-chested Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Amazilia saucerottei</i> | Steely-vented Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Amazilia cyanifrons</i> | Indigo-capped Hummingbird | R-E | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Amazilia edward</i> | Snowy-bellied Hummingbird | R | Foto ⁶⁵ |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Amazilia viridigaster</i> | Green-bellied Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Chrysuronia oenone</i> | Golden-tailed Sapphire | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Goethalsia bella</i> | Pirre Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Goldmania violiceps</i> | Violet-capped Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Lepidopyga coeruleogularis</i> | Sapphire-throated Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Lepidopyga lilliae</i> | Sapphire-bellied Hummingbird | R-E | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Lepidopyga goudoti</i> | Shining-green Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Damophila julie</i> | Violet-bellied Hummingbird | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Hylocharis eliciae</i> | Blue-throated Goldentail | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Hylocharis sapphirina</i> | Rufous-throated Sapphire | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Hylocharis cyanus</i> | White-chinned Sapphire | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Hylocharis humboldtii</i> | Humboldt's Sapphire | R | |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Hylocharis grayi</i> | Blue-headed Sapphire | R | |
| Opistocomiformes | Opistocomidae | <i>Opisthocomus hoazin</i> | Hoatzin | R | |
| Gruiformes | Aramidae | <i>Aramus guarauna</i> | Limpkin | R | |
| Gruiformes | Psophiidae | <i>Psophia crepitans</i> | Gray-winged Trumpeter | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Coturnicops notatus</i> | Speckled Rail | V | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Micropygia schomburgkii</i> | Ocellated Crake | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Rallus longirostris</i> | Clapper Rail | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Rallus limicola</i> | Virginia Rail | R | |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|-----------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|--------|--|
| Gruiformes | Rallidae | <i>Rallus semiplumbeus</i> | Bogota Rail | R-E | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Aramides wolfi</i> | Brown Wood-Rail | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Aramides cajaneus</i> | Gray-necked Wood-Rail | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Aramides axillaris</i> | Rufous-necked Wood-Rail | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Amaurolimnas concolor</i> | Uniform Crake | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Anurolimnas castaneiceps</i> | Chestnut-headed Crake | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Anurolimnas viridis</i> | Russet-crowned Crake | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Anurolimnas fasciatus</i> | Black-banded Crake | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Laterallus melanophaius</i> | Rufous-sided Crake | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Laterallus albicularis</i> | White-throated Crake | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Laterallus exilis</i> | Gray-breasted Crake | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Laterallus jamaicensis</i> | Black Rail | V | Esp ^{157,158} |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Porzana flaviventer</i> | Yellow-breasted Crake | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Porzana carolina</i> | Sora | Mb | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Porphyriops melanops</i> | Spot-flanked Gallinule | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Mustelirallus albicollis</i> | Ash-throated Crake | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Mustelirallus colombianus</i> | Colombian Crake | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Mustelirallus erythrops</i> | Paint-billed Crake | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Pardirallus maculatus</i> | Spotted Rail | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Pardirallus nigricans</i> | Blackish Rail | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Gallinula galeata</i> | Common Gallinule | R-Mb? | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Porphyrio martinica</i> | Purple Gallinule | R | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Porphyrio flavirostris</i> | Azure Gallinule | Ma? | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Fulica americana</i> | American Coot | R-Mb | |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Fulica ardesiaca</i> | Slate-colored Coot | R | |
| Gruiformes | Heliothrididae | <i>Heliothrids fulica</i> | Sungrebe | R | |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Pluvialis dominica</i> | American Golden-Plover | Mb | |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Pluvialis squatarola</i> | Black-bellied Plover | Mb | |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Vanellus cayanus</i> | Pied Lapwing | R | |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Vanellus chilensis</i> | Southern Lapwing | R | |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Vanellus resplendens</i> | Andean Lapwing | R | |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius semipalmatus</i> | Semipalmated Plover | Mb | |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius wilsonia</i> | Wilson's Plover | R-Mb | |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius vociferus</i> | Killdeer | Mb | |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius nivosus</i> | Snowy Plover | Mb | Foto ^{142,289} |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius collaris</i> | Collared Plover | R | |
| Charadriiformes | Haematopodidae | <i>Haematopus palliatus</i> | American Oystercatcher | R | |
| Charadriiformes | Recurvirostridae | <i>Himantopus mexicanus</i> | Black-necked Stilt | R | |
| Charadriiformes | Recurvirostridae | <i>Recurvirostra americana</i> | American Avocet | V | Foto ¹⁰⁸ |
| Charadriiformes | Burhinidae | <i>Burhinus bistriatus</i> | Double-striped Thick-knee | R | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Bartramia longicauda</i> | Upland Sandpiper | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Numenius phaeopus</i> | Whimbrel | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Numenius americanus</i> | Long-billed Curlew | H | Foto ¹⁴² |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Limosa haemastica</i> | Hudsonian Godwit | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Limosa fedoa</i> | Marbled Godwit | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Arenaria interpres</i> | Ruddy Turnstone | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris canutus</i> | Red Knot | Mb | Foto ²⁸⁸ |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris virgata</i> | Surfbird | Mb | Esp ²⁹² Obs ²⁵¹ |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris pugnax</i> | Ruff | V | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris himantopus</i> | Stilt Sandpiper | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris alba</i> | Sanderling | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris alpina</i> | Dunlin | Mb | Foto ¹³⁵ Obs ^{297,292} |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris bairdii</i> | Baird's Sandpiper | Mb | |

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|---|
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris minutilla</i> | Least Sandpiper | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris fuscicollis</i> | White-rumped Sandpiper | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris subruficollis</i> | Buff-breasted Sandpiper | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris melanotos</i> | Pectoral Sandpiper | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris pusilla</i> | Semipalmated Sandpiper | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris mauri</i> | Western Sandpiper | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Limnodromus griseus</i> | Short-billed Dowitcher | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Limnodromus scolopaceus</i> | Long-billed Dowitcher | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Gallinago imperialis</i> | Imperial Snipe | R | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Gallinago jamesoni</i> | Jameson's Snipe | R | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Gallinago nobilis</i> | Noble Snipe | R | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Gallinago undulata</i> | Giant Snipe | R | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Gallinago delicata</i> | Wilson's Snipe | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Gallinago paraguaiae</i> | South American Snipe | R | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Phalaropus tricolor</i> | Wilson's Phalarope | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Phalaropus lobatus</i> | Red-necked Phalarope | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Phalaropus fulicarius</i> | Red Phalarope | V | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Actitis macularius</i> | Spotted Sandpiper | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa solitaria</i> | Solitary Sandpiper | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa incana</i> | Wandering Tattler | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa melanoleuca</i> | Greater Yellowlegs | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa semipalmata</i> | Willet | Mb | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa flavipes</i> | Lesser Yellowlegs | Mb | |
| Charadriiformes | Jacanidae | <i>Jacana jacana</i> | Wattled Jacana | R | |
| Charadriiformes | Stercorariidae | <i>Stercorarius skua</i> | Great Skua | H | |
| Charadriiformes | Stercorariidae | <i>Stercorarius maccormicki</i> | South Polar Skua | H | Obs ¹³³ |
| Charadriiformes | Stercorariidae | <i>Stercorarius pomarinus</i> | Pomarine Jaeger | Mb | |
| Charadriiformes | Stercorariidae | <i>Stercorarius parasiticus</i> | Parasitic Jaeger | Mb | |
| Charadriiformes | Stercorariidae | <i>Stercorarius longicaudus</i> | Long-tailed Jaeger | Mb | Esp ¹³⁴ |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Creagrus furcatus</i> | Swallow-tailed Gull | R | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Xema sabini</i> | Sabine's Gull | Mb | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Chroicocephalus serranus</i> | Andean Gull | R | Foto ³³⁵ |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> | Gray-hooded Gull | V | Foto ³⁴⁴ |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | Black-headed Gull | H | Obs ^{232,134} |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Hydrocoloeus minutus</i> | Little Gull | V | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Leucophaeus modestus</i> | Gray Gull | V | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Leucophaeus atricilla</i> | Laughing Gull | Mb | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Leucophaeus pipixcan</i> | Franklin's Gull | Mb | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus delawarensis</i> | Ring-billed Gull | V | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus marinus</i> | Great Black-backed Gull | H | Obs ²³² |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus dominicanus</i> | Kelp Gull | V | Foto ¹³⁵ |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus fuscus</i> | Lesser Black-backed Gull | V | Foto ^{298,142} |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus argentatus</i> | Herring Gull | V | Esp ^{232,292} Obs ¹⁴² |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Anous stolidus</i> | Brown Noddy | R | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Anous minutus</i> | Black Noddy | R | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Gygis alba</i> | White Tern | R | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Onychoprion fuscatus</i> | Sooty Tern | V | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Onychoprion anaethetus</i> | Bridled Tern | R | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Sternula antillarum</i> | Least Tern | R-Mb | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Sternula superciliaris</i> | Yellow-billed Tern | R | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Phaetusa simplex</i> | Large-billed Tern | R | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Gelochelidon nilotica</i> | Gull-billed Tern | R | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Hydroprogne caspia</i> | Caspian Tern | Mb | |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------------|
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larosterna inca</i> | Inca Tern | H | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Chlidonias niger</i> | Black Tern | Mb | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Sterna hirundo</i> | Common Tern | Mb | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Sterna dougallii</i> | Roseate Tern | H | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Sterna paradisaea</i> | Arctic Tern | V | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Sterna hirundinacea</i> | South American Tern | H | Obs ³¹⁴ |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Sterna forsteri</i> | Forster's Tern | V | Foto ²⁸⁶ |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Thalasseus elegans</i> | Elegant Tern | Mb | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Thalasseus sandvicensis</i> | Sandwich Tern | Mb | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Thalasseus maximus</i> | Royal Tern | Mb | |
| Charadriiformes | Rynchopidae | <i>Rynchops niger</i> | Black Skimmer | R | |
| Eurypygiformes | Eurypygidae | <i>Eurypyga helias</i> | Sunbittern | R | |
| Phaethontiformes | Phaethontidae | <i>Phaethon aethereus</i> | Red-billed Tropicbird | R? | |
| Phaethontiformes | Phaethontidae | <i>Phaethon rubricauda</i> | Red-tailed Tropicbird | H | Obs ³¹⁴ |
| Phaethontiformes | Phaethontidae | <i>Phaethon lepturus</i> | White-tailed Tropicbird | H | |
| Sphenisciformes | Spheniscidae | <i>Spheniscus humboldti</i> | Humboldt Penguin | V | |
| Sphenisciformes | Spheniscidae | <i>Spheniscus mendiculus</i> | Galapagos Penguin | H | |
| Sphenisciformes | Spheniscidae | <i>Spheniscus magellanicus</i> | Magellanic Penguin | V | Esp ¹⁴⁰ |
| Procellariiformes | Diomedeidae | <i>Phoebastria irrorata</i> | Waved Albatross | V | |
| Procellariiformes | Diomedeidae | <i>Thalassarche melanophrys</i> | Black-browed Albatross | V | Foto ²³⁰ |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Daption capense</i> | Cape Petrel | V | |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma hasitata</i> | Black-capped Petrel | V | |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma phaeopygia</i> | Galapagos Petrel | V | |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma externa</i> | Juan Fernandez Petrel | H | Obs ²⁹ |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Procellaria aequinoctialis</i> | White-chinned Petrel | H | Obs ¹³⁴ |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Procellaria parkinsoni</i> | Parkinson's Petrel | V | Foto ¹²⁸ |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Procellaria westlandica</i> | Westland Petrel | V | Foto ¹²⁶ |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Calonectris diomedea</i> | Cory's Shearwater | V | Esp ²⁹⁰ |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Ardenna pacifica</i> | Wedge-tailed Shearwater | V | |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Ardenna grisea</i> | Sooty Shearwater | Ma | |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Ardenna creatopus</i> | Pink-footed Shearwater | V | Obs ²⁰² |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus nativitatis</i> | Christmas Shearwater | H | Obs ³¹⁴ |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus puffinus</i> | Manx Shearwater | H | Obs ^{213,112} |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus subalaris</i> | Galapagos Shearwater | V | Esp ^{157,112} |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus lherminieri</i> | Audubon's Shearwater | R | Esp |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pseudobulweria rostrata</i> | Tahiti Petrel | H | Obs ³⁰ |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Fregetta grallaria</i> | White-bellied Storm-Petrel | H | Obs ³¹⁴ |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Oceanites gracilis</i> | Elliot's Storm-Petrel | Ma | |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Oceanodroma microsoma</i> | Least Storm-Petrel | V | |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Oceanodroma tethys</i> | Wedge-rumped Storm-Petrel | Ma | |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Oceanodroma castro</i> | Band-rumped Storm-Petrel | H | |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Oceanodroma leucorhoa</i> | Leach's Storm-Petrel | V | Esp ^{114,134} |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Oceanodroma markhami</i> | Markham's Storm-Petrel | H | |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Oceanodroma hornbyi</i> | Ringed Storm-Petrel | V | |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Oceanodroma Melania</i> | Black Storm-Petrel | Mb | |
| Ciconiiformes | Ciconiidae | <i>Ciconia maguari</i> | Maguari Stork | R | |
| Ciconiiformes | Ciconiidae | <i>Jabiru mycteria</i> | Jabiru | R | |
| Ciconiiformes | Ciconiidae | <i>Mycteria americana</i> | Wood Stork | R | |
| Suliformes | Fregatidae | <i>Fregata magnificens</i> | Magnificent Frigatebird | R | |
| Suliformes | Fregatidae | <i>Fregata minor</i> | Great Frigatebird | R? | |
| Suliformes | Sulidae | <i>Sula nebouxii</i> | Blue-footed Booby | R | Obs ^{261,193} |

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|-----------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|
| Suliformes | Sulidae | <i>Sula variegata</i> | Peruvian Booby | V | |
| Suliformes | Sulidae | <i>Sula dactylatra</i> | Masked Booby | R | |
| Suliformes | Sulidae | <i>Sula granti</i> | Nazca Booby | R | |
| Suliformes | Sulidae | <i>Sula sula</i> | Red-footed Booby | R | |
| Suliformes | Sulidae | <i>Sula leucogaster</i> | Brown Booby | R | |
| Suliformes | Phalacrocoracidae | <i>Phalacrocorax brasiliensis</i> | Neotropic Cormorant | R | |
| Suliformes | Phalacrocoracidae | <i>Phalacrocorax bougainvillii</i> | Guanay Cormorant | V | |
| Suliformes | Phalacrocoracidae | <i>Phalacrocorax auritus</i> | Double-crested Cormorant | H | Obs ^{213,298,105} |
| Suliformes | Anhingidae | <i>Anhinga anhinga</i> | Anhinga | R | |
| Pelecaniformes | Pelecanidae | <i>Pelecanus occidentalis</i> | Brown Pelican | R | |
| Pelecaniformes | Pelecanidae | <i>Pelecanus erythrorynchus</i> | American White Pelican | V | Foto ¹³¹ |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Tigrisoma lineatum</i> | Rufescent Tiger-Heron | R | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Tigrisoma fasciatum</i> | Fasciated Tiger-Heron | R | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Tigrisoma mexicanum</i> | Bare-throated Tiger-Heron | R | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Agamia agami</i> | Agami Heron | R | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Cochlearius cochlearius</i> | Boat-billed Heron | R | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Zebrilus undulatus</i> | Zigzag Heron | R | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Botaurus pinnatus</i> | Pinnated Bittern | R? | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Ixobrychus exilis</i> | Least Bittern | R-Mb | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Ixobrychus involucris</i> | Stripe-backed Bittern | R? | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Nycticorax nycticorax</i> | Black-crowned Night-Heron | R | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Nyctanassa violacea</i> | Yellow-crowned Night-Heron | R | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Butorides virescens</i> | Green Heron | Mb | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Butorides striata</i> | Striated Heron | R | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Bubulcus ibis</i> | Cattle Egret | R | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Ardea herodias</i> | Great Blue Heron | Mb | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Ardea cocoi</i> | Cocoi Heron | R | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Ardea alba</i> | Great Egret | R | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Syrigma sibilatrix</i> | Whistling Heron | R | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Pilherodius pileatus</i> | Capped Heron | R | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Egretta tricolor</i> | Tricolored Heron | R | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Egretta rufescens</i> | Reddish Egret | R | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Egretta thula</i> | Snowy Egret | R | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Egretta caerulea</i> | Little Blue Heron | R-Mb | |
| Pelecaniformes | Threskiornithidae | <i>Eudocimus albus</i> | White Ibis | R | |
| Pelecaniformes | Threskiornithidae | <i>Eudocimus ruber</i> | Scarlet Ibis | R | |
| Pelecaniformes | Threskiornithidae | <i>Plegadis falcinellus</i> | Glossy Ibis | R | |
| Pelecaniformes | Threskiornithidae | <i>Cercibis oxycerca</i> | Sharp-tailed Ibis | R | |
| Pelecaniformes | Threskiornithidae | <i>Mesembrinibis cayennensis</i> | Green Ibis | R | |
| Pelecaniformes | Threskiornithidae | <i>Phimosus infuscatus</i> | Bare-faced Ibis | R | |
| Pelecaniformes | Threskiornithidae | <i>Theristicus caudatus</i> | Buff-necked Ibis | R | |
| Pelecaniformes | Threskiornithidae | <i>Platalea ajaja</i> | Roseate Spoonbill | R | |
| Cathartiformes | Cathartidae | <i>Cathartes aura</i> | Turkey Vulture | R-Mb | |
| Cathartiformes | Cathartidae | <i>Cathartes burrovianus</i> | Lesser Yellow-headed Vulture | R | |
| Cathartiformes | Cathartidae | <i>Cathartes melambrotus</i> | Greater Yellow-headed Vulture | R | |
| Cathartiformes | Cathartidae | <i>Coragyps atratus</i> | Black Vulture | R | |
| Cathartiformes | Cathartidae | <i>Sarcoramphus papa</i> | King Vulture | R | |
| Cathartiformes | Cathartidae | <i>Vultur gryphus</i> | Andean Condor | R | |
| Accipitriformes | Pandionidae | <i>Pandion haliaetus</i> | Osprey | Mb | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Elanus leucurus</i> | White-tailed Kite | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Gampsonyx swainsonii</i> | Pearl Kite | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Chondrohierax uncinatus</i> | Hook-billed Kite | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Leptodon cayanensis</i> | Gray-headed Kite | R | |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------|
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Elanoides forficatus</i> | Swallow-tailed Kite | R-Mb | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Morphnus guianensis</i> | Crested Eagle | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Harpia harpyja</i> | Harpy Eagle | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Spizaetus tyrannus</i> | Black Hawk-Eagle | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Spizaetus melanoleucus</i> | Black-and-white Hawk-Eagle | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Spizaetus ornatus</i> | Ornate Hawk-Eagle | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Spizaetus isidori</i> | Black-and-chestnut Eagle | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Busarellus nigricollis</i> | Black-collared Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Rostrhamus sociabilis</i> | Snail Kite | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Helicolestes hamatus</i> | Slender-billed Kite | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Harpagus bidentatus</i> | Double-toothed Kite | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Ictinia mississippiensis</i> | Mississippi Kite | Mb | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Ictinia plumbea</i> | Plumbeous Kite | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Circus cyaneus</i> | Northern Harrier | Mb | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Circus cinereus</i> | Cinereous Harrier | R? | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Circus buffoni</i> | Long-winged Harrier | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Accipiter poliogaster</i> | Gray-bellied Hawk | Ma? | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Accipiter superciliosus</i> | Tiny Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Accipiter collaris</i> | Semicollared Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Accipiter striatus</i> | Sharp-shinned Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Accipiter cooperii</i> | Cooper's Hawk | Mb | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Accipiter bicolor</i> | Bicolored Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Geranospiza caerulescens</i> | Crane Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Cryptoleucopteryx plumbea</i> | Plumbeous Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Buteogallus schistaceus</i> | Slate-colored Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Buteogallus anthracinus</i> | Common Black-Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Buteogallus meridionalis</i> | Savanna Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Buteogallus urubitinga</i> | Great Black-Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Buteogallus solitarius</i> | Solitary Eagle | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Morphnarchus princeps</i> | Barred Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Rupornis magnirostris</i> | Roadside Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Parabuteo unicinctus</i> | Harris's Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Parabuteo leucorrhous</i> | White-rumped Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Geranoaetus albicaudatus</i> | White-tailed Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Geranoaetus polyosoma</i> | Red-backed Hawk | Ma | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Geranoaetus melanoleucus</i> | Black-chested Buzzard-Eagle | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Pseudastur albicollis</i> | White Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Leucopternis semiplumbeus</i> | Semiplumbeous Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Leucopternis melanops</i> | Black-faced Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Buteo nitidus</i> | Gray Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Buteo platypterus</i> | Broad-winged Hawk | Mb | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Buteo albogularis</i> | White-throated Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Buteo brachyurus</i> | Short-tailed Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Buteo swainsoni</i> | Swainson's Hawk | Mb | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Buteo albonotatus</i> | Zone-tailed Hawk | R | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Buteo jamaicensis</i> | Red-tailed Hawk | H | Obs ^{51,337} |
| Strigiformes | Tytonidae | <i>Tyto alba</i> | Barn Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Megascops choliba</i> | Tropical Screech-Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Megascops clarkii</i> | Bare-shanked Screech-Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Megascops columbianus</i> | Colombian Screech-Owl | R | Esp ¹³⁷ |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Megascops ingens</i> | Rufescent Screech-Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Megascops petersoni</i> | Cinnamon Screech-Owl | R | Esp ⁸³ Foto ¹⁴¹ |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Megascops watsonii</i> | Tawny-bellied Screech-Owl | R | |

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|
| Strigiformes | Strigidae | <i>Megascops guatemalae</i> | Vermiculated Screech-Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Megascops albogularis</i> | White-throated Screech-Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Lophostrix cristata</i> | Crested Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Pulsatrix perspicillata</i> | Spectacled Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Pulsatrix melanota</i> | Band-bellied Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Bubo virginianus</i> | Great Horned Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Ciccaba virgata</i> | Mottled Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Ciccaba nigrolineata</i> | Black-and-white Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Ciccaba huhula</i> | Black-banded Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Ciccaba albifrons</i> | Rufous-banded Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Glaucidium nubicola</i> | Cloud-forest Pygmy-Owl | R | Esp ²⁸⁰ |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Glaucidium jardinii</i> | Andean Pygmy-Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Glaucidium parkeri</i> | Subtropical Pygmy-Owl | R | Foto ³ |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Glaucidium griseiceps</i> | Central American Pygmy-Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Glaucidium brasilianum</i> | Ferruginous Pygmy-Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Athene cunicularia</i> | Burrowing Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Aegolius harrisii</i> | Buff-fronted Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Asio clamator</i> | Striped Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Asio stygius</i> | Stygian Owl | R | |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Asio flammeus</i> | Short-eared Owl | R | |
| Trogoniformes | Trogonidae | <i>Pharomachrus pavoninus</i> | Pavonine Quetzal | R | |
| Trogoniformes | Trogonidae | <i>Pharomachrus auriceps</i> | Golden-headed Quetzal | R | |
| Trogoniformes | Trogonidae | <i>Pharomachrus fulgidus</i> | White-tipped Quetzal | R | |
| Trogoniformes | Trogonidae | <i>Pharomachrus antisianus</i> | Crested Quetzal | R | |
| Trogoniformes | Trogonidae | <i>Trogon massena</i> | Slaty-tailed Tropicbird | R | |
| Trogoniformes | Trogonidae | <i>Trogon comptus</i> | Blue-tailed Tropicbird | R | |
| Trogoniformes | Trogonidae | <i>Trogon melanurus</i> | Black-tailed Tropicbird | R | |
| Trogoniformes | Trogonidae | <i>Trogon chionurus</i> | White-tailed Tropicbird | R | |
| Trogoniformes | Trogonidae | <i>Trogon viridis</i> | Green-backed Tropicbird | R | |
| Trogoniformes | Trogonidae | <i>Trogon caligatus</i> | Gartered Tropicbird | R | |
| Trogoniformes | Trogonidae | <i>Trogon ramonianus</i> | Amazonian Tropicbird | R | |
| Trogoniformes | Trogonidae | <i>Trogon curucui</i> | Blue-crowned Tropicbird | R | |
| Trogoniformes | Trogonidae | <i>Trogon rufus</i> | Black-throated Tropicbird | R | |
| Trogoniformes | Trogonidae | <i>Trogon collaris</i> | Collared Tropicbird | R | |
| Trogoniformes | Trogonidae | <i>Trogon personatus</i> | Masked Tropicbird | R | |
| Coraciiformes | Alcedinidae | <i>Megaceryle torquata</i> | Ringed Kingfisher | R | |
| Coraciiformes | Alcedinidae | <i>Megaceryle alcyon</i> | Belted Kingfisher | Mb | |
| Coraciiformes | Alcedinidae | <i>Chloroceryle amazona</i> | Amazon Kingfisher | R | |
| Coraciiformes | Alcedinidae | <i>Chloroceryle americana</i> | Green Kingfisher | R | |
| Coraciiformes | Alcedinidae | <i>Chloroceryle inda</i> | Green-and-rufous Kingfisher | R | |
| Coraciiformes | Alcedinidae | <i>Chloroceryle aenea</i> | American Pygmy Kingfisher | R | |
| Coraciiformes | Momotidae | <i>Hylomanes momotula</i> | Tody Motmot | R | |
| Coraciiformes | Momotidae | <i>Electron platyrhynchum</i> | Broad-billed Motmot | R | |
| Coraciiformes | Momotidae | <i>Baryphthengus martii</i> | Rufous Motmot | R | |
| Coraciiformes | Momotidae | <i>Momotus subrufescens</i> | Whooping Motmot | R | |
| Coraciiformes | Momotidae | <i>Momotus momota</i> | Blue-crowned Motmot | R | |
| Coraciiformes | Momotidae | <i>Momotus aequatorialis</i> | Andean Motmot | R | |
| Galbuliformes | Galbulidae | <i>Galbalcyrhynchus leucotis</i> | White-eared Jacamar | R | |
| Galbuliformes | Galbulidae | <i>Brachygalba lugubris</i> | Brown Jacamar | R | |
| Galbuliformes | Galbulidae | <i>Brachygalba goeringi</i> | Pale-headed Jacamar | R | |
| Galbuliformes | Galbulidae | <i>Brachygalba salmoni</i> | Dusky-backed Jacamar | R | |
| Galbuliformes | Galbulidae | <i>Galbula albirostris</i> | Yellow-billed Jacamar | R | |
| Galbuliformes | Galbulidae | <i>Galbula ruficauda</i> | Rufous-tailed Jacamar | R | |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|--------|---|
| Galbuliformes | Galbulidae | <i>Galbulula galbula</i> | Green-tailed Jacamar | R | |
| Galbuliformes | Galbulidae | <i>Galbulula tombacea</i> | White-chinned Jacamar | R | |
| Galbuliformes | Galbulidae | <i>Galbulula pastazae</i> | Coppery-chested Jacamar | R | |
| Galbuliformes | Galbulidae | <i>Galbulula chalcothorax</i> | Purplish Jacamar | R | |
| Galbuliformes | Galbulidae | <i>Galbulula leucogastra</i> | Bronzy Jacamar | R | |
| Galbuliformes | Galbulidae | <i>Galbulula dea</i> | Paradise Jacamar | R | |
| Galbuliformes | Galbulidae | <i>Jacamerops aureus</i> | Great Jacamar | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Notharchus hyperrhynchus</i> | White-necked Puffbird | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Notharchus pectoralis</i> | Black-breasted Puffbird | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Notharchus ordii</i> | Brown-banded Puffbird | R | Esp ⁸ Grab ⁸ Obs ^{242,243} |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Notharchus tectus</i> | Pied Puffbird | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Bucco macrodactylus</i> | Chestnut-capped Puffbird | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Bucco tamatia</i> | Spotted Puffbird | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Bucco noanamae</i> | Sooty-capped Puffbird | R-E | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Bucco capensis</i> | Collared Puffbird | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Nystalus radiatus</i> | Barred Puffbird | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Nystalus obamai</i> | Western Striolated-Puffbird | R | Grab ³⁵⁶ |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Hypnelus ruficollis</i> | Russet-throated Puffbird | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Malacoptila fusca</i> | White-chested Puffbird | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Malacoptila panamensis</i> | White-whiskered Puffbird | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Malacoptila fulvogularis</i> | Black-streaked Puffbird | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Malacoptila mystacalis</i> | Moustached Puffbird | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Micromonacha lanceolata</i> | Lanceolated Monklet | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Nonnula rubecula</i> | Rusty-breasted Nunlet | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Nonnula brunnea</i> | Brown Nunlet | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Nonnula frontalis</i> | Gray-cheeked Nunlet | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Haploptila castanea</i> | White-faced Nunbird | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Monasa nigrifrons</i> | Black-fronted Nunbird | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Monasa morphoeus</i> | White-fronted Nunbird | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Monasa flavirostris</i> | Yellow-billed Nunbird | R | |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Chelidoptera tenebrosa</i> | Swallow-winged Puffbird | R | |
| Piciformes | Capitonidae | <i>Capito aurovirens</i> | Scarlet-crowned Barbet | R | |
| Piciformes | Capitonidae | <i>Capito maculicoronatus</i> | Spot-crowned Barbet | R | |
| Piciformes | Capitonidae | <i>Capito squamatus</i> | Orange-fronted Barbet | R | |
| Piciformes | Capitonidae | <i>Capito hypoleucus</i> | White-mantled Barbet | R-E | |
| Piciformes | Capitonidae | <i>Capito quinticolor</i> | Five-colored Barbet | R | |
| Piciformes | Capitonidae | <i>Capito auratus</i> | Gilded Barbet | R | |
| Piciformes | Capitonidae | <i>Eubucco richardsoni</i> | Lemon-throated Barbet | R | |
| Piciformes | Capitonidae | <i>Eubucco bourcierii</i> | Red-headed Barbet | R | |
| Piciformes | Semnornithidae | <i>Semnornis ramphastinus</i> | Toucan Barbet | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Ramphastos ambiguus</i> | Yellow-throated Toucan | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Ramphastos tucanus</i> | White-throated Toucan | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Ramphastos sulfuratus</i> | Keel-billed Toucan | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Ramphastos brevis</i> | Choco Toucan | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Ramphastos vitellinus</i> | Channel-billed Toucan | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Aulacorhynchus prasinus</i> | Emerald Toucanet | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Aulacorhynchus sulcatus</i> | Groove-billed Toucanet | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Aulacorhynchus derbianus</i> | Chestnut-tipped Toucanet | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Aulacorhynchus haematopygus</i> | Crimson-rumped Toucanet | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Andigena hypoglauca</i> | Gray-breasted Mountain-Toucan | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Andigena laminirostris</i> | Plate-billed Mountain-Toucan | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Andigena nigrirostris</i> | Black-billed Mountain-Toucan | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Selenidera spectabilis</i> | Yellow-eared Toucanet | R | |

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------------|
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Selenidera reinwardtii</i> | Golden-collared Toucanet | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Selenidera nattereri</i> | Tawny-tufted Toucanet | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Pteroglossus inscriptus</i> | Lettered Aracari | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Pteroglossus torquatus</i> | Collared Aracari | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Pteroglossus castanotis</i> | Chestnut-eared Aracari | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Pteroglossus pluricinctus</i> | Many-banded Aracari | R | |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Pteroglossus azara</i> | Ivory-billed Aracari | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Picumnus aurifrons</i> | Bar-breasted Piculet | H | Obs ¹¹¹ |
| Piciformes | Picidae | <i>Picumnus pumilus</i> | Orinoco Piculet | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Picumnus lafresnayi</i> | Lafresnaye's Piculet | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Picumnus exilis</i> | Golden-spangled Piculet | R | Foto ³²⁴ |
| Piciformes | Picidae | <i>Picumnus squamulatus</i> | Scaled Piculet | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Picumnus rufiventris</i> | Rufous-breasted Piculet | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Picumnus castelnau</i> | Plain-breasted Piculet | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Picumnus olivaceus</i> | Olivaceous Piculet | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Picumnus granadensis</i> | Grayish Piculet | R-E | |
| Piciformes | Picidae | <i>Picumnus cinnamomeus</i> | Chestnut Piculet | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Melanerpes formicivorus</i> | Acorn Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Melanerpes cruentatus</i> | Yellow-tufted Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Melanerpes pulcher</i> | Beautiful Woodpecker | R-E | |
| Piciformes | Picidae | <i>Melanerpes pucherani</i> | Black-cheeked Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Melanerpes rubricapillus</i> | Red-crowned Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Sphyrapicus varius</i> | Yellow-bellied Sapsucker | Mb | Esp ⁸⁷ Foto ¹⁹⁹ |
| Piciformes | Picidae | <i>Picoides fumigatus</i> | Smoky-brown Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Veniliornis kirkii</i> | Red-rumped Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Veniliornis passerinus</i> | Little Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Veniliornis callonotus</i> | Scarlet-backed Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Veniliornis dignus</i> | Yellow-vented Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Veniliornis nigriceps</i> | Bar-bellied Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Veniliornis affinis</i> | Red-stained Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Veniliornis chocoensis</i> | Choco Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Piculus leucolaemus</i> | White-throated Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Piculus litae</i> | Lita Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Piculus flavigula</i> | Yellow-throated Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Piculus chrysochloros</i> | Golden-green Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Colaptes rubiginosus</i> | Golden-olive Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Colaptes rivolii</i> | Crimson-mantled Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Colaptes punctigula</i> | Spot-breasted Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Celeus loricatus</i> | Cinnamon Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Celeus grammicus</i> | Scale-breasted Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Celeus elegans</i> | Chestnut Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Celeus flavus</i> | Cream-colored Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Celeus spectabilis</i> | Rufous-headed Woodpecker | R | Foto ⁴⁷ |
| Piciformes | Picidae | <i>Celeus torquatus</i> | Ringed Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Dryocopus lineatus</i> | Lineated Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Campephilus pollens</i> | Powerful Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Campephilus haematogaster</i> | Crimson-bellied Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Campephilus rubricollis</i> | Red-necked Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Campephilus melanoleucus</i> | Crimson-crested Woodpecker | R | |
| Piciformes | Picidae | <i>Campephilus gayaquilensis</i> | Guayaquil Woodpecker | R | |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Herpetotheres cachinnans</i> | Laughing Falcon | R | |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Micrastur ruficollis</i> | Barred Forest-Falcon | R | |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Micrastur plumbeus</i> | Plumbeous Forest-Falcon | R | |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Falconiformes | Falconidae | <i>Micrastur gilvicollis</i> | Lined Forest-Falcon | R | |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Micrastur mirandollei</i> | Slaty-backed Forest-Falcon | R | |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Micrastur semitorquatus</i> | Collared Forest-Falcon | R | |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Micrastur buckleyi</i> | Buckley's Forest-Falcon | H | |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Caracara cheriway</i> | Crested Caracara | R | |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Ibycter americanus</i> | Red-throated Caracara | R | |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Phalcoboenus carunculatus</i> | Carunculated Caracara | R | |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Daptrius ater</i> | Black Caracara | R | |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Milvago chimachima</i> | Yellow-headed Caracara | R | |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco sparverius</i> | American Kestrel | R-Mb? | |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco columbarius</i> | Merlin | Mb | |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco rufigularis</i> | Bat Falcon | R | |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco deiroleucus</i> | Orange-breasted Falcon | R | |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco femoralis</i> | Aplomado Falcon | R | |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco peregrinus</i> | Peregrine Falcon | Mb-Ma? | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Touit batavicus</i> | Lilac-tailed Parrotlet | R | Esp ³⁵⁰ |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Touit huetii</i> | Scarlet-shouldered Parrotlet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Touit dilectissimus</i> | Blue-fronted Parrotlet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Touit purpuratus</i> | Sapphire-rumped Parrotlet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Touit stictopterus</i> | Spot-winged Parrotlet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Bolborhynchus lineola</i> | Barred Parakeet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i> | Rufous-fronted Parakeet | R-E | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Brotogeris sanctithomae</i> | Tui Parakeet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Brotogeris versicolorus</i> | Canary-winged Parakeet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Brotogeris jugularis</i> | Orange-chinned Parakeet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Brotogeris cyanoptera</i> | Cobalt-winged Parakeet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Hapalopsittaca amazonina</i> | Rusty-faced Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Hapalopsittaca fuertesi</i> | Indigo-winged Parrot | R-E | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrilia haematotis</i> | Brown-hooded Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrilia pulchra</i> | Rose-faced Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrilia pyrrilia</i> | Saffron-headed Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrilia barrabandi</i> | Orange-cheeked Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pionus fuscus</i> | Dusky Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pionus sordidus</i> | Red-billed Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pionus tumultuosus</i> | Speckle-faced Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pionus menstruus</i> | Blue-headed Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pionus chalcopterus</i> | Bronze-winged Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Graydidascalus brachyurus</i> | Short-tailed Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona festiva</i> | Festive Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona autumnalis</i> | Red-lored Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona ochrocephala</i> | Yellow-crowned Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona farinosa</i> | Mealy Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona amazonica</i> | Orange-winged Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona mercenarius</i> | Scaly-naped Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus passerinus</i> | Green-rumped Parrotlet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus xanthopterygius</i> | Blue-winged Parrotlet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus conspicillatus</i> | Spectacled Parrotlet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus modestus</i> | Dusky-billed Parrotlet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus coelestis</i> | Pacific Parrotlet | R | Esp ³²³ Obs ³⁹ |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pionites melanocephalus</i> | Black-headed Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pionites leucogaster</i> | White-bellied Parrot | R | Foto ¹⁹⁸ |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Deroptyus accipitrinus</i> | Red-fan Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura picta</i> | Painted Parakeet | R | |

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|----------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------|
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura viridicata</i> | Santa Marta Parakeet | R-E | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura melanura</i> | Maroon-tailed Parakeet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura calliptera</i> | Brown-breasted Parakeet | R-E | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Eupsittula pertinax</i> | Brown-throated Parakeet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Aratinga weddellii</i> | Dusky-headed Parakeet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Orthopsittaca manilatus</i> | Red-bellied Macaw | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Ara ararauna</i> | Blue-and-yellow Macaw | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Ara militaris</i> | Military Macaw | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Ara ambiguus</i> | Great Green Macaw | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Ara macao</i> | Scarlet Macaw | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Ara chloropterus</i> | Red-and-green Macaw | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Ara severus</i> | Chestnut-fronted Macaw | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Leptosittaca branickii</i> | Golden-plumed Parakeet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Ognorhynchus icterotis</i> | Yellow-eared Parrot | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Thectocercus acuticaudatus</i> | Blue-crowned Parakeet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacula wagleri</i> | Scarlet-fronted Parakeet | R | |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacula leucophthalmus</i> | White-eyed Parakeet | R | |
| Passeriformes | Sapayoidea | <i>Sapayoaaenigma</i> | Sapayoaa | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Euchrepomis callinota</i> | Rufous-rumped Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Euchrepomis spodioptila</i> | Ash-winged Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Cymbilaimus lineatus</i> | Fasciated Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Frederickena fulva</i> | Fulvous Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Taraba major</i> | Great Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Sakesphorus canadensis</i> | Black-crested Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus doliatus</i> | Barred Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus multistriatus</i> | Bar-crested Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus tenuipunctatus</i> | Lined Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus atrinucha</i> | Black-crowned Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus schistaceus</i> | Plain-winged Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus murinus</i> | Mouse-colored Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus nigriceps</i> | Black Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus praecox</i> | Cocha Antshrike | R | Grab ³⁵⁶ |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus cryptoleucus</i> | Castelnau's Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus nigrocinereus</i> | Blackish-gray Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus punctatus</i> | Northern Slaty-Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus unicolor</i> | Uniform Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus aethiops</i> | White-shouldered Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus melanotus</i> | Black-backed Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus amazonicus</i> | Amazonian Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Megastictus margaritatus</i> | Pearly Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Neocantes niger</i> | Black Bushbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Clytoctantes alixii</i> | Recurve-billed Bushbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnistes anabatinus</i> | Russet Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Dysithamnus mentalis</i> | Plain Antvireo | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Dysithamnus puncticeps</i> | Spot-crowned Antvireo | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Dysithamnus occidentalis</i> | Bicolored Antvireo | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Dysithamnus leucostictus</i> | White-streaked Antvireo | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnomanes ardesiacus</i> | Dusky-throated Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Thamnomanes caesius</i> | Cinereous Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Xenornis setifrons</i> | Spiny-faced Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Islaeria hauxwellii</i> | Plain-throated Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Pygijpta stellaris</i> | Spot-winged Antshrike | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Epinecrophylla fulviventris</i> | Checker-throated Antwren | R | |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------------|
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Epinecrophylla haematonota</i> | Stipple-throated Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Epinecrophylla spodionota</i> | Foothill Antwren | R | Esp ^{357,306} |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Epinecrophylla ornata</i> | Ornate Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Epinecrophylla erythrura</i> | Rufous-tailed Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula brachyura</i> | Pygmy Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula ignota</i> | Moustached Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula ambiguia</i> | Yellow-throated Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula surinamensis</i> | Guianan Streaked-Antwren | H | Obs ^{242,243} |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula multostriata</i> | Amazonian Streaked-Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula pacifica</i> | Pacific Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula cherriei</i> | Cherrie's Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula longicauda</i> | Stripe-chested Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula axillaris</i> | White-flanked Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula schisticolor</i> | Slaty Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula sunensis</i> | Rio Suno Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula longipennis</i> | Long-winged Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula behni</i> | Plain-winged Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula menetriesii</i> | Gray Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmotherula assimilis</i> | Leaden Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Dichrozonza cincta</i> | Banded Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Herpsilochmus dugandi</i> | Dugand's Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Herpsilochmus dorsimaculatus</i> | Spot-backed Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Herpsilochmus axillaris</i> | Yellow-breasted Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> | Rufous-winged Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Microrhopias quixensis</i> | Dot-winged Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Formicivora grisea</i> | White-fringed Antwren | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Drymophila devillei</i> | Striated Antbird | R | Esp ³³³ Grab ⁴² |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Drymophila hellmayri</i> | Santa Marta Antbird | R-E | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Drymophila klagesi</i> | Klage's Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Drymophila caudata</i> | Long-tailed Antbird | R-E | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Drymophila striaticeps</i> | Streak-headed Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Hypocnemis flavescens</i> | Imeri Warbling-Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Hypocnemis peruviana</i> | Peruvian Warbling-Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Hypocnemis hypoxantha</i> | Yellow-browed Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Cercomacroides parkeri</i> | Parker's Antbird | R-E | Esp ¹⁵⁴ |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Cercomacroides tyrannina</i> | Dusky Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Cercomacroides serva</i> | Black Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Cercomacroides nigrescens</i> | Blackish Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Cercomacroides fuscicauda</i> | Riparian Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Cercomacra cinerascens</i> | Gray Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Cercomacra nigricans</i> | Jet Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Pyriglena leuconota</i> | White-backed Fire-eye | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmoborus leucophrys</i> | White-browed Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmoborus lugubris</i> | Ash-breasted Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmoborus myotherinus</i> | Black-faced Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Hypocnemoides melanopogon</i> | Band-tailed Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmochanes hemileucus</i> | Black-and-white Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Gymnocichla nudiceps</i> | Bare-crowned Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Sclateria naevia</i> | Silvered Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Percnostola rufifrons</i> | Black-headed Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmelastes schistaceus</i> | Slate-colored Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmelastes hyperythrus</i> | Plumbeous Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmelastes leucostigma</i> | Spot-winged Antbird | R | |

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------|
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmeciza longipes</i> | White-bellied Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Poliocrania exsul</i> | Chestnut-backed Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Sipia palliata</i> | Magdalena Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Sipia nigricauda</i> | Esmeraldas Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Sipia berlepschi</i> | Stub-tailed Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Sciaphylax castanea</i> | Zimmer's Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Akletos melanoceps</i> | White-shouldered Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Hafferia fortis</i> | Sooty Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Hafferia zeledoni</i> | Zeledon's Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Hafferia inmaculata</i> | Blue-lored Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Aprostornis disjuncta</i> | Yapacana Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmophylax atrothorax</i> | Black-throated Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Ammonastes pelzelni</i> | Gray-bellied Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Myrmornis torquata</i> | Wing-banded Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Pithys albifrons</i> | White-plumed Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Gymnopithys bicolor</i> | Bicolored Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Gymnopithys leucaspis</i> | White-cheeked Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Rhegmatorhina cristata</i> | Chestnut-crested Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Rhegmatorhina melanosticta</i> | Hairy-crested Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Hylophylax naevioides</i> | Spotted Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Hylophylax naevius</i> | Spot-backed Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Hylophylax punctulatus</i> | Dot-backed Antbird | R | Esp ^{277,8} |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Willisornis poecilinotus</i> | Scale-backed Antbird | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Phlegopsis nigromaculata</i> | Black-spotted Bare-eye | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Phlegopsis erythroptera</i> | Reddish-winged Bare-eye | R | |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Phaenostictus mcleannani</i> | Ocellated Antbird | R | |
| Passeriformes | Conopophagidae | <i>Pittasoma michleri</i> | Black-crowned Antpitta | R | |
| Passeriformes | Conopophagidae | <i>Pittasoma rufofatileum</i> | Rufous-crowned Antpitta | R | |
| Passeriformes | Conopophagidae | <i>Conopophaga aurita</i> | Chestnut-belted Gnat-eater | R | |
| Passeriformes | Conopophagidae | <i>Conopophaga castaneiceps</i> | Chestnut-crowned Gnat-eater | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaria squamigera</i> | Undulated Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaria gigantea</i> | Giant Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaria allenii</i> | Moustached Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaria guatimalensis</i> | Scaled Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaria haplonota</i> | Plain-backed Antpitta | R | Esp ³²⁶ |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaria dignissima</i> | Ochre-striped Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaria ruficapilla</i> | Chestnut-crowned Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaria bangsi</i> | Santa Marta Antpitta | R-E | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaria kaestneri</i> | Cundinamarca Antpitta | R-E | Esp ³¹⁵ |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaria rufocinerea</i> | Bicolored Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaria nuchalis</i> | Chestnut-naped Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaria flavotincta</i> | Yellow-breasted Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaria hypoleuca</i> | White-bellied Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaria rufula</i> | Rufous Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaria quitensis</i> | Tawny Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaria urraoensis</i> | Urrao Antpitta | R-E | Esp ⁴⁸ |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaria milleri</i> | Brown-banded Antpitta | R-E | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Hylopezus perspicillatus</i> | Streak-chested Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Hylopezus macularius</i> | Spotted Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Hylopezus dives</i> | Thicket Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Hylopezus fulviventris</i> | White-lored Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Myrmothera campanisona</i> | Thrush-like Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaricula flavirostris</i> | Ochre-breasted Antpitta | R | |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|----------------|--|-------------------------------|--------|--|
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaricula cucullata</i> | Hooded Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaricula ferrugineiceps</i> | Rusty-breasted Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaricula nana</i> | Slate-crowned Antpitta | R | |
| Passeriformes | Grallariidae | <i>Grallaricula lineifrons</i> | Crescent-faced Antpitta | R | |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Liosceles thoracicus</i> | Rusty-belted Tapaculo | R | |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Acropternis orthonyx</i> | Ocellated Tapaculo | R | |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Myornis senilis</i> | Ash-colored Tapaculo | R | |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Scytalopus latrans</i> | Blackish Tapaculo | R | |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Scytalopus sanctaemartae</i> | Santa Marta Tapaculo | R-E | |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Scytalopus micropterus</i> | Long-tailed Tapaculo | R | |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Scytalopus atratus</i> | White-crowned Tapaculo | R | |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Scytalopus panamensis</i> | Pale-throated Tapaculo | R | |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Scytalopus chocoensis</i> | Choco Tapaculo | R | Esp ¹⁷⁸ Grab ¹⁷⁸ |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Scytalopus rodiguezi</i> | Upper Magdalena Tapaculo | R-E | Esp ¹⁷⁷ Grab ¹⁷⁷ |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Scytalopus stilesi</i> | Stiles's Tapaculo | R-E | Esp ⁸⁰ Grab ⁸⁰ |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Scytalopus alvarezlopezi</i> | Tatamá Tapaculo | R-E | Esp ³²⁸ Grab ³²⁸ |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Scytalopus vicinior</i> | Nariño Tapaculo | R | |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Scytalopus latebricola</i> | Brown-rumped Tapaculo | R-E | |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Scytalopus perijanus</i> | Perija Tapaculo | R | Esp ²⁰ Grab ²⁰ |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Scytalopus spillmanni</i> | Spillmann's Tapaculo | R | |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Scytalopus griseicollis</i> | Pale-bellied Tapaculo | R | |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Scytalopus canus</i> | Paramillo Tapaculo | R-E | |
| Passeriformes | Rhinocryptidae | <i>Scytalopus opacus</i> | Paramo Tapaculo | R | |
| Passeriformes | Formicariidae | <i>Formicarius colma</i> | Rufous-capped Antthrush | R | |
| Passeriformes | Formicariidae | <i>Formicarius analis</i> | Black-faced Antthrush | R | |
| Passeriformes | Formicariidae | <i>Formicarius nigricapillus</i> | Black-headed Antthrush | R | |
| Passeriformes | Formicariidae | <i>Formicarius rufipectus</i> | Rufous-breasted Antthrush | R | |
| Passeriformes | Formicariidae | <i>Chamaea campanisoma</i> | Short-tailed Antthrush | R | |
| Passeriformes | Formicariidae | <i>Chamaea nobilis</i> | Striated Antthrush | R | |
| Passeriformes | Formicariidae | <i>Chamaea turdina</i> | Schwartz's Antthrush | R | |
| Passeriformes | Formicariidae | <i>Chamaea mollissima</i> | Barred Antthrush | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Sclerurus mexicanus</i> | Tawny-throated Leafcutter | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Sclerurus rufigularis</i> | Short-billed Leafcutter | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Sclerurus guatemalensis</i> | Scaly-throated Leafcutter | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Sclerurus caudacutus</i> | Black-tailed Leafcutter | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Sclerurus albicularis</i> | Gray-throated Leafcutter | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Certhiasomus stictolaemus</i> | Spot-throated Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Sittasomus griseicapillus</i> | Olivaceous Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Deconychura longicauda</i> | Long-tailed Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Dendrocincla tyrannina</i> | Tyrannine Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Dendrocincla merula</i> | White-chinned Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Dendrocincla homochroa</i> | Ruddy Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Dendrocincla fuliginosa</i> | Plain-brown Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Glyphorynchus spirurus</i> | Wedge-billed Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Dendrexetastes rufigula</i> | Cinnamon-throated Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Nasica longirostris</i> | Long-billed Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Dendrocolaptes sanctithomae</i> | Northern Barred-Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Dendrocolaptes certhia</i> | Amazonian Barred-Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Dendrocolaptes picumnus</i> | Black-banded Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Hylexetastes stresemanni</i> | Bar-bellied Woodcreeper | R | Esp ⁸⁷ Obs ⁸ |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i> | Strong-billed Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Xiphorhynchus obsoletus</i> | Striped Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Xiphorhynchus ocellatus</i> | Ocellated Woodcreeper | R | |

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|-------------|--|----------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Xiphorhynchus elegans</i> | Elegant Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Xiphorhynchus susurans</i> | Cocoa Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Xiphorhynchus guttatus</i> | Buff-throated Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Xiphorhynchus lachrymosus</i> | Black-striped Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Xiphorhynchus erythropygius</i> | Spotted Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Xiphorhynchus triangularis</i> | Olive-backed Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Dendroplex picus</i> | Straight-billed Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Dendroplex kienerii</i> | Zimmer's Woodcreeper | R | Esp ³²¹ |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Campylorhamphus trochilirostris</i> | Red-billed Scythebill | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Campylorhamphus procurvooides</i> | Curve-billed Scythebill | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Campylorhamphus pusillus</i> | Brown-billed Scythebill | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Drymotoxeres pucheranii</i> | Greater Scythebill | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Lepidocolaptes souleyetii</i> | Streak-headed Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Lepidocolaptes lacrymiger</i> | Montane Woodcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Lepidocolaptes duidae</i> | Lineated Woodcreeper | H | Obs ^{357,112} |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Xenops tenuirostris</i> | Slender-billed Xenops | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Xenops minutus</i> | Plain Xenops | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Xenops rutilans</i> | Streaked Xenops | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Berlepschia rikeri</i> | Point-tailed Palmcreeper | R | Foto ¹¹² Grab ⁸ |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Microxenops milleri</i> | Rufous-tailed Xenops | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Pseudocolaptes lawrencii</i> | Buffy Tuftedcheek | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Pseudocolaptes boissonneautii</i> | Streaked Tuftedcheek | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Premnornis guttuliger</i> | Rusty-winged Barbtail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Furnarius leucopus</i> | Pale-legged Hornero | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Furnarius torridus</i> | Pale-billed Hornero | R | Foto ²⁷⁰ |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Furnarius minor</i> | Lesser Hornero | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Lochmias nematura</i> | Sharp-tailed Streamcreeper | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Cinclodes albiventris</i> | Chestnut-winged Cinclodes | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Cinclodes excelsior</i> | Stout-billed Cinclodes | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Anabazenops dorsalis</i> | Dusky-cheeked Foliage-gleaner | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Philydor fuscipenne</i> | Slaty-winged Foliage-gleaner | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Philydor erythrocerum</i> | Rufous-rumped Foliage-gleaner | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Philydor erythrocercum</i> | Chestnut-winged Foliage-gleaner | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Philydor rufum</i> | Buff-fronted Foliage-gleaner | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Philydor pyrrhodes</i> | Cinnamon-rumped Foliage-gleaner | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Anabacerthia striaticollis</i> | Montane Foliage-gleaner | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Anabacerthia variegaticeps</i> | Scaly-throated Foliage-gleaner | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Anabacerthia ruficaudata</i> | Rufous-tailed Foliage-gleaner | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Syndactyla subalaris</i> | Lineated Foliage-gleaner | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Ancistrops strigilatus</i> | Chestnut-winged Hookbill | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Clibanornis rubiginosus</i> | Ruddy Foliage-gleaner | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Clibanornis rufipectus</i> | Santa Marta Foliage-gleaner | R-E | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Thripadectes ignobilis</i> | Uniform Treehunter | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Thripadectes flammulatus</i> | Flammulated Treehunter | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Thripadectes holostictus</i> | Striped Treehunter | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Thripadectes virgaticeps</i> | Streak-capped Treehunter | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Thripadectes melanorhynchus</i> | Black-billed Treehunter | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Automolus rufipileatus</i> | Chestnut-crowned Foliage-gleaner | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Automolus melanopezus</i> | Brown-rumped Foliage-gleaner | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Automolus ochrolaemus</i> | Buff-throated Foliage-gleaner | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Automolus subulatus</i> | Striped Woodhaunter | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Automolus infuscatus</i> | Olive-backed Foliage-gleaner | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Premnoplex brunneascens</i> | Spotted Barbtail | R | |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|--------|---|
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Margarornis stellatus</i> | Fulvous-dotted Treerunner | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Margarornis bellulus</i> | Beautiful Treerunner | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Margarornis squamiger</i> | Pearled Treerunner | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Leptasthenura andicola</i> | Andean Tit-Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Phacellodomus rufifrons</i> | Rufous-fronted Thornbird | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Hellmayrea gularis</i> | White-browed Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Asthenes flammulata</i> | Many-striped Canastero | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Asthenes wyatti</i> | Streak-backed Canastero | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Asthenes perijana</i> | Perija Thistletail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Asthenes fuliginosa</i> | White-chinned Thistletail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Metopothrix aurantiaca</i> | Orange-fronted Plushcrown | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Xenerpestes minlosi</i> | Double-banded Graytail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Siptornis striaticollis</i> | Spectacled Prickletail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Thripophaga cherriei</i> | Orinoco Softtail | R | Foto ³²⁴ |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Cranioleuca vulpina</i> | Rusty-backed Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Cranioleuca subcristata</i> | Crested Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Cranioleuca erythrops</i> | Red-faced Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Cranioleuca hellmayri</i> | Streak-capped Spinetail | R-E | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Cranioleuca curtata</i> | Ash-browed Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Cranioleuca gutturalis</i> | Speckled Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Certhiaxis cinnamomeus</i> | Yellow-chinned Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Certhiaxis mustelinus</i> | Red-and-white Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Mazaria propinqua</i> | White-bellied Spinetail | H | Obs ²⁵⁵ |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Synallaxis gujanensis</i> | Plain-crowned Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Synallaxis brachyura</i> | Slaty Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Synallaxis subpudica</i> | Silvery-throated Spinetail | R-E | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Synallaxis moesta</i> | Dusky Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Synallaxis albicularis</i> | Dark-breasted Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Synallaxis beverlyae</i> | Rio Orinoco Spinetail | H | Obs ¹⁵⁶ |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Synallaxis albescens</i> | Pale-breasted Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Synallaxis azarae</i> | Azara's Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Synallaxis candei</i> | White-whiskered Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Synallaxis fuscorufa</i> | Rusty-headed Spinetail | R-E | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Synallaxis unirufa</i> | Rufous Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Synallaxis cinnamomea</i> | Stripe-breasted Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Synallaxis rutilans</i> | Ruddy Spinetail | R | |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Synallaxis cherriei</i> | Chestnut-throated Spinetail | R | Esp ⁸⁷ |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Phyllomyias burmeisteri</i> | Rough-legged Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Phyllomyias griseiceps</i> | Sooty-headed Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Phyllomyias nigrocapillus</i> | Black-capped Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Phyllomyias cinereiceps</i> | Ashy-headed Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Phyllomyias uropygialis</i> | Tawny-rumped Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Phyllomyias plumbeiceps</i> | Plumbeous-crowned Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannulus elatus</i> | Yellow-crowned Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiopagis gaimardi</i> | Forest Elaenia | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiopagis caniceps</i> | Gray Elaenia | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiopagis olallai</i> | Foothill Elaenia | R | Esp ⁸⁶ |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiopagis flavivertex</i> | Yellow-crowned Elaenia | R | Foto ¹³⁹ Grab ¹³⁹ |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiopagis viridicata</i> | Greenish Elaenia | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia flavogaster</i> | Yellow-bellied Elaenia | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia martinica</i> | Caribbean Elaenia | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia spectabilis</i> | Large Elaenia | Ma | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia albiceps</i> | White-crested Elaenia | R-Ma | |

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------|
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia parvirostris</i> | Small-billed Elaenia | Ma | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia strepera</i> | Slaty Elaenia | Ma | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia gigas</i> | Mottle-backed Elaenia | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia pelzelni</i> | Brownish Elaenia | H | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia cristata</i> | Plain-crested Elaenia | R | Esp ^{282,8} |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia chiriquensis</i> | Lesser Elaenia | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia brachyptera</i> | Coopmans's Elaenia | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia ruficeps</i> | Rufous-crowned Elaenia | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia frantzii</i> | Mountain Elaenia | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia pallatangae</i> | Sierran Elaenia | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Ornithion brunneicapillus</i> | Brown-capped Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Ornithion inerme</i> | White-lored Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Campstostoma obsoletum</i> | Southern Beardless-Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Mecocerculus poecilocercus</i> | White-tailed Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Mecocerculus stictopterus</i> | White-banded Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Mecocerculus leucophrys</i> | White-throated Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Mecocerculus minor</i> | Sulphur-bellied Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Anairetes parulus</i> | Tufted Tit-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Uromyias agilis</i> | Agile Tit-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Serpophaga cinerea</i> | Torrent Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Serpophaga hypoleuca</i> | River Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Phaeomyias murina</i> | Mouse-colored Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Capsiempis flaveola</i> | Yellow Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Polystictus pectoralis</i> | Bearded Tachuri | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Pseudocolopteryx acutipennis</i> | Subtropical Doradito | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Pseudotriccus pelzelni</i> | Bronze-olive Pygmy-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Pseudotriccus ruficeps</i> | Rufous-headed Pygmy-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Corythopis torquatus</i> | Ringed Antpipit | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Euscarthmus meloryphus</i> | Tawny-crowned Pygmy-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Stigmatura napensis</i> | Lesser Wagtail-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Zimmerius vilissimus</i> | Paltry Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Zimmerius albicularis</i> | Choco Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Zimmerius gracilipes</i> | Slender-footed Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Zimmerius chrysops</i> | Golden-faced Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Phylloscartes poecilotis</i> | Variegated Bristle-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Phylloscartes ophthalmicus</i> | Marble-faced Bristle-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Phylloscartes lanyoni</i> | Antioquia Bristle-Tyrant | R-E | Esp ¹⁵¹ |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Phylloscartes orbitalis</i> | Spectacled Bristle-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Phylloscartes gualaquizae</i> | Ecuadorian Tyrannulet | H | Obs ³⁰² |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Phylloscartes superciliaris</i> | Rufous-browed Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Mionectes striaticollis</i> | Streak-necked Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Mionectes olivaceus</i> | Olive-striped Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Mionectes oleagineus</i> | Ochre-bellied Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Leptopogon amaurocephalus</i> | Sepia-capped Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Leptopogon superciliaris</i> | Slaty-capped Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Leptopogon rufipectus</i> | Rufous-breasted Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Sublegatus arenarum</i> | Northern Scrub-Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Sublegatus obscurior</i> | Amazonian Scrub-Flycatcher | R | Esp ³¹² |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Sublegatus modestus</i> | Southern Scrub-Flycatcher | Ma | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Inezia tenuirostris</i> | Slender-billed Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Inezia subflava</i> | Amazonian Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Inezia caudata</i> | Pale-tipped Tyrannulet | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiobius ornatus</i> | Ornate Flycatcher | R | |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------|
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiornis atricapillus</i> | Black-capped Pygmy-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiornis ecaudatus</i> | Short-tailed Pygmy-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Oncostoma cinereigulare</i> | Northern Bentbill (V?) | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Oncostoma olivaceum</i> | Southern Bentbill | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Lophotriccus pileatus</i> | Scale-crested Pygmy-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Lophotriccus vitiosus</i> | Double-banded Pygmy-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Lophotriccus galeatus</i> | Helmeted Pygmy-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Atalotriccus pilaris</i> | Pale-eyed Pygmy-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Hemitriccus zosterops</i> | White-eyed Tody-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Hemitriccus iohannis</i> | Johannes's Tody-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Hemitriccus striaticollis</i> | Stripe-necked Tody-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> | Pearly-vented Tody-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Hemitriccus granadensis</i> | Black-throated Tody-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Hemitriccus rufigularis</i> | Buff-throated Tody-Tyrant | R | Grab ³⁵⁶ |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Poecilotriccus ruficeps</i> | Rufous-crowned Tody-Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Poecilotriccus capitalis</i> | Black-and-white Tody-Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Poecilotriccus latirostris</i> | Rusty-fronted Tody-Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Poecilotriccus sylvia</i> | Slate-headed Tody-Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Poecilotriccus calopterus</i> | Golden-winged Tody-Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Todirostrum maculatum</i> | Spotted Tody-Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Todirostrum cinereum</i> | Common Tody-Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Todirostrum nigriceps</i> | Black-headed Tody-Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Todirostrum chrysocrotaphum</i> | Yellow-browed Tody-Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Cnipodectes subbrunneus</i> | Brownish Twistwing | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Rhynchocyclus olivaceus</i> | Olivaceous Flatbill | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Rhynchocyclus brevirostris</i> | Eye-ringed Flatbill | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Rhynchocyclus pacificus</i> | Pacific Flatbill | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Rhynchocyclus fulvipectus</i> | Fulvous-breasted Flatbill | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tolmomyias sulphurescens</i> | Yellow-olive Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tolmomyias traylori</i> | Orange-eyed Flycatcher | R | Esp ³⁰⁸ |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tolmomyias assimilis</i> | Yellow-margined Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tolmomyias poliocephalus</i> | Gray-crowned Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tolmomyias flaviventris</i> | Yellow-breasted Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Neopipo cinnamomea</i> | Cinnamon Manakin-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Platyrinchus saturatus</i> | Cinnamon-crested Spadebill | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Platyrinchus mystaceus</i> | White-throated Spadebill | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Platyrinchus coronatus</i> | Golden-crowned Spadebill | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Platyrinchus flavigularis</i> | Yellow-throated Spadebill | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Platyrinchus platyrhynchos</i> | White-crested Spadebill | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Onychorhynchus coronatus</i> | Royal Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiophobus flavicans</i> | Flavescence Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiophobus phoenicomitra</i> | Orange-crested Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiophobus fasciatus</i> | Bran-colored Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiobius villosus</i> | Tawny-breasted Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiobius barbatus</i> | Sulphur-rumped Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiobius atricaudus</i> | Black-tailed Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Terenotriccus erythrurus</i> | Ruddy-tailed Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Pyrrhomystis cinnamomeus</i> | Cinnamon Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Hirundinea ferruginea</i> | Cliff Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Nephelomyias pulcher</i> | Handsome Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Lathrotriccus euleri</i> | Euler's Flycatcher | R-Ma | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Aphanotriccus audax</i> | Black-billed Flycatcher | R | |

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------|
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Cnemotriccus fuscatus</i> | Fuscous Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Empidonax flaviventris</i> | Yellow-bellied Flycatcher | Mb | Foto ¹⁷⁰ |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Empidonax virescens</i> | Acadian Flycatcher | Mb | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Empidonax traillii</i> | Willow Flycatcher | Mb | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Empidonax alnorum</i> | Alder Flycatcher | Mb | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Empidonax minimus</i> | Least Flycatcher | H | Obs ²⁹⁸ |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Contopus cooperi</i> | Olive-sided Flycatcher | Mb | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Contopus fumigatus</i> | Smoke-colored Pewee | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Contopus sordidulus</i> | Western Wood-Pewee | Mb | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Contopus virens</i> | Eastern Wood-Pewee | Mb | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Contopus cinereus</i> | Tropical Pewee | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Mitrephanes phaeocercus</i> | Tufted Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Sayornis nigricans</i> | Black Phoebe | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Pyrocephalus rubinus</i> | Vermilion Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Knipolegus orenocensis</i> | Riverside Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Knipolegus poecilurus</i> | Rufous-tailed Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Knipolegus poecilocercus</i> | Amazonian Black-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Ochthornis littoralis</i> | Drab Water Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Satrapa icterophrys</i> | Yellow-browed Tyrant | Ma | Esp ²⁸² Obs ²²⁵ |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Muscisaxicola fluvialis</i> | Little Ground-Tyrant | H | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Muscisaxicola maculirostris</i> | Spot-billed Ground-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Muscisaxicola albilora</i> | White-browed Ground-Tyrant | V | Esp ²⁵¹ |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Muscisaxicola alpinus</i> | Plain-capped Ground-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Agriornis montanus</i> | Black-billed Shrike-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiotheretes striaticollis</i> | Streak-throated Bush-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiotheretes pernix</i> | Santa Marta Bush-Tyrant | R-E | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiotheretes fumigatus</i> | Smoky Bush-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Cnemarchus erythropygius</i> | Red-rumped Bush-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Fluvicola pica</i> | Pied Water-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Fluvicola nengeta</i> | Masked Water-Tyrant | R | Foto ^{197,92} |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Arundinicola leucocephala</i> | White-headed Marsh Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Ochthoeca frontalis</i> | Crowned Chat-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Ochthoeca diadema</i> | Yellow-bellied Chat-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Ochthoeca cinnamomeiventris</i> | Slaty-backed Chat-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Ochthoeca rufipectoralis</i> | Rufous-breasted Chat-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Ochthoeca fumicolor</i> | Brown-backed Chat-Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Colonia colonus</i> | Long-tailed Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Muscigralla brevicauda</i> | Short-tailed Field Tyrant | V | Esp ²⁵¹ Obs ²⁹² |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Machetornis rixosa</i> | Cattle Tyrant | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Legatus leucophaius</i> | Piratic Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiozetetes cayanensis</i> | Rusty-margined Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiozetetes similis</i> | Social Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiozetetes granadensis</i> | Gray-capped Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiozetetes luteiventris</i> | Dusky-chested Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Phelpsiainornata</i> | White-bearded Flycatcher | R | Esp ²⁸² |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Pitangus sulphuratus</i> | Great Kiskadee | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Pitangus lictor</i> | Lesser Kiskadee | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Conopias albostriatus</i> | White-ringed Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Conopias parvus</i> | Yellow-throated Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Conopias cinchoneti</i> | Lemon-browed Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiodynastes chrysocephalus</i> | Golden-crowned Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiodynastes luteiventris</i> | Sulphur-bellied Flycatcher | Mb | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiodynastes maculatus</i> | Streaked Flycatcher | R-Ma | |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|-------------|--|----------------------------|---------|--|
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Megarynchus pitangua</i> | Boat-billed Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannopsis sulphurea</i> | Sulphury Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Empidonomus varius</i> | Variegated Flycatcher | Ma | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i> | Crowned Slaty Flycatcher | Ma | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannus niveigularis</i> | Snowy-throated Kingbird | Ma | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannus albogularis</i> | White-throated Kingbird | H | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannus melancholicus</i> | Tropical Kingbird | R-Ma | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannus forficatus</i> | Scissor-tailed Flycatcher | H | Obs ²⁸⁵ |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannus savana</i> | Fork-tailed Flycatcher | R-Mb-Ma | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannus tyrannus</i> | Eastern Kingbird | Mb | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannus dominicensis</i> | Gray Kingbird | Mb | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Rhytipterna holerythra</i> | Rufous Mourner | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Rhytipterna simplex</i> | Grayish Mourner | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Rhytipterna immunda</i> | Pale-bellied Mourner | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Sirystes albogriseus</i> | Choco Sirystes | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Sirystes albocinereus</i> | White-rumped Sirystes | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiarchus tuberculifer</i> | Dusky-capped Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiarchus swainsoni</i> | Swainson's Flycatcher | Ma | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiarchus venezuelensis</i> | Venezuelan Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiarchus panamensis</i> | Panama Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiarchus ferox</i> | Short-crested Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiarchus apicalis</i> | Apical Flycatcher | R-E | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiarchus cephalotes</i> | Pale-edged Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiarchus crinitus</i> | Great Crested Flycatcher | Mb | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiarchus tyrannulus</i> | Brown-crested Flycatcher | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Ramphotrigon megacephalum</i> | Large-headed Flatbill | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Ramphotrigon ruficauda</i> | Rufous-tailed Flatbill | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Ramphotrigon fuscicauda</i> | Dusky-tailed Flatbill | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Attila cinnamomeus</i> | Cinnamon Attila | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Attila torridus</i> | Ochraceous Attila | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Attila citriniventris</i> | Citron-bellied Attila | R | Esp ⁸ Grab ⁸ Foto ²⁵⁵ |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Attila bolivianus</i> | Dull-capped Attila | R | |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Attila spadiceus</i> | Bright-rumped Attila | R | |
| Passeriformes | Oxyruncidae | <i>Oxyruncus cristatus</i> | Sharpbill | R | Esp ⁸³ Foto ³⁰¹ |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Pipreola riefferii</i> | Green-and-black Fruiteater | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Pipreola arcuata</i> | Barred Fruiteater | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Pipreola aureopectus</i> | Golden-breasted Fruiteater | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Pipreola jucunda</i> | Orange-breasted Fruiteater | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Pipreola lubomirskii</i> | Black-chested Fruiteater | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Pipreola chlorolepidota</i> | Fiery-throated Fruiteater | R | Esp ^{28,149} Foto ¹⁴⁹ |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Ampeliooides tschudii</i> | Scaled Fruiteater | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Doliornis remseni</i> | Chestnut-bellied Cotinga | R | Foto ¹ Obs ²⁷² |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Ampelion rubrocristatus</i> | Red-crested Cotinga | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Ampelion rufaxilla</i> | Chestnut-crested Cotinga | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Phoenicircus nigricollis</i> | Black-necked Red-Cotinga | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Rupicola rupicola</i> | Guianan Cock-of-the-rock | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Rupicola peruvianus</i> | Andean Cock-of-the-rock | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Snowornis subalaris</i> | Gray-tailed Piha | R | Esp ³⁰⁶ Obs ³⁵⁷ |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Snowornis cryptolophus</i> | Olivaceous Piha | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Haematoderus militaris</i> | Crimson Fruitcrow | H | Obs ²⁶⁶ |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Querula purpurata</i> | Purple-throated Fruitcrow | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Pyroderus scutatus</i> | Red-ruffed Fruitcrow | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Cephalopterus ornatus</i> | Amazonian Umbrellabird | R | |

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|--------|--|
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Cephalopterus penduliger</i> | Long-wattled Umbrellabird | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Perissocephalus tricolor</i> | Capuchinbird | R | Foto ³²⁴ Obs ^{242,243} |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Cotinga nattererii</i> | Blue Cotinga | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Cotinga maynana</i> | Plum-throated Cotinga | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Cotinga cotinga</i> | Purple-breasted Cotinga | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Cotinga cayana</i> | Spangled Cotinga | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Lipaugus weberi</i> | Chestnut-capped Piha | R-E | Esp ⁸⁴ |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Lipaugus fuscocinereus</i> | Dusky Piha | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Lipaugus unirufus</i> | Rufous Piha | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Lipaugus vociferans</i> | Screaming Piha | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Procnias averano</i> | Bearded Bellbird | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Porphyrolaema porphyrolaema</i> | Purple-throated Cotinga | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Carpodectes hopkei</i> | Black-tipped Cotinga | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Xipholena punicea</i> | Pompadour Cotinga | R | |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Gymnoderus foetidus</i> | Bare-necked Fruitcrow | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Tyranneteutes stolzmanni</i> | Dwarf Tyrant-Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Neopelma chrysocephalum</i> | Saffron-crested Tyrant-Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Chloropipo flavicapilla</i> | Yellow-headed Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Chiroxiphia lanceolata</i> | Lance-tailed Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Chiroxiphia pareola</i> | Blue-backed Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Masius chrysopterus</i> | Golden-winged Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Corapipo altera</i> | White-ruffed Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Corapipo leucorrhoa</i> | White-bibbed Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Xenopipo atronitens</i> | Black Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Cryptopipo holochlora</i> | Green Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Lepidothrix coronata</i> | Blue-crowned Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Lepidothrix isidorei</i> | Blue-rumped Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Heterocercus flavivertex</i> | Yellow-crowned Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Manacus manacus</i> | White-bearded Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Pipra filicauda</i> | Wire-tailed Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Machaeropterus deliciosus</i> | Club-winged Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Machaeropterus regulus</i> | Striped Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Dixiphia pipra</i> | White-crowned Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Ceratopipra mentalis</i> | Red-capped Manakin | R | |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Ceratopipra erythrocephala</i> | Golden-headed Manakin | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Tityra inquisitor</i> | Black-crowned Tityra | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Tityra cayana</i> | Black-tailed Tityra | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Tityra semifasciata</i> | Masked Tityra | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Schiffornis major</i> | Varzea Schiffornis | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Schiffornis veraepacis</i> | Northern Schiffornis | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Schiffornis aenea</i> | Foothill Schiffornis | R | Grab ³⁵⁶ |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Schiffornis stenorhyncha</i> | Russet-winged Schiffornis | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Schiffornis turdina</i> | Brown-winged Schiffornis | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Laniocera rufescens</i> | Speckled Mourner | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Laniocera hypopyrra</i> | Cinereous Mourner | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Iodopleura isabellae</i> | White-browed Purpletuft | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Laniisoma elegans</i> | Shrike-like Cotinga | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Pachyramphus viridis</i> | Green-backed Becard | H | Obs ¹¹² |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Pachyramphus versicolor</i> | Barred Becard | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Pachyramphus rufus</i> | Cinereous Becard | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Pachyramphus cinnamomeus</i> | Cinnamon Becard | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Pachyramphus castaneus</i> | Chestnut-crowned Becard | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Pachyramphus polychropterus</i> | White-winged Becard | R | |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------|
| Passeriformes | Tityridae | <i>Pachyramphus albogriseus</i> | Black-and-white Becard | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Pachyramphus marginatus</i> | Black-capped Becard | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Pachyramphus homochrous</i> | One-colored Becard | R | |
| Passeriformes | Tityridae | <i>Pachyramphus minor</i> | Pink-throated Becard | R | |
| Passeriformes | Incertae Sedis | <i>Piprites chloris</i> | Wing-barred Piprites | R | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Cyclarhis gujanensis</i> | Rufous-browed Peppershrike | R | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Cyclarhis nigrirostris</i> | Black-billed Peppershrike | R | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Hylophilus flavipes</i> | Scrub Greenlet | R | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Hylophilus semicinereus</i> | Gray-cheasted Greenlet | H | Obs ^{157,158} |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Hylophilus brunneiceps</i> | Brown-headed Greenlet | R | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Hylophilus thoracicus</i> | Lemon-cheasted Greenlet | R | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireolanius eximus</i> | Yellow-browed Shrike-Vireo | R | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireolanius leucotis</i> | Slaty-capped Shrike-Vireo | R | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Tunchiornis ochraceiceps</i> | Tawny-crowned Greenlet | R | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Pachysylvia decurtata</i> | Lesser Greenlet | R | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Pachysylvia hypoxantha</i> | Dusky-capped Greenlet | R | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Pachysylvia aurantiifrons</i> | Golden-fronted Greenlet | R | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Pachysylvia semibrunnea</i> | Rufous-naped Greenlet | R | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo flavifrons</i> | Yellow-throated Vireo | Mb | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo masteri</i> | Choco Vireo | R | Esp ³⁰⁵ |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo griseus</i> | White-eyed Vireo | V | Foto ²⁹⁸ |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo approximans</i> | Providence Vireo | R-E | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo caribaeus</i> | San Andres Vireo | R-E | Esp ⁸⁷ |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo philadelphicus</i> | Philadelphia Vireo | Mb | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo leucophrys</i> | Brown-capped Vireo | R | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo olivaceus</i> | Red-eyed Vireo | R-Mb-Ma | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo flavoviridis</i> | Yellow-green Vireo | Mb | |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo altiloquus</i> | Black-whiskered Vireo | Mb | |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Cyanolyca armillata</i> | Black-collared Jay | R | |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Cyanolyca turcosa</i> | Turquoise Jay | R | |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Cyanolyca pulchra</i> | Beautiful Jay | R | |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Cyanocorax violaceus</i> | Violaceous Jay | R | |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Cyanocorax affinis</i> | Black-chested Jay | R | |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Cyanocorax helprini</i> | Azure-naped Jay | R | |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Cyanocorax yncas</i> | Green Jay | R | |
| Passeriformes | Alaudidae | <i>Eremophila alpestris</i> | Horned Lark | R | |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Pygochelidon cyanoleuca</i> | Blue-and-white Swallow | R-Ma | |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Pygochelidon melanoleuca</i> | Black-collared Swallow | R | |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Alopochelidon fucata</i> | Tawny-headed Swallow | R?-Ma? | |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Orochelidon murina</i> | Brown-bellied Swallow | R | |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Orochelidon flavigipes</i> | Pale-footed Swallow | R | |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Atticora fasciata</i> | White-banded Swallow | R | |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Atticora tibialis</i> | White-thighed Swallow | R | |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Stelgidopteryx serripennis</i> | Northern Rough-winged Swallow | H | Obs ^{115,213,17} |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Stelgidopteryx ruficollis</i> | Southern Rough-winged Swallow | R | |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Progne tapera</i> | Brown-chested Martin | R-Ma | |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Progne subis</i> | Purple Martin | Mb | |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Progne chalybea</i> | Gray-breasted Martin | R | |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Progne elegans</i> | Galapagos Martin | H | |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Tachycineta bicolor</i> | Tree Swallow | Mb | |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Tachycineta thalassina</i> | Violet-green Swallow | H | |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Tachycineta albiventer</i> | White-winged Swallow | R | |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Tachycineta cyaneoviridis</i> | Bahama Swallow | H | Obs ^{313,340} |

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Riparia riparia</i> | Bank Swallow | Mb | |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Hirundo rustica</i> | Barn Swallow | Mb | |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Petrochelidon pyrrhonota</i> | Cliff Swallow | Mb | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Microcerculus marginatus</i> | Scaly-breasted Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Odontorchilus branickii</i> | Gray-mantled Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Troglodytes aedon</i> | House Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Troglodytes ochraceus</i> | Ochraceous Wren | R | Grab ²⁷³ |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Troglodytes solstitialis</i> | Mountain Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Troglodytes monticola</i> | Santa Marta Wren | R-E | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Cistothorus platensis</i> | Sedge Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Cistothorus apolinari</i> | Apolinar's Wren | R-E | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Campylorhynchus albostriatus</i> | White-headed Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Campylorhynchus zonatus</i> | Band-backed Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Campylorhynchus nuchalis</i> | Stripe-backed Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Campylorhynchus griseus</i> | Bicolored Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Campylorhynchus turdinus</i> | Thrush-like Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Pheugopedius spadix</i> | Sooty-headed Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Pheugopedius fasciatoventris</i> | Black-bellied Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Pheugopedius euophrys</i> | Plain-tailed Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Pheugopedius mystacalis</i> | Whiskered Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Pheugopedius coraya</i> | Coraya Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Pheugopedius rutilus</i> | Rufous-breasted Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Pheugopedius sclateri</i> | Speckle-breasted Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Thryophilus rufalbus</i> | Rufous-and-white Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Thryophilus sernai</i> | Antioquia Wren | R-E | Esp ¹⁷⁹ |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Thryophilus nicefori</i> | Niceforo's Wren | R-E | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Cantorchilus leucopogon</i> | Stripe-throated Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Cantorchilus nigricapillus</i> | Bay Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Cantorchilus leucotis</i> | Buff-breasted Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Cinnycerthia unirufa</i> | Rufous Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Cinnycerthia olivascens</i> | Sharpe's Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Henicorhina leucosticta</i> | White-breasted Wood-Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Henicorhina leucophrys</i> | Gray-breasted Wood-Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Henicorhina anachoreta</i> | Hermit Wood-Wren | R-E | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Henicorhina negreti</i> | Munchique Wood-Wren | R-E | Esp ²⁹⁹ |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Cyphorhinus thoracicus</i> | Chestnut-breasted Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Cyphorhinus phaeocephalus</i> | Song Wren | R | |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Cyphorhinus arada</i> | Musician Wren | R | |
| Passeriformes | Polioptilidae | <i>Microbates collaris</i> | Collared Gnatwren | R | |
| Passeriformes | Polioptilidae | <i>Microbates cinereiventris</i> | Half-collared Gnatwren | R | |
| Passeriformes | Polioptilidae | <i>Ramphocaenus melanurus</i> | Long-billed Gnatwren | R | |
| Passeriformes | Polioptilidae | <i>Polioptila plumbea</i> | Tropical Gnatcatcher | R | |
| Passeriformes | Polioptilidae | <i>Polioptila guianensis</i> | Guianan Gnatcatcher | H | Obs ^{242,243,163} |
| Passeriformes | Polioptilidae | <i>Polioptila schistaceigula</i> | Slate-throated Gnatcatcher | R | |
| Passeriformes | Donacobiidae | <i>Donacobius atricapilla</i> | Black-capped Donacobius | R | |
| Passeriformes | Cinclidae | <i>Cinclus leucocephalus</i> | White-capped Dipper | R | |
| Passeriformes | Bombycillidae | <i>Bombycilla cedrorum</i> | Cedar Waxwing | V | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Myadestes coloratus</i> | Varied Solitaire | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Myadestes ralloides</i> | Andean Solitaire | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Catharus aurantiirostris</i> | Orange-billed Nightingale-Thrush | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Catharus fuscater</i> | Slaty-backed Nightingale-Thrush | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Catharus dryas</i> | Spotted Nightingale-Thrush | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Catharus fuscescens</i> | Veery | Mb | |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|--------|---------------------|
| Passeriformes | Turdidae | <i>Catharus minimus</i> | Gray-cheeked Thrush | Mb | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Catharus ustulatus</i> | Swainson's Thrush | Mb | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Hylocichla mustelina</i> | Wood Thrush | Mb | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Entomodestes coracinus</i> | Black Solitaire | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Cichlopsis leucogenys</i> | Rufous-brown Solitaire | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus leucops</i> | Pale-eyed Thrush | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus flavipes</i> | Yellow-legged Thrush | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus leucomelas</i> | Pale-breasted Thrush | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus fumigatus</i> | Cocoa Thrush | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus hauxwelli</i> | Hauxwell's Thrush | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus obsOLETUS</i> | Pale-vented Thrush | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus grayi</i> | Clay-colored Thrush | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus nudigenis</i> | Spectacled Thrush | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus sanchezorum</i> | Varzea Thrush | R | Grab ²⁵⁰ |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus lawrencii</i> | Lawrence's Thrush | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus ignobilis</i> | Black-billed Thrush | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus fulviventer</i> | Chestnut-bellied Thrush | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus olivater</i> | Black-hooded Thrush | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus fuscater</i> | Great Thrush | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus serranus</i> | Glossy-black Thrush | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus assimilis</i> | White-throated Thrush | R | |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus albicollis</i> | White-necked Thrush | R | |
| Passeriformes | Mimidae | <i>Dumetella carolinensis</i> | Gray Catbird | Mb | |
| Passeriformes | Mimidae | <i>Mimus gilvus</i> | Tropical Mockingbird | R | |
| Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus rubescens</i> | American Pipit | H | Obs ²⁹⁸ |
| Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus lutescens</i> | Yellowish Pipit | R | |
| Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus bogotensis</i> | Paramo Pipit | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Nemosia pileata</i> | Hooded Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sericossypha albocristata</i> | White-capped Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Parkerthraustes humeralis</i> | Yellow-shouldered Grosbeak | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Catamblyrhynchus diadema</i> | Plushcap | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Chlorophanes spiza</i> | Green Honeycreeper | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Iridophanes pulcherrimus</i> | Golden-collared Honeycreeper | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Chrysothlypis chrysomelas</i> | Black-and-yellow Tanager | R | Esp ²⁹⁵ |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Chrysothlypis salmoni</i> | Scarlet-and-white Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Heterospingus xanthopygius</i> | Scarlet-browed Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Hemithraupis guira</i> | Guira Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Hemithraupis flavicollis</i> | Yellow-backed Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Conirostrum bicolor</i> | Bicolored Conebill | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Conirostrum speciosum</i> | Chestnut-vented Conebill | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Conirostrum leucogenys</i> | White-eared Conebill | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Conirostrum binghami</i> | Giant Conebill | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Conirostrum sitticolor</i> | Blue-backed Conebill | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Conirostrum albifrons</i> | Capped Conebill | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Conirostrum rufum</i> | Rufous-browed Conebill | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Conirostrum cinereum</i> | Cinereous Conebill | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sicalis citrina</i> | Stripe-tailed Yellow-Finch | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sicalis columbiana</i> | Orange-fronted Yellow-Finch | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sicalis flaveola</i> | Saffron Finch | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sicalis luteola</i> | Grassland Yellow-Finch | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Catamenia analis</i> | Band-tailed Seedeater | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Catamenia inornata</i> | Plain-colored Seedeater | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Catamenia homochroa</i> | Paramo Seedeater | R | |

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------|
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Diglossa gloriosissima</i> | Chestnut-bellied Flowerpiercer | R-E | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Diglossa lafresnayii</i> | Glossy Flowerpiercer | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Diglossa humeralis</i> | Black Flowerpiercer | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Diglossa brunneiventris</i> | Black-throated Flowerpiercer | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Diglossa albilatera</i> | White-sided Flowerpiercer | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Diglossa indigotica</i> | Indigo Flowerpiercer | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Diglossa sittoides</i> | Rusty Flowerpiercer | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Diglossa glauca</i> | Deep-blue Flowerpiercer | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Diglossa caerulescens</i> | Bluish Flowerpiercer | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Diglossa cyanea</i> | Masked Flowerpiercer | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Geospizopsis unicolor</i> | Plumbeous Sierra-Finch | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Spodiornis rusticus</i> | Slaty Finch | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Volatinia jacarina</i> | Blue-black Grassquit | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Conothraupis speculigera</i> | Black-and-white Tanager | V? | Esp ¹⁸⁵ |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Creurgops verticalis</i> | Rufous-crested Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tachyphonus cristatus</i> | Flame-crested Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tachyphonus surinamus</i> | Fulvous-crested Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tachyphonus luctuosus</i> | White-shouldered Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tachyphonus delatrii</i> | Tawny-crested Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tachyphonus rufus</i> | White-lined Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tachyphonus phoenicius</i> | Red-shouldered Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Eucometis penicillata</i> | Gray-headed Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Coryphospingus pileatus</i> | Pileated Finch | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Ramphocelus nigrogularis</i> | Masked Crimson Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Ramphocelus dimidiatus</i> | Crimson-backed Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Ramphocelus carbo</i> | Silver-beaked Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Ramphocelus flammigerus</i> | Flame-rumped Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Lanio fulvus</i> | Fulvous Shrike-Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Rhodospingus cruentus</i> | Crimson-breasted Finch | H | Obs ²⁵¹ |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Cyanerpes nitidus</i> | Short-billed Honeycreeper | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Cyanerpes lucidus</i> | Shining Honeycreeper | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Cyanerpes caeruleus</i> | Purple Honeycreeper | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Cyanerpes cyaneus</i> | Red-legged Honeycreeper | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tersina viridis</i> | Swallow Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Dacnis albiventris</i> | White-bellied Dacnis | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Dacnis lineata</i> | Black-faced Dacnis | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Dacnis flaviventer</i> | Yellow-bellied Dacnis | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Dacnis hartlaubi</i> | Turquoise Dacnis | R-E | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Dacnis venusta</i> | Scarlet-thighed Dacnis | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Dacnis cayana</i> | Blue Dacnis | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Dacnis viguieri</i> | Viridian Dacnis | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Dacnis berlepschi</i> | Scarlet-breasted Dacnis | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila bouvronides</i> | Lesson's Seedeater | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila lineola</i> | Lined Seedeater | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila telasco</i> | Chestnut-throated Seedeater | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila castaneiventris</i> | Chestnut-bellied Seedeater | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila minuta</i> | Ruddy-breasted Seedeater | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila funerea</i> | Thick-billed Seed-Finch | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila angolensis</i> | Chestnut-bellied Seed-Finch | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila crassirostris</i> | Large-billed Seed-Finch | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila corvina</i> | Variable Seedeater | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila intermedia</i> | Gray Seedeater | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila murallae</i> | Caqueta Seedeater | R | |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila fringilloides</i> | White-naped Seedeater | R | Esp ^{332,8} |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila luctuosa</i> | Black-and-white Seedeater | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila nigricollis</i> | Yellow-bellied Seedeater | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila caerulescens</i> | Double-collared Seedeater | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila schistacea</i> | Slate-colored Seedeater | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila plumbea</i> | Plumbeous Seedeater | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Saltator maximus</i> | Buff-throated Saltator | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Saltator atripennis</i> | Black-winged Saltator | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Saltator orenocensis</i> | Orinocan Saltator | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Saltator coerulescens</i> | Grayish Saltator | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Saltator striaticeps</i> | Streaked Saltator | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Saltator cinctus</i> | Masked Saltator | R | Esp ²⁷¹ |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Saltator grossus</i> | Slate-colored Grosbeak | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Emberizoides herbicola</i> | Wedge-tailed Grass-Finch | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Pseudospingus verticalis</i> | Black-headed Hemispingus | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Cnemoscopus rubrirostris</i> | Gray-hooded Bush Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Kleinothraupis atropileus</i> | Black-capped Hemispingus | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sphenopsis frontalis</i> | Oleaginous Hemispingus | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sphenopsis melanotis</i> | Black-eared Hemispingus | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Thlypopsis sordida</i> | Orange-headed Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Thlypopsis fulviceps</i> | Fulvous-headed Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Thlypopsis superciliaris</i> | Superciliaried Hemispingus | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Thlypopsis ornata</i> | Rufous-chested Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Urothraupis stolzmanni</i> | Black-backed Bush Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Coereba flaveola</i> | Bananaquit | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tiaris olivaceus</i> | Yellow-faced Grassquit | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tiaris obscurus</i> | Dull-colored Grassquit | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tiaris fuliginosus</i> | Sooty Grassquit | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tiaris bicolor</i> | Black-faced Grassquit | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Chlorochrysa phoenicotis</i> | Glistening-green Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Chlorochrysa calliparaea</i> | Orange-eared Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Chlorochrysa nitidissima</i> | Multicolored Tanager | R-E | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Paroaria nigrogenis</i> | Masked Cardinal | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Paroaria gularis</i> | Red-capped Cardinal | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Schistochlamys melanopis</i> | Black-faced Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Cissopis leverianus</i> | Magpie Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Calochaetes coccineus</i> | Vermilion Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Iridosornis porphyrocephalus</i> | Purplish-mantled Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Iridosornis analis</i> | Yellow-throated Tanager | R | Foto ⁹² Obs ³⁰⁶ |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Iridosornis rufivertex</i> | Golden-crowned Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Pipraeidea melanonota</i> | Fawn-breasted Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Dubusia taeniata</i> | Buff-breasted Mountain-Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Anisognathus melanogenys</i> | Black-cheeked Mountain-Tanager | R-E | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Anisognathus lacrymosus</i> | Lacrimose Mountain-Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Anisognathus igniventris</i> | Scarlet-bellied Mountain-Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Anisognathus somptuosus</i> | Blue-winged Mountain-Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Anisognathus notabilis</i> | Black-chinned Mountain-Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Butthraupis montana</i> | Hooded Mountain-Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Butthraupis wetmorei</i> | Masked Mountain-Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Chlorornis riefferii</i> | Grass-green Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Cnemathraupis eximia</i> | Black-chested Mountain-Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Bangsia arcae</i> | Blue-and-gold Tanager | R | Esp ²⁹⁵ |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Bangsia melanochlamys</i> | Black-and-gold Tanager | R-E | |

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------|
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Bangsia rothschildi</i> | Golden-chested Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Bangsia edwardsi</i> | Moss-backed Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Bangsia aureocincta</i> | Gold-ringed Tanager | R-E | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara ruficervix</i> | Golden-naped Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara cyanoptera</i> | Black-headed Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara heinei</i> | Black-capped Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara palmeri</i> | Gray-and-gold Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara cayana</i> | Burnished-buff Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara vitriolina</i> | Scrub Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara nigrocincta</i> | Masked Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara larvata</i> | Golden-hooded Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara cyanicollis</i> | Blue-necked Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara vassorii</i> | Blue-and-black Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara nigroviridis</i> | Beryl-spangled Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara fucosa</i> | Green-naped Tanager | H | Obs ²⁵⁵ |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara labradorides</i> | Metallic-green Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara cyanotis</i> | Blue-browed Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara inornata</i> | Plain-colored Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara mexicana</i> | Turquoise Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara chilensis</i> | Paradise Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara velia</i> | Opal-rumped Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara callophrys</i> | Opal-crowned Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara lavinia</i> | Rufous-winged Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara gyrola</i> | Bay-headed Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara chrysotis</i> | Golden-eared Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara xanthocephala</i> | Saffron-crowned Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara parzudakii</i> | Flame-faced Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara schrankii</i> | Green-and-gold Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara johannae</i> | Blue-whiskered Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara arthus</i> | Golden Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara florida</i> | Emerald Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara icterocephala</i> | Silver-throated Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Thraupis cyanocephala</i> | Blue-capped Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Thraupis episcopus</i> | Blue-gray Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Thraupis glaucocolpa</i> | Glaucous Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Thraupis palmarum</i> | Palm Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Ixothraupis rufigula</i> | Rufous-throated Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Ixothraupis guttata</i> | Speckled Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Ixothraupis xanthogastra</i> | Yellow-bellied Tanager | R | |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Ixothraupis punctata</i> | Spotted Tanager | R | Foto ²⁶⁶ |
| Passeriformes | Incertae Sedis | <i>Mitrospingus cassinii</i> | Dusky-faced Tanager | R | |
| Passeriformes | Incertae Sedis | <i>Rhodinicichla rosea</i> | Rosy Thrush-Tanager | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Oreothraupis arremonops</i> | Tanager Finch | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Chlorospingus flavigularis</i> | Yellow-throated Chlorospingus | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Chlorospingus parvirostris</i> | Short-billed Chlorospingus | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Chlorospingus canigularis</i> | Ashy-throated Chlorospingus | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Chlorospingus flavopectus</i> | Common Chlorospingus | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Chlorospingus tacarcunae</i> | Tacarcuna Chlorospingus | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Chlorospingus inornatus</i> | Pirre Chlorospingus | H | Obs ^{279,162} |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Chlorospingus semifuscus</i> | Dusky Chlorospingus | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Chlorospingus flavovirens</i> | Yellow-green Chlorospingus | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Passerculus sandwichensis</i> | Savannah Sparrow | H | Obs ^{213,298} |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Ammodramus savannarum</i> | Grasshopper Sparrow | R | |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|--------|---------------------|
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Ammodramus humeralis</i> | Grassland Sparrow | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Ammodramus aurifrons</i> | Yellow-browed Sparrow | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Arremonops conirostris</i> | Black-striped Sparrow | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Arremonops tocuyensis</i> | Tocuyo Sparrow | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Arremon basilicus</i> | Sierra Nevada Brushfinch | R-E | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Arremon perijanus</i> | Perija Brushfinch | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Arremon atricapillus</i> | Black-headed Brushfinch | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Arremon assimilis</i> | Stripe-headed Brushfinch | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Arremon aurantiirostris</i> | Orange-billed Sparrow | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Arremon schlegeli</i> | Golden-winged Sparrow | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Arremon taciturnus</i> | Pectoral Sparrow | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Arremon brunneinucha</i> | Chestnut-capped Brushfinch | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Arremon castaneiceps</i> | Olive Finch | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Arremon crassirostris</i> | Sooty-faced Finch | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Zonotrichia capensis</i> | Rufous-collared Sparrow | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Atlapetes albiniucha</i> | White-naped Brushfinch | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Atlapetes albofrenatus</i> | Moustached Brushfinch | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Atlapetes melanocephalus</i> | Santa Marta Brushfinch | R-E | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Atlapetes semirufus</i> | Ochre-breasted Brushfinch | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Atlapetes flaviceps</i> | Yellow-headed Brushfinch | R-E | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Atlapetes fuscoolivaceus</i> | Dusky-headed Brushfinch | R-E | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Atlapetes leucopis</i> | White-rimmed Brushfinch | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Atlapetes tricolor</i> | Tricolored Brushfinch | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Atlapetes schistaceus</i> | Slaty Brushfinch | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Atlapetes pallidinucha</i> | Pale-naped Brushfinch | R | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Atlapetes blancae</i> | Antioquia Brushfinch | R-E | Esp ⁹⁴ |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Atlapetes latinuchus</i> | Yellow-breasted Brushfinch | R | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Piranga flava</i> | Hepatic Tanager | R | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Piranga rubra</i> | Summer Tanager | Mb | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Piranga olivacea</i> | Scarlet Tanager | Mb | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Piranga rubriceps</i> | Red-hooded Tanager | R | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Piranga leucoptera</i> | White-winged Tanager | R | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Habia rubica</i> | Red-crowned Ant-Tanager | R | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Habia fuscicauda</i> | Red-throated Ant-Tanager | R | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Habia gutturalis</i> | Sooty Ant-Tanager | R-E | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Habia cristata</i> | Crested Ant-Tanager | R-E | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Chlorothraupis carmioli</i> | Carmiol's Tanager | R | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Chlorothraupis olivacea</i> | Lemon-spectacled Tanager | R | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Chlorothraupis stolzmanni</i> | Ochre-breasted Tanager | R | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Pheucticus chrysogaster</i> | Golden-bellied Grosbeak | R | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Pheucticus aureoventris</i> | Black-backed Grosbeak | R | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Pheucticus ludovicianus</i> | Rose-breasted Grosbeak | Mb | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Granatellus pelzelni</i> | Rose-breasted Chat | R | Foto ³²⁴ |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Cardinalis phoeniceus</i> | Vermilion Cardinal | R | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Caryothraustes canadensis</i> | Yellow-green Grosbeak | R | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Amaurospiza concolor</i> | Blue Seedeater | R | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Cyanoloxia cyanoides</i> | Blue-black Grosbeak | R | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Cyanoloxia brissonii</i> | Ultramarine Grosbeak | R | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Passerina caerulea</i> | Blue Grosbeak | V | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Passerina cyanea</i> | Indigo Bunting | V | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Passerina ciris</i> | Painted Bunting | V | Foto ¹⁰⁹ |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Spiza americana</i> | Dickcissel | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Seiurus arocapilla</i> | Ovenbird | Mb | |

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|-----------|----------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------|
| Passeriformes | Parulidae | <i>Helminthorus vermiculus</i> | Worm-eating Warbler | Mb | Foto ¹⁴² |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Parkesia noveboracensis</i> | Northern Waterthrush | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Parkesia motacilla</i> | Louisiana Waterthrush | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Vermivora chrysoptera</i> | Golden-winged Warbler | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Vermivora cyanoptera</i> | Blue-winged Warbler | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Mniotilla varia</i> | Black-and-white Warbler | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Protonotaria citrea</i> | Prothonotary Warbler | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Limnothlypis swainsonii</i> | Swainson's Warbler | V | Foto ²⁹⁸ |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Leiothlypis peregrina</i> | Tennessee Warbler | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Leiothlypis ruficapilla</i> | Nashville Warbler | Mb | Foto ²⁹⁸ |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Oporornis agilis</i> | Connecticut Warbler | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Geothlypis aequinoctialis</i> | Masked Yellowthroat | R | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Geothlypis philadelphica</i> | Mourning Warbler | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Geothlypis formosa</i> | Kentucky Warbler | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Geothlypis semiflava</i> | Olive-crowned Yellowthroat | R | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Geothlypis trichas</i> | Common Yellowthroat | V | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga citrina</i> | Hooded Warbler | V | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga ruticilla</i> | American Redstart | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga tigrina</i> | Cape May Warbler | H | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga cerulea</i> | Cerulean Warbler | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga americana</i> | Northern Parula | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga pitayumi</i> | Tropical Parula | R | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga magnolia</i> | Magnolia Warbler | V | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga castanea</i> | Bay-breasted Warbler | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga fusca</i> | Blackburnian Warbler | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga petechia</i> | Yellow Warbler | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga pensylvanica</i> | Chestnut-sided Warbler | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga striata</i> | Blackpoll Warbler | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga caerulescens</i> | Black-throated Blue Warbler | V | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga palmarum</i> | Palm Warbler | H | Obs ^{157,158,255} |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga pinus</i> | Pine Warbler | H | Obs ³⁴³ |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga coronata</i> | Yellow-rumped Warbler | V | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga dominica</i> | Yellow-throated Warbler | V | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga discolor</i> | Prairie Warbler | V | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga townsendi</i> | Townsend's Warbler | V | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga virens</i> | Black-throated Green Warbler | V | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Myiothlypis luteoviridis</i> | Citrine Warbler | R | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Myiothlypis basilica</i> | Santa Marta Warbler | R-E | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Myiothlypis flaveola</i> | Flavescent Warbler | R | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Myiothlypis nigrocristata</i> | Black-crested Warbler | R | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Myiothlypis fulvicauda</i> | Buff-rumped Warbler | R | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Myiothlypis chrysogaster</i> | Golden-bellied Warbler | R | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Myiothlypis conspicillata</i> | White-lored Warbler | R-E | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Myiothlypis cinereicollis</i> | Gray-throated Warbler | R | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Myiothlypis coronata</i> | Russet-crowned Warbler | R | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Basileuterus rufifrons</i> | Rufous-capped Warbler | R | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Basileuterus culicivorus</i> | Golden-crowned Warbler | R | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Basileuterus ignotus</i> | Pirre Warbler | R | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Basileuterus tristriatus</i> | Three-striped Warbler | R | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Cardellina canadensis</i> | Canada Warbler | Mb | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Cardellina pusilla</i> | Wilson's Warbler | V | Foto ²⁴⁵ |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Myioborus miniatus</i> | Slate-throated Redstart | R | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Myioborus flavivertex</i> | Yellow-crowned Redstart | R-E | |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---|
| Passeriformes | Parulidae | <i>Myioborus ornatus</i> | Golden-fronted Redstart | R | |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Myioborus melanocephalus</i> | Spectacled Redstart | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Psarocolius angustifrons</i> | Russet-backed Oropendola | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Psarocolius viridis</i> | Green Oropendola | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Psarocolius wagleri</i> | Chestnut-headed Oropendola | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Psarocolius decumanus</i> | Crested Oropendola | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Psarocolius guatimozinus</i> | Black Oropendola | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Psarocolius cassini</i> | Baudo Oropendola | R-E | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Psarocolius bifasciatus</i> | Olive Oropendola | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Cacicus solitarius</i> | Solitary Black Cacique | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Cacicus sclateri</i> | Ecuadorian Cacique | R | Esp ^{42,36} |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Cacicus uropygialis</i> | Scarlet-rumped Cacique | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Cacicus cela</i> | Yellow-rumped Cacique | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Cacicus chrysonotus</i> | Mountain Cacique | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Cacicus latirostris</i> | Band-tailed Oropendola | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Cacicus haemorrhois</i> | Red-rumped Cacique | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Cacicus oseryi</i> | Casqued Oropendola | R? | Esp ⁷⁹ |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Amblycercus holosericeus</i> | Yellow-billed Cacique | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Icterus icterus</i> | Venezuelan Troupial | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Icterus croconotus</i> | Orange-backed Troupial | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Icterus mesomelas</i> | Yellow-tailed Oriole | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Icterus cayanensis</i> | Epaulet Oriole | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Icterus spurius</i> | Orchard Oriole | Mb | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Icterus auricapillus</i> | Orange-crowned Oriole | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Icterus chrysater</i> | Yellow-backed Oriole | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Icterus galbula</i> | Baltimore Oriole | Mb | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Icterus leucopteryx</i> | Jamaican Oriole | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Icterus nigrogularis</i> | Yellow Oriole | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Dives warczewiczi</i> | Scrub Blackbird | H | Obs ²⁹⁸ |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Macroagelaius subalaris</i> | Mountain Grackle | R-E | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Gymnomystax mexicanus</i> | Oriole Blackbird | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Hypopyrrhus pyrohypogaster</i> | Red-bellied Grackle | R-E | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Lampropsartanagrinus</i> | Velvet-fronted Grackle | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Chrysomus icterocephalus</i> | Yellow-hooded Blackbird | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Molothrus oryzivorus</i> | Giant Cowbird | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Molothrus aeneus</i> | Bronzed Cowbird | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Molothrus bonariensis</i> | Shiny Cowbird | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Quiscalus lugubris</i> | Carib Grackle | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Quiscalus mexicanus</i> | Great-tailed Grackle | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Dolichonyx oryzivorus</i> | Bobolink | Mb | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Sturnella magna</i> | Eastern Meadowlark | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Sturnella militaris</i> | Red-breasted Blackbird | R | |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Sturnella bellicosa</i> | Peruvian Meadowlark | R | Esp ^{89,226} Foto ¹⁶⁷ |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Spinus spinescens</i> | Andean Siskin | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Spinus yarrellii</i> | Yellow-faced Siskin | V | Foto ⁵³ |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Spinus cucullatus</i> | Red Siskin | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Spinus magellanicus</i> | Hooded Siskin | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Spinus xanthogastrus</i> | Yellow-bellied Siskin | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Spinus psaltria</i> | Lesser Goldfinch | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia plumbea</i> | Plumbeous Euphonia | R | Esp ⁸⁷ |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia chlorotica</i> | Purple-throated Euphonia | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia trinitatis</i> | Trinidad Euphonia | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia concinna</i> | Velvet-fronted Euphonia | R-E | |

| Orden | Familia | Especie | Nombre en inglés | Estado | Evidencia |
|---------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------|
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia saturata</i> | Orange-crowned Euphonia | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia laniirostris</i> | Thick-billed Euphonia | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia cyanocephala</i> | Golden-rumped Euphonia | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia fulvicrissa</i> | Fulvous-vented Euphonia | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia chrysopasta</i> | Golden-bellied Euphonia | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia mesochrysa</i> | Bronze-green Euphonia | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia minuta</i> | White-vented Euphonia | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia anneae</i> | Tawny-capped Euphonia | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia xanthogaster</i> | Orange-bellied Euphonia | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia rufiventris</i> | Rufous-bellied Euphonia | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Chlorophonia cyanea</i> | Blue-naped Chlorophonia | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Chlorophonia pyrrhopraxis</i> | Chestnut-breasted Chlorophonia | R | |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Chlorophonia flavirostris</i> | Yellow-collared Chlorophonia | R | |
| Passeriformes | Estrildidae | <i>Lonchura malacca</i> | Tricolored Munia | Int | Foto ^{49,253} |
| Passeriformes | Passeridae | <i>Passer domesticus</i> | House Sparrow | Int | Esp ^{226,241} |

Anexo 2. Lista de cambios de nomenclatura a nivel de familia, género y especie efectuados desde Hilty & Brown (1986) hasta agosto de 2017.

En la columna "Familia", las familias siguen el orden lineal y composición actuales. En la columna "Nombre antiguo" aparece el nombre científico (o taxón) dado por Hilty & Brown (1986). La columna "Nombre actual" indica el nuevo nombre según el SACC. Las referencias que acompañan los cambios taxonómicos pueden ser consultadas en <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBiblio.htm>

| Familia | Nombre antiguo | Nombre actual | Referencia |
|---------------|--|--|--|
| Anatidae | <i>Neochen jubata</i> | <i>Oressochen jubatus</i> | Transferido a <i>Oressochen</i> (Bulgarella <i>et al.</i> 2014, Remsen <i>et al.</i> 2015). |
| | <i>Anas flavirostris</i> <i>Oxyura dominica</i> | <i>Anas andium</i> <i>Nomonyx dominicus</i> | Separado de <i>A. flavirostris</i> (Ridgely & Greenfield 2001). Transferido de <i>Oxyura</i> (Livezey 1995, McCracken & Sorenson 2005). |
| Cracidae | <i>Aburria pipile</i> <i>Ortalis motmot</i> | <i>Pipile cumanensis</i> <i>Ortalis columbiana</i> <i>Ortalis guttata</i> | Separada de <i>Aburria (Pipile) pipile</i> (del Hoyo 1994). Separadas de <i>O. motmot</i> de las Guyanas y S de Venezuela (Remsen <i>et al.</i> 2010). |
| | <i>Crax tomentosa</i> <i>Crax salvini</i> <i>Crax mitu</i> | <i>Mitu tomentosum</i> <i>Mitu salvini</i> <i>Mitu tuberosum</i> | Transferidos a <i>Mitu</i> (Remsen <i>et al.</i> 2017). |
| | <i>Crax pauxi</i> | <i>Pauxi pauxi</i> | Transferidos a <i>Mitu</i> (Remsen <i>et al.</i> 2017). Separado de <i>M. mitu</i> (del Hoyo 1994). |
| Podicipedidae | <i>Podiceps dominicus</i> | <i>Tachybaptus dominicus</i> | Transferido a <i>Pauxi</i> (Remsen <i>et al.</i> 2017).. |
| Columbidae | <i>Scardafella squammata</i> | <i>Columbina squammata</i> | Transferido a <i>Tachybaptus</i> siguiendo a Storer (1976). Transferida a <i>Columbina</i> (Johnson & Clayton 2000, Johnson 2004). |
| | <i>Geotrygon veraguensis</i> <i>Geotrygon saphirina</i> | <i>Leptotrygon veraguensis</i> <i>Geotrygon saphirina</i> | Transferido a <i>Leptotrygon</i> (Banks <i>et al.</i> 2014). Se mantiene en el listado. |
| | <i>Geotrygon frenata</i> <i>Geotrygon linearis</i> <i>Geotrygon goldmani</i> <i>Columba</i> | <i>Geotrygon purpurata</i> <i>Zentrygon frenata</i> <i>Zentrygon linearis</i> <i>Zentrygon goldmani</i> <i>Patagioenas</i> | Separado de <i>G. saphirina</i> (Donegan & Salaman 2012). Transferidos a <i>Zentrygon</i> (Banks <i>et al.</i> 2014). |
| Cuculidae | <i>Playa minuta</i> <i>Coccyzus pumilus</i> <i>Coccyzus cinereus</i> | <i>Coccycua minuta</i> <i>Coccycua pumila</i> <i>Coccycua cinerea</i> Steatornithiformes Nyctibiiformes | Especies de <i>Columba</i> del Nuevo Mundo fueron separadas de las del Viejo Mundo en <i>Patagioenas</i> (Johnson <i>et al.</i> 2001). Transferido a <i>Coccycua</i> (Sorenson & Payne 2005). Transferidos a <i>Coccycua</i> (Sorenson & Payne 2005). |
| Nyctibidae | <i>Nyctibius leucopterus</i> | <i>Nyctibius maculosus</i> | Incluye a Steatornithidae (Ericson <i>et al.</i> 2006, Hackett <i>et al.</i> 2008, Prum <i>et al.</i> 2015). |
| Caprimulgidae | <i>Podager nacunda</i> <i>Lurocalis semitorquatus</i> | <i>Chordeiles nacunda</i> <i>Lurocalis semitorquatus</i> | Separado de <i>N. leucopterus</i> (Cohn-Haft 1999). Transferido a <i>Chordeiles</i> (Han <i>et al.</i> 2010). |
| | <i>Caprimulgus nigrescens</i> <i>Caprimulgus longirostris</i> <i>Caprimulgus parvulus</i> | <i>Nyctipolus nigrescens</i> <i>Systellura longirostris</i> <i>Setopagis heterura</i> | Se mantiene en el listado. Separado de <i>L. semitorquatus</i> (Fjeldsa & Krabbe 1990). (Remsen <i>et al.</i> 2017). (Remsen <i>et al.</i> 2017). Separado de <i>C. parvulus</i> (Remsen <i>et al.</i> 2011) y luego transferido a <i>Setopagis</i> (Remsen <i>et al.</i> 2017). |
| | <i>Caprimulgus cayennensis</i> <i>Caprimulgus maculicaudus</i> <i>Nyctiphrynus ocellatus</i> | <i>Hydropsalis cayennensis</i> <i>Hydropsalis maculicaudus</i> <i>Nyctiphrynus ocellatus</i> | (Remsen <i>et al.</i> 2017). Se mantiene en el listado. |
| | <i>Caprimulgus carolinensis</i> <i>Caprimulgus rufus</i> | <i>Nyctiphrynus rosenbergi</i> <i>Antrostomus carolinensis</i> <i>Antrostomus rufus</i> | Separado de <i>N. ocellatus</i> (Robbins & Ridgely 1992). Transferidos a <i>Antrostomus</i> (Han <i>et al.</i> 2010). |

| Familia | Nombre antiguo | Nombre actual | Referencia |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Apodidae | <i>Cypseloides rutilus</i> | <i>Streptoprocne rutila</i> | Transferido a <i>Streptoprocne</i> (Marín & Stiles 1992). |
| | <i>Chaetura chapmani</i> | <i>Chaetura viridipennis</i> | Separado de <i>C. chapmani</i> (Marín 1997). |
| | | <i>Chaetura chapmani</i> | Se mantiene en el listado. |
| | <i>Chaetura andrei</i> | <i>Chaetura meridionalis</i> | Separado de <i>C. andrei</i> (Marín 1997). |
| | <i>Micropanyptila furcata</i> | <i>Tachornis furcata</i> | Transferido a <i>Tachornis</i> (Sibley & Monroe 1990). |
| | <i>Reinarda squammata</i> | <i>Tachonis squammata</i> | Transferido a <i>Tachornis</i> (Sibley & Monroe 1990). |
| | <i>Phaethornis squalidus</i> | <i>Phaethornis rupurumii</i> | Separado de <i>P. squalidus</i> (Hinkelmann and Schuchmann 1997). |
| | | <i>Phaethornis atrimentalis</i> | E de los Andes, separado de <i>P. longuemareus</i> (Hinkelmann 1990). |
| | | <i>Phaethornis striigularis</i> | W de los Andes y Catatumbo, separado de <i>P. longuemareus</i> (Hinkelmann 1990). |
| | <i>Phaethornis superciliosus</i> | <i>Phaethornis longirostris</i> | W de los Andes, separado de <i>P. superciliosus</i> (Hinkelmann 1996. Hinkelmann & Schuchmann 1997). |
| Trochilidae | | <i>Phaethornis malaris</i> | E de los Andes, separado de <i>P. superciliosus</i> (Hinkelmann 1996. Hinkelmann & Schuchmann 1997). |
| | <i>Heliangelus zusii</i> | | No reconocido como una especie válida. Probablemente es un híbrido de <i>Aglaeocercus kingii</i> y otra especie (Pérez-Emán <i>et al. In litt</i>) |
| | | | Transferidos a <i>Discosura</i> (Schuchmann 1999). |
| | <i>Lophornis popelairii</i> | <i>Discosura popelairii</i> | |
| | <i>Lophornis langsdorffii</i> | <i>Discosura langsdorffi</i> | |
| | <i>Lophornis conversii</i> | <i>Discosura conversii</i> | |
| | <i>Lophornis longicauda</i> | <i>Discosura longicaudus</i> | |
| | <i>Anthocephala floriceps</i> | <i>Anthocephala floriceps</i> | |
| | | <i>Anthocephala berlepschi</i> | |
| | | | Se mantiene en el listado. |
| Caprimulgidae | <i>Oxypogon guerinii</i> | <i>Oxypogon stubelii</i> | Separado de <i>O. guerinii</i> (Collar & Salaman 2013). |
| | | <i>Oxypogon cyanolaemus</i> | |
| | <i>Polyplancta auresecens</i> | <i>Oxypogon guerinii</i> | |
| | | <i>Heliodoxa aurescens</i> | |
| | <i>Acestrura mulsant</i> | <i>Chaetocercus mulsant</i> | |
| | <i>Acestrura bombus</i> | <i>Chaetocercus bombus</i> | |
| | <i>Acestrura heliodor</i> | <i>Chaetocercus heliodor</i> | |
| | <i>Philodice mitchellii</i> | <i>Chaetocercus astreans</i> | |
| | <i>Chlorostilbon mellisugus</i> | <i>Calliphlox mitchellii</i> | |
| | | <i>Chlorostilbon melanorhynchus</i> | |
| Rallidae | | <i>Chlorostilbon mellisugus</i> | Separada de <i>A. heliodor</i> (Graves 1986). |
| | <i>Thalurania colombica</i> | <i>Thalurania fanniae</i> | Transferido a <i>Calliphlox</i> (Schuchmann 1999). |
| | | <i>Thalurania colombica</i> | Separado de <i>C. mellisugus</i> (Stiles 1996, Remsen <i>et al.</i> 2003). |
| | <i>Hylocharis grayi</i> | <i>Hylocharis humboldtii</i> | Se mantiene en el listado. |
| | | <i>Hylocharis grayi</i> | Separado de <i>H. grayi</i> (Stiles 2003). |
| | <i>Poliolimnas flavigaster</i> | <i>Porzana flavigaster</i> | Se mantiene en el listado. |
| | <i>Gallinula melanops</i> | <i>Porphyriops melanops</i> | Fusionada con <i>T. colombica</i> (Donegan 2012). |
| | <i>Porzana albicollis</i> | <i>Mustelirallus albicollis</i> | Se mantiene en el listado. |
| | <i>Neocrex colombiana</i> | <i>Mustelirallus colombianus</i> | Separado de <i>H. grayi</i> (Stiles 2003). |
| | <i>Neocrex erythrops</i> | <i>Mustelirallus erythrops</i> | Se mantiene en el listado. |
| | <i>Gallinula chloropus</i> | <i>Gallinula galeata</i> | Transferido a <i>Porzana</i> (Remsen <i>et al.</i> 2017). |
| | | | Transferido a <i>Porphyriops</i> (Livezey 1998, 2003, 2007; Garcia-R. <i>et al.</i> 2014). |
| | | | Transferidos a <i>Mustelirallus</i> (Garcia-R. <i>et al.</i> (2014)). |
| | | | Separado de poblaciones del Viejo Mundo de <i>G. chloropus</i> (Groenemberg <i>et al.</i> 2008). |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Familia | Nombre antiguo | Nombre actual | Referencia |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Charadriidae | <i>Hoploxypterus cayanus</i> | <i>Vanellus cayanus</i> | Transferido de <i>Hoploxypterus</i> (Remsen <i>et al.</i> 2017). |
| | <i>Charadrius alexandrinus</i> | <i>Charadrius nivosus</i> | Separado de <i>C. alexandrinus</i> (Funk <i>et al.</i> 2007, Küpper <i>et al.</i> 2009). |
| Scolopacidae | <i>Aphriza virgata</i> | <i>Calidris virgata</i> | Transferido a <i>Calidris</i> (Banks 2012, Gibson & Baker 2012). |
| | <i>Philomachus pugnax</i> | <i>Calidris pugnax</i> | Transferido a <i>Calidris</i> (Banks 2012, Gibson & Baker 2012). |
| | <i>Tryngites subruficollis</i> | <i>Calidris subruficollis</i> | Transferido a <i>Calidris</i> (Banks 2012, Gibson & Baker 2012). |
| | <i>Gallinago gallinago</i> | <i>Gallinago delicata</i> | Separado de <i>G. gallinago</i> del Viejo Mundo (Banks <i>et al.</i> 2002), aplica para las poblaciones migratorias. |
| | | <i>Gallinago paraguaiae</i> | Separado de <i>G. gallinago</i> (Remsen <i>et al.</i> 2017) aplica para las poblaciones residentes. |
| | <i>Gallinago stricklandii</i> | <i>Gallinago jamesoni</i> | Separado de <i>G. stricklandii</i> (Sibley & Monroe 1990). |
| | <i>Catoptrophorus semipalmatus</i> | <i>Tringa semipalmata</i> | Transferido a <i>Tringa</i> (Pereira & Baker 2005). |
| | <i>Heteroscelus incanus</i> | <i>Tringa incana</i> | Transferido a <i>Tringa</i> (Fjeldså & Krabbe 1990, Pereira & Baker 2005). |
| | <i>Micropalama himantopus</i> | <i>Calidris himantopus</i> | Transferido a <i>Calidris</i> (Dittmann & Zink 1991). |
| Stercorariidae | <i>Phalaropus</i> | | Transferido de Phalaropodidae a Scolopacidae (Ericson <i>et al.</i> 2003, Paton <i>et al.</i> 2003). |
| | <i>Catharacta</i> | <i>Stercorarius</i> | Fusionado dentro de <i>Stercorarius</i> (Cohen <i>et al.</i> 1997, Braun & Brumfield 1998). |
| Laridae | <i>Larus serranus</i> | <i>Chroicocephalus serranus</i> | Transferidos a <i>Chroicocephalus</i> ("Masked" species. Crochet <i>et al.</i> 2000, Pons <i>et al.</i> 2005). |
| | <i>Larus cirrocephalus</i> | <i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> | |
| | <i>Larus rudibundus</i> | <i>Chroicocephalus rudibundus</i> | |
| | <i>Larus minutus</i> | <i>Hidrocoloeus minutus</i> | Transferido a <i>Hidrocoloeus</i> (Crochet <i>et al.</i> 2000, Pons <i>et al.</i> 2005). |
| | <i>Larus modestus</i> | <i>Leucophaeus modestus</i> | Transferidos a <i>Leucophaeus</i> ("Hooded" species. Crochet <i>et al.</i> 2000, Pons <i>et al.</i> 2005). |
| | <i>Larus atricilla</i> | <i>Leucophaeus atricilla</i> | |
| | <i>Larus pipixcan</i> | <i>Leucophaeus pipixcan</i> | |
| | <i>Sterna fuscata</i> | <i>Onychoprion fuscatus</i> | Transferido a <i>Onychoprion</i> (Bridge <i>et al.</i> 2005). |
| | <i>Sterna anaethetus</i> | <i>Onychoprion anaethetus</i> | |
| Procellariidae | <i>Sterna albifrons</i> | <i>Sternula antillarum</i> | <i>S. albifrons</i> es considerada conespecífica con <i>S. antillarum</i> (Remsen <i>et al.</i> 2017). Transferido a <i>Sternula</i> (Bridge <i>et al.</i> 2005). |
| | <i>Sterna superciliaris</i> | <i>Sternula superciliaris</i> | Transferido a <i>Sternula</i> (Bridge <i>et al.</i> 2005). |
| | <i>Sterna elegans</i> | <i>Thalasseus elegans</i> | Transferido a <i>Thalasseus</i> (Bridge <i>et al.</i> 2005). |
| | <i>Sterna sandvicensis</i> | <i>Thalasseus sandvicensis</i> | Transferido a <i>Thalasseus</i> (Bridge <i>et al.</i> 2005). Incluye a <i>S. eurygnatha</i> (Remsen <i>et al.</i> 2011). |
| | <i>Sterna maximus</i> | <i>Thalasseus maximus</i> | Transferido a <i>Thalasseus</i> (Bridge <i>et al.</i> 2005). |
| | | Eurypygiformes | Incluye a Eurypygidae (Fain and Houde 2004, Ericson <i>et al.</i> 2006, Hackett <i>et al.</i> 2008). |
| | <i>Puffinus pacificus</i> | <i>Ardenna pacifica</i> | Transferidos a <i>Ardenna</i> (Penhallurick & Wink 2004, Austin <i>et al.</i> 2004, Pyle <i>et al.</i> 2011). |
| | <i>Puffinus griseus</i> | <i>Ardenna grisea</i> | |
| | <i>Puffinus creatopus</i> | <i>Ardenna creatopus</i> | |
| | <i>Puffinus lherminieri</i> | <i>Puffinus subalaris</i> | |
| | | <i>Puffinus lherminieri</i> | Reconocida como una especie diferente a <i>P. lherminieri</i> , y más relacionada con <i>P. nativitatis</i> (Austin <i>et al.</i> 2004); Hilty & Brown (1986) reportan un espécimen de la raza de Galápagos para el Golfo de Cupica; Se mantiene en el listado. |

| Familia | Nombre antiguo | Nombre actual | Referencia |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Sulidae | <i>Sula dactylatra</i> | <i>Sula granti</i> | Separada de <i>S. dactylatra</i> (Pitman & Jehl 1998). |
| | | <i>Sula dactylatra</i> | Se mantiene en la lista. |
| Phalacrocoracidae | <i>Phalacrocorax olivaceus</i> | <i>Phalacrocorax brasilianus</i> | El epíteto específico correcto es <i>brasilianus</i> y no <i>olivaceus</i> (Browning 1989). |
| Ardeidae | <i>Cochlearius cochlearius</i> | | Transferida de Cochlearidae a Ardeidae (Sheldon 1987). |
| | <i>Casmerodius albus</i> | <i>Ardea alba</i> | Transferido de <i>Casmerodius</i> a <i>Ardea</i> (McCracken & Sheldon 1997, 1998). |
| | <i>Hydranassa tricolor</i> | <i>Egretta tricolor</i> | Transferidos a <i>Egretta</i> (Sheldon 1987, Sheldon <i>et al.</i> 2000). |
| | <i>Dichromonassa rufescens</i> | <i>Egretta rufescens</i> | |
| | <i>Florida cerulea</i> | <i>Egretta cerulea</i> | |
| Threskiornithidae | <i>Ajaia ajaja</i> | <i>Platalea ajaja</i> | Transferida a <i>Platalea</i> (Hancock <i>et al.</i> 1992). |
| Accipitridae | <i>Elanus caeruleus</i> | <i>Elanus leucurus</i> | Separado de <i>E. caeruleus</i> del Viejo Mundo (Clark & Banks 1992). |
| | <i>Leucopternis plumbeus</i> | <i>Cryptoleucopteryx plumbea</i> | Transferido a <i>Cryptoleucopteryx</i> (Raposo do Amaral <i>et al.</i> 2009). |
| | <i>Leucopternis schistaceus</i> | <i>Buteogallus schistaceus</i> | Transferido a <i>Buteogallus</i> (Raposo do Amaral <i>et al.</i> 2009). |
| | <i>Heterospizias meridionalis</i> | <i>Buteogallus meridionalis</i> | |
| | <i>Harpyhaliaeetus solitarius</i> | <i>Buteogallus solitarius</i> | |
| | <i>Leucopternis princeps</i> | <i>Morphnarchus princeps</i> | Transferido a <i>Morphnarchus</i> (Raposo do Amaral <i>et al.</i> 2009). |
| | <i>Buteo magnirostris</i> | <i>Rupornis magnirostris</i> | Transferido a <i>Rupornis</i> (Raposo do Amaral <i>et al.</i> 2009). |
| | <i>Buteo leucorrhous</i> | <i>Parabuteo leucorrhous</i> | Transferido a <i>Parabuteo</i> (Raposo do Amaral <i>et al.</i> 2009). |
| | <i>Buteo poecilochrous</i> | <i>Geranoaetus polyosoma</i> | <i>B. poecilochrous</i> fue fusionado dentro de <i>B. polyosoma</i> (Farquhar 1998, Riesing <i>et al.</i> 2003), luego fue transferido a <i>Geranoaetus</i> (Raposo do Amaral <i>et al.</i> 2009). |
| | <i>Buteo albicaudatus</i> | <i>Geranoaetus albicaudatus</i> | Transferido a <i>Geranoaetus</i> (Raposo do Amaral <i>et al.</i> 2009). |
| | <i>Leucopternis albicollis</i> | <i>Pseudastur albicollis</i> | Transferido a <i>Pseudastur</i> (Raposo do Amaral <i>et al.</i> 2009). |
| | <i>Spizastur melanoleucus</i> | <i>Spizaetus melanoleucus</i> | Transferido a <i>Spizaetus</i> (Helbig <i>et al.</i> 2005, Haring <i>et al.</i> 2007). |
| | <i>Oraetus isidori</i> | <i>Spizaetus isidori</i> | |
| Strigidae | <i>Otus</i> | <i>Megascops</i> | Los <i>Otus</i> del Nuevo Mundo fueron separados de los del Viejo Mundo como <i>Megascops</i> (König <i>et al.</i> 1999, Wink <i>et al.</i> 2004). |
| | <i>Otus ingens</i> | <i>Megascops columbianus</i> | Separado de <i>M. ingens</i> (Fitzpatrick & O'Neill 1986), vertiente Pacífica. |
| | <i>Glaucidium minutissimum</i> | <i>Megascops ingens</i> | Se mantiene en el listado, resto de los Andes. |
| | | <i>Glaucidium griseiceps</i> | Separado de <i>G. minutissimum</i> (Howell & Robbins 1995). |
| | <i>Speotyto cunicularia</i> | <i>Athene cunicularia</i> | Transferido a <i>Athene</i> (Remsen <i>et al.</i> 2017). |
| | <i>Rhinoptynx clamator</i> | <i>Asio clamator</i> | Transferido a <i>Pseudoscops</i> (Olson 1995), y recientemente a <i>Asio</i> (Remsen <i>et al.</i> 2016) |
| Trogonidae | <i>Trogon viridis</i> | <i>Trogon chionurus</i> | W de los Andes, separado de <i>T. viridis</i> (Ridgely & Greenfield 2001, Dacosta & Klicka 2008). |
| | <i>Trogon violaceus</i> | <i>Trogon viridis</i> | E de los Andes, se mantiene en el listado. |
| | | <i>Trogon caligatus</i> | W de los Andes, separado de <i>T. violaceus</i> (Ridgely & Greenfield 2001, Dacosta & Klicka 2008). |
| | | <i>Trogon ramonianus</i> | E de los Andes, separado de <i>T. violaceus</i> (Dacosta & Klicka 2008). |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Familia | Nombre antiguo | Nombre actual | Referencia |
|----------------|--|--|---|
| Alcedinidae | <i>Ceryle</i> | <i>Megaceryle</i> | Separado de <i>Ceryle</i> . <i>Megaceryle</i> aplica para las especies del Nuevo Mundo (Fry 1980). |
| Momotidae | <i>Baryphthengus ruficapillus</i> <i>Momotus momota</i> | <i>Baryphthengus martii</i> <i>Momotus subrufescens</i> | Separado de <i>B. ruficapillus</i> (Sick 1993). W de los Andes y Catatumbo. Separado de <i>M. momota</i> (Stiles 2009). |
| | | <i>Momotus aequatorialis</i> | Andes. Separado de <i>M. momota</i> (Stiles 2009). |
| Galbulidae | <i>Galbula leucogastra</i> | <i>Galbula chalcothorax</i> <i>Galbula leucogastra</i> | E de los Andes, se mantiene en el listado. |
| Bucconidae | <i>Notharchus macrorhynchus</i> | <i>Notharchus hyperynchus</i> | Separado de <i>N. macrorhynchus</i> (Rasmussen & Collar 2002). |
| Capitonidae | <i>Capito niger</i> | <i>Capito auratus</i> | Separado de <i>C. niger</i> (Armenta <i>et al.</i> 2005, Haffer 1997). |
| Semnornithidae | <i>Semnornis ramphastinus</i> | | Transferida de Capitonidae a Semnornithidae (Barker & Lanyon 2000, Moyle 2004). |
| Ramphastidae | <i>Ramphastos swainsonii</i> | <i>Ramphastos ambiguus</i> | Fusionado con <i>R. swainsonii</i> (Short & Horne 2001, 2002b). |
| | <i>Ramphastos citreolaemus</i> | <i>Ramphastos vitellinus</i> | <i>R. citreolaemus</i> y <i>R. culminatus</i> son considerados subespecies de <i>R. vitellinus</i> (Haffer 1974, Patané <i>et al.</i> 2009). |
| | <i>Ramphastos culminatus</i> | | |
| | <i>Pteroglossus sanguineus</i> | <i>Pteroglossus torquatus</i> | <i>P. sanguineus</i> es considerado una subespecie de <i>P. torquatus</i> (Haffer 1974, Short & Horne 2002b). |
| | <i>Pteroglossus flavirostris</i> | <i>Pteroglossus azara</i> | El epíteto específico correcto es <i>azara</i> (Sibley & Monroe 1990). |
| Picidae | <i>Melanerpes chrysauchen</i> | <i>Melanerpes pulcher</i> | Separado de <i>M. chrysauchen</i> de Centro América (Remsen <i>et al.</i> 2004). |
| | <i>Veniliornis fumigatus</i> | <i>Picoides fumigatus</i> | Transferido a <i>Picoides</i> (Moore <i>et al.</i> 2006). |
| | <i>Veniliornis affinis</i> | <i>Veniliornis affinis</i> | E de los Andes, se mantiene en el listado. |
| | | <i>Veniliornis chocoensis</i> | Separado de <i>V. affinis</i> (Winkler & Christie 2002), Pacífico. |
| | <i>Piculus leucolaemus</i> | <i>Piculus leucolaemus</i> | Magdalena medio y Cordillera Oriental, se mantiene en el listado. |
| | | <i>Piculus litae</i> | Separado de <i>P. leucolaemus</i> (Winkler & Christie 2002), Pacífico. |
| | <i>Piculus rubiginosus</i> | <i>Colaptes rubiginosus</i> | Transferidos a <i>Colaptes</i> (Benz <i>et al.</i> 2006, Moore <i>et al.</i> 2011). |
| | <i>Piculus rivolii</i> | <i>Colaptes rivolii</i> | |
| | <i>Chrysotilus punctigula</i> | <i>Colaptes punctigula</i> | Transferido a <i>Colaptes</i> (Remsen <i>et al.</i> 2017). |
| Falconidae | <i>Polyborus plancus</i> | <i>Caracara cheriway</i> | El género correcto es <i>Caracara</i> (Banks & Dove 1992). <i>C. cheriway</i> fue separado de <i>C. plancus</i> del S de Suramérica (Dove & Banks 1999). |
| | <i>Daptrius americanus</i> | <i>Ibycter americanus</i> | Transferido a <i>Ibycter</i> (Griffiths 1999, Griffiths <i>et al.</i> 2004). |
| Psittacidae | <i>Ara manilata</i> | <i>Orthopsittaca manilata</i> | Transferido a <i>Orthopsittaca</i> (Sick 1990). |
| | <i>Forpus sclateri</i> | <i>Forpus modestus</i> | El epíteto específico correcto es <i>modestus</i> (Pacheco & Whitney 2006). |
| | <i>Pionopsitta</i> | <i>Pyrilia</i> | Especies de <i>Pionopsitta</i> fueron transferidas a <i>Pyrilia</i> (Ribas <i>et al.</i> 2005, Remsen <i>et al.</i> 2008). |
| | <i>Aratinga pertinax</i> | <i>Eupstittula pertinax</i> | (Remsen <i>et al.</i> 2017). |
| | <i>Aratinga acuticauda</i> | <i>Thectocercus acuticaudatus</i> | (Remsen <i>et al.</i> 2017). |
| | <i>Aratinga wagleri</i> | <i>Psittacara wagleri</i> | (Remsen <i>et al.</i> 2017). |
| | <i>Aratinga leucophthalma</i> | <i>Psittacara leucophthalmus</i> | |
| Sapayoidea | | <i>Sapayoidea</i> | <i>Sapayoaa aenigma</i> fue transferido de <i>Pipridae</i> a <i>Eurylaimidae</i> (Banks <i>et al.</i> 2008) y recientemente asignado a su propia familia Sapayooidae (Fjeldså <i>et al.</i> 2003, Irestedt <i>et al.</i> 2006, Moyle <i>et al.</i> 2006). |

| Familia | Nombre antiguo | Nombre actual | Referencia |
|----------------|----------------------------------|--|--|
| Thamnophilidae | | Thamnophilidae | Nueva familia, separada de Formicariidae (Sibley & Ahlquist 1990, Moyle <i>et al.</i> 2009). |
| | <i>Terenura callinota</i> | <i>Euchrepomis callinota</i> | Transferidos a <i>Euchrepomis</i> (Bravo <i>et al.</i> 2012). |
| | <i>Terenura spodioptila</i> | <i>Euchrepomis spodioptila</i> | |
| | <i>Frederickena unduliger</i> | <i>Frederickena fulva</i> | Separado de <i>F. unduliger</i> (Isler <i>et al.</i> 2009). |
| | <i>Thamnophilus palliatus</i> | <i>Thamnophilus tenuepunctatus</i> | Separado de <i>T. palliatus</i> (Ridgely & Tudor 1994, Zimmer & Isler 2003). |
| | <i>Thamnophilus punctatus</i> | <i>Thamnophilus atrinucha</i> | W de los Andes y Catatumbo. Separado de <i>T. punctatus</i> (Isler <i>et al.</i> 1997). |
| | <i>Sakesphorus melanotus</i> | <i>Thamnophilus punctatus</i> <i>Thamnophilus melanotus</i> | E de los Andes. Se mantiene en el listado. Transferido a <i>Thamnophilus</i> (Brumfield & Edwards 2007). |
| | <i>Thamnomanes occidentalis</i> | <i>Dysithamnus occidentalis</i> | Transferido a <i>Dysithamnus</i> (Ridgely & Tudor 1994). |
| | <i>Dysithamnus plumbeus</i> | <i>Dysithamnus leucostictus</i> | Separado de <i>D. plumbeus</i> (Isler <i>et al.</i> 2008). |
| | <i>Myrmotherula hauxwellii</i> | <i>Isleria hauxwellii</i> | Transferido a <i>Isleria</i> (Bravo <i>et al.</i> 2012). |
| | <i>Myrmotherula fulviventris</i> | <i>Epinecrophylla fulviventris</i> | Transferido a <i>Epinecrophylla</i> (Isler <i>et al.</i> 2006). |
| | <i>Myrmotherula haematonota</i> | <i>Epinecrophylla haematonota</i> | |
| | <i>Myrmotherula spodionota</i> | <i>Epinecrophylla spodionota</i> | |
| | <i>Myrmotherula ornata</i> | <i>Epinecrophylla ornata</i> | |
| | <i>Myrmotherula erythrura</i> | <i>Epinecrophylla erythrura</i> | |
| | <i>Myrmotherula brachyura</i> | <i>Myrmotherula brachyura</i> | |
| | | <i>Myrmotherula ignota</i> | Incluye solo las poblaciones cis-Andinas de <i>M. brachyura</i> (Isler & Isler 2003). |
| | <i>Myrmotherula surinamensis</i> | <i>Myrmotherula multostriata</i> | Separado de <i>M. brachyura</i> , e incluye a <i>M. obscura</i> , el cual pasa a ser una subespecie de <i>M. ignota</i> (Isler & Isler 2003). |
| | <i>Herpsilochmus sticturus</i> | <i>Myrmotherula pacifica</i> | Separado de <i>M. surinamensis</i> (Isler <i>et al.</i> 1999). |
| | <i>Drymophila caudata</i> | <i>Herpsilochmus dugandi</i> <i>Drymophila hellmayri</i> | Separada de <i>H. sticturus</i> (Ridgely & Tudor 1994). Separada de <i>D. caudata</i> (Isler <i>et al.</i> 2012). Endémico de la Sierra Nevada de Santa Marta. |
| | | <i>Drymophila klaguesi</i> | Separada de <i>D. caudata</i> (Isler <i>et al.</i> 2012). NE Colombia en Serranía de Perijá y el norte de la Cordillera oriental en el Dpto. de Norte de Santander. |
| | | <i>Drymophila caudata</i> | Endémico de la vertiente occidental de la Cordillera oriental y el alto valle del Magdalena en Caquetá y Huila (Isler <i>et al.</i> 2012). |
| | | <i>Drymophila striaticeps</i> | Separada de <i>D. caudata</i> (Isler <i>et al.</i> 2012). Ambas vertientes de las Cordilleras central y occidental. |
| | <i>Hypocnemis cantator</i> | <i>Hypocnemis flavesiensis</i> <i>Hypocnemis peruviana</i> | Separada de <i>H. cantator</i> (Isler <i>et al.</i> 2007). |
| | <i>Cercomacra parkeri</i> | <i>Cercomacroides parkeri</i> | Separada de <i>H. cantator</i> (Isler <i>et al.</i> 2007). |
| | <i>Cercomacra tyrannina</i> | <i>Cercomacroides tyrannina</i> | Transferidos a <i>Cercomacroides</i> (Tello <i>et al.</i> 2014). |
| | <i>Cercomacra serva</i> | <i>Cercomacroides serva</i> | |
| | <i>Cercomacra nigrescens</i> | <i>Cercomacroides nigrescens</i> | |
| | <i>Cercomacra nigrescens</i> | <i>Cercomacra fuscicauda</i> | |
| | <i>Percnostola schistacea</i> | <i>Myrmelastes schistaceus</i> | |
| | | | Separado de <i>C. nigrescens</i> (Mayer <i>et al.</i> 2014). Transferido a <i>Schistocichla</i> (Ridgely & Tudor 1994), y recientemente a <i>Myrmelastes</i> (Brumfield <i>et al.</i> 2007, Isler <i>et al.</i> 2013). |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Familia | Nombre antiguo | Nombre actual | Referencia |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| | <i>Myrmeciza hyperythrus</i> | <i>Myrmelastes hyperythrus</i> | Transferido a <i>Myrmelastes</i> (Brumfield <i>et al.</i> 2007, Isler <i>et al.</i> 2013). |
| | <i>Percnostola leucostigma</i> | <i>Myrmelastes leucostigma</i> | Transferido a <i>Schistocichla</i> (Ridgely & Tudor 1994), y recientemente a <i>Myrmelastes</i> (Brumfield <i>et al.</i> 2007, Isler <i>et al.</i> 2013). |
| | <i>Myrmeciza exsul</i> | <i>Poliocrania exsul</i> | Transferido a <i>Poliocrania</i> (Isler <i>et al.</i> 2013). |
| | <i>Myrmeciza laemosticta</i> | <i>Sipia palliata</i> | Anteriormente en <i>Myrmeciza</i> pero transferido a <i>Sipia</i> (Isler <i>et al.</i> 2013). La subespecie <i>palliata</i> de Suramerica fue separada de <i>M. laemosticta</i> de Centro América (Cháves <i>et al.</i> 2010). |
| | <i>Sipia rosenbergi</i> | <i>Sipia nigricauda</i> | <i>S. rosenbergi</i> es un sinónimo de <i>Myrmeciza laemosticta nigricauda</i> (Robbins and Ridgely 1991). Zimmer & Isler (2003) separaron a <i>M. nigricauda</i> de <i>M. laemosticta</i> . |
| | <i>Myrmeciza hemimelaena</i> | <i>Sciaphylax castanea</i> | Separado de <i>M. hemimelaena</i> y tratado como <i>M. castanea</i> (Isler <i>et al.</i> 2002). Recientemente transferido a <i>Sciaphylax</i> (Isler <i>et al.</i> 2013). |
| | <i>Myrmeciza melanoceps</i> | <i>Akletos melanoceps</i> | Separado de <i>Myrmeciza</i> (Brumfield <i>et al.</i> 2007, Isler <i>et al.</i> 2013, 2014). |
| | <i>Myrmeciza fortis</i> | <i>Hafferia fortis</i> | Separado de <i>Myrmeciza</i> (Isler <i>et al.</i> 2013). |
| | <i>Myrmeciza inmaculata</i> | <i>Hafferia zeledoni</i> | Separada de <i>M. inmaculata</i> (Donegan 2012); tierras bajas del Chocó y piedemonte de la Cordillera occidental (0-2000 m) desde sur de Panamá al norte de Ecuador. Recientemente transferido a <i>Hafferia</i> (Isler <i>et al.</i> 2013). |
| | | <i>Hafferia inmaculata</i> | Ambas vertientes de la mitad norte de la Cordillera Central, Serranías de San Lucas y de Perijá, y ambas vertientes de la porción norte de la Cordillera Oriental (Donegan 2012). Recientemente transferido a <i>Hafferia</i> (Isler <i>et al.</i> 2013). |
| | <i>Myrmeciza disjuncta</i> | <i>Aprositornis disjuncta</i> | Transferido a <i>Aprositornis</i> (Isler <i>et al.</i> 2013). |
| | <i>Myrmeciza atrothorax</i> | <i>Myrmophylax atrothorax</i> | Transferido a <i>Myrmophylax</i> (Isler <i>et al.</i> 2013). |
| | <i>Myrmeciza pelzelni</i> | <i>Ammonastes pelzelni</i> | Transferido a <i>Ammonastes</i> (Isler <i>et al.</i> 2013). |
| | <i>Hylophylax poecilonota</i> | <i>Willisornis poecilonotus</i> | Transferido a <i>Willisornis</i> (Brumfield <i>et al.</i> 2007, Agne & Pacheco 2007). |
| | <i>Phlegopsis barringeri</i> | <i>Phlegopsis nigromaculata</i> | Incluye a <i>P. barringeri</i> , considerado un híbrido entre <i>P. nigromaculata</i> y <i>P. erythroptera</i> (Graves 1992). |
| Conopophagidae | | Conopophagidae | Nueva familia, separada de Formicariidae (Sibley & Ahlquist 1990, Chesser 2004, Moyle <i>et al.</i> 2009). |
| Grallaridae | | Grallaridae | Nueva familia, separada de Formicariidae (Irestedt <i>et al.</i> 2002). |
| | <i>Hylopezus fulviventris</i> | <i>Hylopezus fulviventris</i> | Se mantiene en el listado. E de los Andes. |
| | | <i>Hylopezus dives</i> | Separado de <i>H. fulviventris</i> (Ridgely & Tudor 1994). Pacífico. |

| Familia | Nombre antiguo | Nombre actual | Referencia |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Rhinocryptidae | <i>Scytalopus femoralis</i> | <i>Scytalopus santaemartae</i> | Separados de <i>S. femoralis</i> (Krabbe & Schulenberg 1997). |
| | | <i>Scytalopus micropterus</i> | |
| | | <i>Scytalopus atratus</i> | |
| | <i>Scytalopus latebricola</i> | <i>Scytalopus latebricola</i> | Sierra Nevada de Santa Marta. |
| | | <i>Scytalopus spillmanni</i> | Andes. Separado de <i>S. latebricola</i> (Krabbe & Schulenberg 1997). |
| | <i>Scytalopus magellanicus</i> | <i>Scytalopus griseicollis</i> | Separado de <i>S. magellanicus</i> (Krabbe & Schulenberg 1997). Incluye a <i>S. infasciatus</i> (Donegan & Avendaño 2008). |
| Formicariidae | | <i>Scytalopus canus</i> | Separado de <i>S. magellanicus</i> (Krabbe & Schulenberg 1997). Inicialmente incluía las subespecies <i>canus</i> y <i>opacus</i> , ésta última posteriormente elevada a especie (ver abajo). |
| | <i>Chamaeza ruficauda</i> | <i>Scytalopus opacus</i> | Separado de <i>S. canus</i> (Krabbe & Cadena 2010). |
| Furnariidae | <i>Dendrocolaptidae</i> | <i>Chamaeza turdina</i> | Separada de <i>C. ruficauda</i> (Willis 1992) |
| | <i>Deconychura stictolaema</i> | <i>Certhiasomus stictolaemus</i> | Incluye a Dendrocolaptidae y Furnariidae (Chesser <i>et al.</i> 2004, Moyle <i>et al.</i> 2009). |
| | <i>Dendrocolaptes certhia</i> | <i>Dendrocolaptes sanctithomae</i> | Transferido a <i>Certhiasomus</i> (Derryberry <i>et al.</i> 2010a). |
| | <i>Xiphorhynchus guttatus</i> | <i>Dendrocolaptes certhia</i> | Separado de <i>D. certhia</i> (Marantz 1997). |
| | | <i>Xiphorhynchus susurrans</i> | Se mantiene en el listado. |
| | | | W de los Andes y Catatumbo. Separado de <i>X. guttatus</i> (Ridgely & Tudor 1994). |
| | <i>Xiphorhynchus picus</i> | <i>Xiphorhynchus guttatus</i> | E de los Andes. Se mantiene en el listado. |
| | <i>Xiphorhynchus spixii</i> | <i>Dendroplex picus</i> | Transferido a <i>Dendroplex</i> (Aleixo <i>et al.</i> 2007). |
| | <i>Campylorhamphus pucherani</i> | <i>Xiphorhynchus elegans</i> | Las poblaciones colombianas (<i>buenavistae</i> y <i>ornatus</i>) son tratadas como parte de <i>X. elegans</i> . |
| | <i>Lepidocolaptes affinis</i> | <i>Drymotoxeres pucherani</i> | Transferido a <i>Drymotoxeres</i> (Claramunt <i>et al.</i> 2010). |
| | | <i>Lepidocolaptes lacrymiger</i> | Separado de <i>L. affinis</i> de Centro América (Ridgely & Tudor 1994, Chesser <i>et al.</i> 2009, Arbeláez-Cortés <i>et al.</i> 2010). |
| | <i>Lepidocolaptes albolineatus</i> | <i>Lepidocolaptes duidae</i> | Separado de <i>L. albolineatus</i> (Rodrigues <i>et al.</i> 2013). |
| | <i>Xenops milleri</i> | <i>Microxenops milleri</i> | Transferido de <i>Xenops</i> a <i>Microxenops</i> (Moyle <i>et al.</i> 2009, Derryberry <i>et al.</i> 2011). |
| | <i>Cinclodes rufus</i> | <i>Cinclodes albiventris</i> | Separado de <i>C. fuscus</i> (Sanín <i>et al.</i> 2009). |
| | <i>Automolus dorsalis</i> | <i>Anabazenops dorsalis</i> | Transferido a <i>Anabazenops</i> (Kratter & Parker 1997). |
| | <i>Philydor ruficaudatum</i> | <i>Anabacerthia ruficaudata</i> | Transferido de <i>Philydor</i> a <i>Anabacerthia</i> (Derryberry <i>et al.</i> 2011). |
| | <i>Automolus rufigularis</i> | <i>Automolus rufigularis</i> | Sierra Nevada de Santa Marta. Separado de <i>A. rufigularis</i> (Krabbe 2008). |
| | | | Se mantiene en el listado. |
| | <i>Hyloctistes subulatus</i> | <i>Automolus rufigularis</i> | Transferido de <i>Hyloctistes</i> a <i>Automolus</i> (Remsen <i>et al.</i> 2014) |
| | <i>Automolus rubiginosus</i> | <i>Clibanornis rubiginosus</i> | Transferidos de <i>Automolus</i> a <i>Clibanornis</i> (Remsen <i>et al.</i> 2014) |
| | <i>Automolus rufigularis</i> | <i>Clibanornis rufigularis</i> | |
| | <i>Schizeoaca perijana</i> | <i>Asthenes perijana</i> | Transferido a <i>Asthenes</i> (Derryberry <i>et al.</i> 2010b). |
| | <i>Schizoeaca fuliginosa</i> | <i>Asthenes fuliginosa</i> | |
| | <i>Synallaxis propinquua</i> | <i>Mazaria propinquua</i> | Transferido a <i>Mazaria</i> (Remsen <i>et al.</i> 2016) |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Familia | Nombre antiguo | Nombre actual | Referencia |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Tyrannidae | <i>Anairetes agilis</i> | <i>Uromyias agilis</i> | Transferido a <i>Uromyias</i> (Dubay & Witt 2012). |
| | <i>Zimmerius viridiflavus</i> | <i>Zimmerius chrysops</i> | Separado de <i>Z. viridiflavus</i> (Ridgely & Tudor 1994). |
| | <i>Zimmerius chrysops</i> | <i>Zimmerius albicularis</i> | Tierras bajas del Chocó biogeográfico. Separado de <i>Z. (viridiflavus) chrysops</i> (Rheindt <i>et al.</i> 2008). |
| | | <i>Zimmerius chrysops</i> | E de los Andes, excepto Nariño. |
| | <i>Elaenia chiriquensis</i> | <i>Elaenia brachyptera</i> | Separada de <i>E. chiriquensis</i> (Rheindt <i>et al.</i> 2015) |
| | | <i>Elaenia chiriquensis</i> | Se mantiene en el listado. |
| | <i>Pogonotriccus poecilotis</i> | <i>Phylloscartes poecilotis</i> | Trasferidos a <i>Phylloscartes</i> (Ridgely & Tudor 1994). |
| | <i>Pogonotriccus ophthalmicus</i> | <i>Phylloscartes ophthalmicus</i> | |
| | <i>Pogonotriccus orbitalis</i> | <i>Phylloscartes orbitalis</i> | |
| | <i>Sublegatus arenarum</i> | <i>Sublegatus arenarum</i> | Se mantiene en el listado. |
| | | <i>Sublegatus modestus</i> | Separado de <i>S. arenarum</i> (Ridgely & Tudor 1994). |
| | <i>Sublegatus modestus</i> | <i>Sublegatus obscurior</i> | Separado de <i>S. modestus</i> (Ridgely & Tudor 1994). En Hilty & Brown (1986) correspondería a <i>S. modestus</i> . |
| | | <i>Inezia subflava</i> | Incluye subsp <i>obscura</i> . |
| | | <i>Inezia caudata</i> | Separada de <i>I. subflava</i> , e incluye subespecies <i>intermedia</i> y <i>caudata</i> (Zimmer & Whittaker 2000). |
| | <i>Myiornis ecaudatus</i> | <i>Myiornis ecaudatus</i> | E de los Andes. |
| | | <i>Myiornis atricapillus</i> | Separada de <i>M. ecaudatus</i> (Ridgely & Tudor 1994), W de los Andes. |
| | <i>Todirostrum laticroste</i> | <i>Poecilotriccus laticroste</i> | Transferidos a <i>Poecilotriccus</i> (Lanyon 1988). |
| | <i>Todirostrum sylvia</i> | <i>Poecilotriccus sylvia</i> | |
| | <i>Todirostrum calopterum</i> | <i>Poecilotriccus calopterus</i> | |
| | <i>Rhynchocyclus brevirostris</i> | <i>Rhynchocyclus brevirostris</i> | Se mantiene en el listado. NW Colombia. |
| | <i>Neopipo cinnamomea</i> | <i>Rynchocyclus pacificus</i> | Separada de <i>R. brevirostris</i> (Ridgely & Tudor 1994). |
| | | | Transferido de Pipridae a Tyrannidae (Mobley & Prum 1995). |
| | <i>Myiophobus pulcher</i> | <i>Nephelomyias pulcher</i> | Transferido a <i>Nephelomyias</i> (Ohlson <i>et al.</i> 2009). |
| | <i>Empidonax euleri</i> | <i>Lathotriccus euleri</i> | Transferido a <i>Lathotriccus</i> (Lanyon & Lanyon 1986. Cicero & Johnson 2002). |
| | <i>Empidonax traillii</i> | <i>Empidonax traillii</i> | Se mantiene en el listado. |
| | | <i>Empidonax alnorum</i> | Separado de <i>E. traillii</i> (Stein 1963). |
| | <i>Contopus borealis</i> | <i>Contopus cooperi</i> | Anteriormente llamado <i>C. borealis</i> pero el epíteto correcto es <i>cooperi</i> (Banks & Browning 1995). |
| | <i>Ochthoeca littoralis</i> | <i>Ochthornis littoralis</i> | En base a evidencia morfológica fue transferido de <i>Ochthoeca</i> (Lanyon 1988). |
| | | <i>Conopias parvus</i> | E de los Andes. |
| | | <i>Conopias albivittatus</i> | Separada de <i>C. parvus</i> (Ridgely & Tudor 1994), Pacífico. |
| | <i>Myiotheretes erythropygius</i> | <i>Cnemarchus erythropygius</i> | En base a evidencia morfológica fue transferido de <i>Myiotheretes</i> (Lanyon 1988). |
| | <i>Tyranopsis luteiventris</i> | <i>Myiozetetes luteiventris</i> | Transferido de <i>Tyranopsis</i> (Lanyon 1985?). |
| | <i>Sirystes sibilator</i> | <i>Sirystes albogriseus</i> | Separado de <i>S. sibilator</i> (Donegan <i>et al.</i> 2013). |
| | | <i>Sirystes albocinereus</i> | Separado de <i>S. sibilator</i> (Donegan <i>et al.</i> 2013). |
| Oxyruncidae | | <i>Oxyruncidae</i> | Nueva familia, separado de Cotingidae en base a evidencia morfológica (Lanyon 1985) y genética (Ohlson 2007, Tello <i>et al.</i> 2009). |
| Cotingidae | <i>Rupicola</i> | | Transferido de Rupicolidae a Cotingidae (Ohlson <i>et al.</i> 2007). |
| | <i>Lipaugus subalaris</i> | <i>Snowornis subalaris</i> | Transferidos a <i>Snowornis</i> (Prum 2001). |
| | <i>Lipaugus cryptolophus</i> | <i>Snowornis cryptolophus</i> | |

| Familia | Nombre antiguo | Nombre actual | Referencia |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Pipridae | <i>Corapipo leucorrhoea</i> | <i>Corapipo altera</i> | Separada de <i>C. leucorrhoea</i> (Sibley & Monroe 1990; Ridgely & Tudor 1994). Darién al S hasta Snía del Baudó. |
| | <i>Chloropipo holochlora</i> | <i>Corapipo leucorrhoea</i> | Se mantiene en el listado. Resto del país. |
| | <i>Allocotopterus deliciosus</i> | <i>Cryptopipo holochlora</i> | Transferido a <i>Cryptopipo</i> (Ohlson <i>et al.</i> 2013). |
| | <i>Pipra pipra</i> | <i>Machaeropterus deliciosus</i> | Transferido a <i>Machaeropterus</i> (Prum 1992). |
| | <i>Pipra mentalis</i> | <i>Dixiphia pipra</i> | Transferido a <i>Pipra</i> (Rego <i>et al.</i> 2007, Tello <i>et al.</i> 2009, McKay <i>et al.</i> 2010). |
| | <i>Pipra erythrocephala</i> | <i>Ceratopipra mentalis</i> | Transferido a <i>Ceratopipra</i> (Rego <i>et al.</i> 2007, Tello <i>et al.</i> 2009, McKay <i>et al.</i> 2010). |
| | <i>Manacus manacus</i> | <i>Manacus manacus</i> | <i>M. vitellinus</i> fue fusionado con <i>M. manacus</i> (Remsen <i>et al.</i> 2017). |
| | <i>Manacus vitellinus</i> | | |
| | <i>Pipra coronata</i> | <i>Lepidothrix coronata</i> | Transferidos a <i>Lepidothrix</i> (Prum 1992. Rêgo <i>et al.</i> 2007). |
| | <i>Pipra isidorei</i> | <i>Lepidothrix isidorei</i> | |
| Tityridae | | <i>Tityridae</i> | Nueva familia, incluye desde <i>Tityra</i> hasta <i>Pachyramphus</i> (Barber & Rice 2007, Tello <i>et al.</i> 2009). |
| | <i>Schiffornis turdinus</i> | <i>Schiffornis veraepacis</i> | Separado de <i>Schiffornis turdina</i> (Nyári 2007, Donegan <i>et al.</i> 2011). Tierras bajas del Darién al sur por el Chocó. |
| | | <i>Schiffornis aenea</i> | Separado de <i>Schiffornis turdina</i> (Nyári 2007, Donegan <i>et al.</i> 2011). Piedemonte amazónico. |
| | | <i>Schiffornis stenorhyncha</i> | Separado de <i>Schiffornis turdina</i> (Nyári 2007, Donegan <i>et al.</i> 2011). Cerro Tacarcuna al Este por valle del Magdalena medio, piedemontes de Cordilleras Central y Oriental, y Catatumbo. |
| | | <i>Schiffornis turdina</i> | Tierras bajas amazónicas. |
| Incertae Sedis | <i>Platyparis homochrous</i> | <i>Pachyramphus homochrous</i> | Transferidos de <i>Platyparis</i> , forman un grupo monofiléticos con <i>Pachyramphus</i> (Barber & Rice 2007) |
| | <i>Platyparis minor</i> | <i>Pachyramphus minor</i> | Transferido de Pipidae (Prum & Lanyon 1989, Barber & Rice 2007), probablemente relacionado con Tyrannidae (Tello <i>et al.</i> 2009). |
| | | <i>Piprites chloris</i> | |
| Vireonidae | <i>Vireo crassirostris</i> | <i>Vireo approximans</i> | Tratado como subespecie de <i>V. crassirostris</i> o <i>V. pallens</i> (Chesser <i>et al.</i> 2016, Brewer 2017). Tratado como una especie diferente (Donegan <i>et al.</i> 2016). |
| | <i>Vireo olivaceus</i> | <i>Vireo flavoviridis</i> | Separado de <i>V. olivaceus</i> (Johnson <i>et al.</i> 1985). |
| | <i>Hylophilus ochraceiceps</i> | <i>Vireo olivaceus</i> | Se mantiene en el listado. |
| | <i>Hylophilus semibrunneus</i> | <i>Tunchiornis ochraceiceps</i> | Transferido a <i>Tunchiornis</i> (Slager & Klicka 2014). |
| | <i>Hylophilus aurantiifrons</i> | <i>Pachysylvia semibrunnea</i> | Transferidos a <i>Pachysylvia</i> (Slager <i>et al.</i> 2014). |
| | <i>Hylophilus hypoxanthus</i> | <i>Pachysylvia aurantiifrons</i> | |
| | <i>Hylophilus decurtatus</i> | <i>Pachysylvia hypoxantha</i> | |
| | <i>Cyanolyca viridicyana</i> | <i>Pachysylvia decurtata</i> | |
| | <i>Notiochelidon cyanoleuca</i> | <i>Cyanolyca armillata</i> | Separada de <i>C. viridicyana</i> (Ridgely & Tudor 1994). |
| | <i>Notiochelidon melanoleuca</i> | <i>Pygochelidon cyanoleuca</i> | Transferido a <i>Pygochelidon</i> (Sheldon <i>et al.</i> 2005, Remsen <i>et al.</i> 2008). |
| Corvidae | <i>Notiochelidon murina</i> | <i>Pygochelidon melanoleuca</i> | Transferido a <i>Orochelidon</i> (Sheldon <i>et al.</i> 2005, Remsen <i>et al.</i> 2008). |
| | <i>Notiochelidon flavipes</i> | <i>Orochelidon murina</i> | Transferido a <i>Orochelidon</i> (Sheldon <i>et al.</i> 2005, Remsen <i>et al.</i> 2008). |
| | <i>Neochelidon tibialis</i> | <i>Orochelidon flavipes</i> | Transferido a <i>Atticora</i> (Sheldon <i>et al.</i> 2005, Remsen <i>et al.</i> 2008). |
| | <i>Progne modesta</i> | <i>Atticora tibialis</i> | |
| | | <i>Progne elegans</i> | <i>P. elegans</i> es tratada como una especie diferente a <i>P. modesta</i> . |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Familia | Nombre antiguo | Nombre actual | Referencia |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Troglodytidae | <i>Troglodytes solstitialis</i> | <i>Troglodytes monticola</i> | Separado de <i>T. solstitialis</i> (Sibley & Monroe 1990), Sierra Nevada de Santa Marta. |
| | | <i>Troglodytes solstitialis</i> | Andes y Pacífico. |
| | <i>Thryothorus spadix</i> | <i>Pheugopedius spadix</i> | Separado de <i>Thryothorus</i> (Mann <i>et al.</i> 2006, 2009). <i>T. mystacalis</i> fue separado de <i>T. genibarbis</i> (Ridgely & Tudor 1989). <i>T. sclateri</i> fue separado de <i>T. maculipectus</i> (Ridgely & Tudor 1989). |
| | <i>Thryothorus fasciatoventris</i> | <i>Pheugopedius fasciatoventris</i> | |
| | <i>Thryothorus euophrys</i> | <i>Pheugopedius euophrys</i> | |
| | <i>Thryothorus genibarbis</i> | <i>Pheugopedius mystacalis</i> | |
| | <i>Thryothorus coraya</i> | <i>Pheugopedius coraya</i> | |
| | <i>Thryothorus rutilus</i> | <i>Pheugopedius rutilus</i> | |
| | <i>Thryothorus maculipectus</i> | <i>Pheugopedius sclateri</i> | |
| | <i>Thryothorus rufalbus</i> | <i>Thryophilus rufalbus</i> | Separado de <i>Thryothorus</i> (Mann <i>et al.</i> 2006, 2009). |
| | <i>Thryothorus nicefori</i> | <i>Thryophilus nicefori</i> | |
| | <i>Thryothorus leucopogon</i> | <i>Cantorchilus leucopogon</i> | Separado de <i>Thryothorus</i> (Mann <i>et al.</i> 2006, 2009). |
| | <i>Thryothorus nigricapillus</i> | <i>Cantorchilus nigricapillus</i> | |
| | <i>Thryothorus leucotis</i> | <i>Cantorchilus leucotis</i> | |
| Polioptilidae | <i>Cinnycerthia peruviana</i> | <i>Cinnycerthia olivascens</i> | Separado de <i>C. peruviana</i> (Brumfield & Remsen 1996) |
| | <i>Henicorhina leucophrys</i> | <i>Henicorhina anachoreta</i> | Separada de <i>H. leucophrys</i> (Cadena <i>et al.</i> 2015) |
| | <i>Sylviidae</i> | <i>Polioptilidae</i> | Evidencia genética sugiere que las Currucas del Nuevo Mundo están más relacionadas con Troglodytidae que con las Currucas del Viejo Mundo (Sylviidae) (Sibley & Ahlquist 1990, Johansson <i>et al.</i> 2008); |
| Donacobidae | | Donacobidae | Nueva familia. <i>Donacobius</i> fue transferido de Troglodytidae (Baker 2004, Alström <i>et al.</i> 2006, Aleixo & Pacheco 2006). |
| Turdidae | <i>Myadestes leucogenys</i> | <i>Cichlopsis leucogenys</i> | Transferido a <i>Cichlopsis</i> (Ridgely & Tudor 1989). |
| | <i>Platycichla leucops</i> | <i>Turdus leucops</i> | Transferidos a <i>Turdus</i> (Klicka <i>et al.</i> 2005, Collar 2005). |
| | <i>Platycichla flavipes</i> | <i>Turdus flavipes</i> | |
| | <i>Turdus obsoletus</i> | <i>Turdus hauxwelli</i> | Separada de <i>T. obsoletus</i> (Ridgely & Tudor 1989). Monotípica, E de los Andes. |
| | | <i>Turdus obsOLEtus</i> | Incluye subespecies <i>obsoletus</i> , <i>parambanus</i> y <i>colombianus</i> . <i>Orinocensis</i> es considerada una subsp de <i>T. fumigatus</i> (Collar 2005). |
| Mimidae | <i>Mimus magnirostris</i> | <i>Mimus gilvus</i> | <i>Mimus magnirostris</i> es considerado una subespecie de <i>M. gilvus</i> (Collar 2005). |
| Thraupidae | <i>Caryothrautes humeralis</i> | <i>Parkerthrautes humeralis</i> | Separado de <i>Caryothrautes</i> (Demastes & Remsen 1994, Remsen 1997). Transferido de Emberizidae a Thraupidae (Remsen <i>et al.</i> 2011). |
| | <i>Catamblyrhynchus diadema</i> | | Transferido de Catamblyrhynchidae a Thraupidae (Bledsoe 1988). |
| | <i>Erythroclypis salmoni</i> | <i>Chrysotlypis salmoni</i> | Transferido a <i>Chrysotlypis</i> (Ridgely & Tudor 1989). |
| | <i>Oreomanes fraseri</i> | <i>Conirostrum binghami</i> | Transferido a <i>Conirostrum</i> (Burns <i>et al.</i> 2016), con cambio de epíteto específico (Dickinson & Christidis 2014). |
| | <i>Phrygilus unicolor</i> | <i>Geospizopsis unicolor</i> | Transferido de Emberizidae a Thraupidae (Remsen <i>et al.</i> 2011), luego a <i>Geospizopsis</i> (Burns <i>et al.</i> 2016). |
| | <i>Haplospiza rustica</i> | <i>Spodiornis rusticus</i> | Transferido de Emberizidae a Thraupidae (Remsen <i>et al.</i> 2011), luego a <i>Spodiornis</i> (Burns <i>et al.</i> 2016). |

| Familia | Nombre antiguo | Nombre actual | Referencia |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | <i>Ramphocelus flammigerus</i> | <i>Ramphocelus flammigerus</i> | Incluye a <i>R. icteronotus</i> con el que intergrada en el SW Colombia (Sibely 1958, Ridgely & Tudor 1989). |
| | <i>Ramphocelus icteronotus</i> | | |
| | <i>Tersina viridis</i> | | Transferido de Tersinidae a Thraupidae (Burns <i>et al.</i> 2003). |
| | <i>Pseudodacnis hartlaubi</i> | <i>Dacnis hartlaubi</i> | Transferido de <i>Dacnis</i> (Ridgely & Tudor 1989). |
| | <i>Sporophila insulata</i> | <i>Sporophila telasco</i> | <i>Sporophila insulata</i> es un morfo o subespecie de <i>S. telasco</i> (Stiles 2004). |
| | <i>Oryzoborus</i> | | Transferido de Emberizidae a Thraupidae (Remsen <i>et al.</i> 2011). |
| | <i>Oryzoborus angolensis</i> | <i>Sporophila funerea</i> | Separada de <i>O. angolensis</i> (1981a,b). Incluye subespecies <i>ochrogyne</i> (Vertiente Pacífica al E hasta valle medio del Magdalena) y <i>aethiops</i> (W Nariño). Transferido a <i>Sporophila</i> (Mason & Burns 2013). |
| | | <i>Sporophila angolensis</i> | Incluye subespecies <i>theobromae</i> (Alto valle del Magdalena) y <i>angolensis</i> (E de los Andes). Transferido a <i>Sporophila</i> (Mason & Burns 2013). |
| | <i>Oryzoborus crassirostris</i> | <i>Sporophila crassirostris</i> | Transferido a <i>Sporophila</i> (Mason & Burns 2013). |
| | <i>Oryzoborus maximiliani</i> | <i>Sporophila crassirostris</i> | La subespecie <i>Sporophila maximiliani occidentalis</i> del Chocó fue transferida a <i>O. crassirostris</i> (Ridgely & Tudor 1994), por lo que <i>S. maximiliani</i> no se mantiene en el listado. |
| | <i>Sporophila americana</i> | <i>Sporophila corvina</i> | Separados de <i>S. americana</i> (Stiles 1996). |
| | <i>Dolospingus fringilloides</i> | <i>Sporophila murallae</i> | Transferido de Emberizidae a Thraupidae (Remsen <i>et al.</i> 2011). Transferido a <i>Sporophila</i> (Mason & Burns 2013). |
| | | <i>Sporophila fringilloides</i> | Transferido a Thraupidae (Barker <i>et al.</i> 2013, Remsen <i>et al.</i> 2016). |
| | | <i>Saltator</i> | Provisionalmente en Incertae Sedis (Remsen <i>et al.</i> 2011). Transferido a <i>Saltator</i> (Remsen <i>et al.</i> 2017). |
| | <i>Pitylus grossus</i> | <i>Saltator grossus</i> | Separado de <i>S. albicollis</i> (Seutin <i>et al.</i> 1993). |
| | <i>Saltator albicollis</i> | <i>Saltator striatipectus</i> | Transferidos de Emberizidae a Thraupidae (Remsen <i>et al.</i> 2011). |
| | <i>Sicalis</i> | | |
| | <i>Catamenia</i> | | |
| | <i>Volatinia jacarina</i> | | |
| | <i>Coryphospingus pileatus</i> | | |
| | <i>Rhodospingus cruentus</i> | | |
| | <i>Sporophila</i> | | |
| | <i>Emberizoides herbicola</i> | | |
| | <i>Coereba flaveola</i> | | |
| | <i>Tiaris</i> | | |
| | <i>Hemispingus verticalis</i> | <i>Pseudospingus verticalis</i> | Transferido a <i>Pseudospingus</i> (Burns <i>et al.</i> 2016). |
| | <i>Hemispingus atropileus</i> | <i>Kleinothraupis atropileus</i> | Transferido a <i>Kleinothraupis</i> (Burns <i>et al.</i> 2016). |
| | <i>Hemispingus frontalis</i> | <i>Sphenopsis frontalis</i> | Transferidos a <i>Sphenopsis</i> (Burns <i>et al.</i> 2016). |
| | <i>Hemispingus melanotis</i> | <i>Sphenopsis melanotis</i> | |
| | <i>Hemispingus superciliaris</i> | <i>Thlypopsis superciliaris</i> | Transferido a <i>Thlypopsis</i> (Burns <i>et al.</i> 2016). |
| | <i>Paroaria gularis</i> | <i>Paroaria gularis</i> | Transferido de Emberizidae a Thraupidae (Yuri and Midell 2002, Klicka <i>et al.</i> 2007). |
| | | | Separada de <i>P. gularis</i> (Dávalos & Porzecanski 2009). |
| | <i>Anisognathus flavinucha</i> | <i>Paroaria nigrogenis</i> | Antes como <i>A. flavinucha</i> (Sibley & Monroe 1990); |
| | <i>Buthraupis eximia</i> | <i>Anisognathus somptuosus</i> | Transferido a <i>Cnemathraupis</i> (Remsen <i>et al.</i> 2012). |
| | <i>Tangara rufigula</i> | <i>Cnemathraupis eximia</i> | Transferidos a <i>Ixothraupis</i> (Burns <i>et al.</i> 2016). |
| | <i>Tangara guttata</i> | <i>Ixothraupis rufigula</i> | |
| | <i>Tangara xanthogastra</i> | <i>Ixothraupis guttata</i> | |
| | <i>Tangara punctata</i> | <i>Ixothraupis xanthogastra</i> | |
| | | <i>Ixothraupis punctata</i> | |

Estado del conocimiento de la avifauna colombiana

| Familia | Nombre antiguo | Nombre actual | Referencia |
|----------------|------------------------------------|--|--|
| Incertae Sedis | | <i>Mitrospingus</i> <i>Rhodinicichla</i> | Provisionalmente en Incertae Sedis (Remsen <i>et al.</i> 2011). |
| Emberizidae | | Emberizidae | Nueva familia, agrupa varios taxa anteriormente ubicados en Fringillidae y Thraupidae (Burns <i>et al.</i> 2002, 2003, Klicka <i>et al.</i> 2007). |
| | <i>Atlapetes brunneinucha</i> | <i>Arremon brunneinucha</i> | Transferidos de <i>Atlapetes</i> a <i>Buarremón</i> por Remsen & Graves (1985) y luego movido a <i>Arremon</i> (Cadena <i>et al.</i> 2007). |
| | <i>Atlapetes atricapillus</i> | <i>Arremon atricapillus</i> | |
| | <i>Atlapetes torquatus</i> | <i>Arremon basilicus</i> <i>Arremon perijanus</i> <i>Arremon assimilis</i> | Separados de <i>Atlapetes (Arremon) torquatus</i> (Cadena & Cuervo 2010). |
| | <i>Lysurus castaneiceps</i> | <i>Arremon castaneiceps</i> | Transferidos a <i>Arremon</i> (Cadena <i>et al.</i> 2007). |
| | <i>Lysurus crassirostris</i> | | |
| | <i>Atlapetes gutturalis</i> | <i>Atlapetes albinucha</i> | <i>A. gutturalis</i> fue fusionado en <i>A. albinucha</i> (Dickinson 2003). |
| | <i>Atlapetes rufinucha</i> | <i>Atlapetes latinuchus</i> | <i>A. latinuchus</i> fue separado de <i>A. rufinucha</i> (Remsen & Graves 1985, García-Moreno & Fjeldså 1999). |
| | | <i>Chlorospingus</i> | Transferido de Thraupidae a Emberizidae (Burns <i>et al.</i> 2002, 2003, Klicka <i>et al.</i> 2007). |
| | <i>Chlorospingus ophthalmicus</i> | <i>Chlorospingus flavopectus</i> | Transferido a <i>C. flavopectus</i> (Remsen <i>et al.</i> 2012). |
| Cardinalidae | | <i>Cardinalidae</i> | Nueva familia, agrupa varios taxones (desde <i>Piranga</i> hasta <i>Spiza</i>) antiguamente ubicados en Thraupidae y Fingillidae (AOU 1998). |
| | <i>Pheucticus chrysopaeplus</i> | <i>Pheucticus chrysogaster</i> | Separado de <i>P. chrysopaeplus</i> (Ridgely & Tudor 1989). |
| | <i>Guiraca caerulea</i> | <i>Passerina caerulea</i> | Transferido a <i>Passerina</i> (Klicka <i>et al.</i> 2000, 2007). |
| | <i>Cyanocompsa</i> | <i>Cyanoloxia</i> | Género cambiado (Remsen <i>et al.</i> 2016) |
| Parulidae | <i>Seiurus noveboracensis</i> | <i>Parkesia noveboracensis</i> | Transferidos a <i>Parkesia</i> (Sangster 2008b), no aplica para <i>Seiurus aurocapilla</i> . |
| | <i>Seiurus motacilla</i> | <i>Parkesia motacilla</i> | |
| | <i>Vermivora pinus</i> | <i>Vermivora chrysoptera</i> | Epíteto cambiado a <i>cyanoptera</i> (Olson & Reveal 2009, Remsen <i>et al.</i> 2010). |
| | <i>Vermivora peregrina</i> | <i>Leiothlypis peregrina</i> | Transferidos a <i>Leiothlypis</i> (Sangster 2008a), no aplica para <i>Vermivora chrysoptera</i> y <i>V. pinus</i> . |
| | <i>Vermivora ruficapilla</i> | <i>Leiothlypis ruficapilla</i> | |
| | <i>Oporornis philadelphica</i> | <i>Geothlypis philadelphica</i> | Transferidos a <i>Geothlypis</i> (Remsen <i>et al.</i> 2012). |
| | <i>Oporornis formosus</i> | <i>Geothlypis formosa</i> | |
| | <i>Wilsonia citrina</i> | <i>Setophaga citrina</i> | Transferida a <i>Setophaga</i> (Remsen <i>et al.</i> 2012). |
| | <i>Dendroica</i> | <i>Setophaga</i> | Todas las especies anteriormente en <i>Dendroica</i> fueron transferidas a <i>Setophaga</i> (Remsen <i>et al.</i> 2012). |
| | <i>Parula</i> | <i>Setophaga</i> | Todas las especies anteriormente en <i>Parula</i> fueron transferidas a <i>Setophaga</i> (Remsen <i>et al.</i> 2012). |
| | <i>Basileuterus luteoviridis</i> | <i>Myiothlypis luteoviridis</i> | Transferidos a <i>Myiothlypis</i> (Remsen <i>et al.</i> 2012). |
| | <i>Basileuterus basilicus</i> | <i>Myiothlypis basilica</i> | |
| | <i>Basileuterus flaveolus</i> | <i>Myiothlypis flaveola</i> | |
| | <i>Basileuterus nigrocristatus</i> | <i>Myiothlypis nigrocristata</i> | |
| | <i>Basileuterus chrysogaster</i> | <i>Myiothlypis chrysogaster</i> | |
| | <i>Basileuterus conspicillatus</i> | <i>Myiothlypis conspicillata</i> | |
| | <i>Basileuterus cinereocollis</i> | <i>Myiothlypis cinereocollis</i> | |
| | <i>Basileuterus coronatus</i> | <i>Myiothlypis coronata</i> | Transferido a <i>Phaeothlypis</i> (AOU 1998), luego a <i>Myiothlypis</i> (Remsen <i>et al.</i> 2012). |
| | <i>Basileuterus fulvicauda</i> | <i>Myiothlypis fulvicauda</i> | |
| | <i>Basileuterus signatus</i> | | Eliminado del listado (Stiles 2011). |
| | <i>Wilsonia canadensis</i> | <i>Cardellina canadensis</i> | Transferida a <i>Cardellina</i> (Lovette <i>et al.</i> 2010, Remsen <i>et al.</i> 2012). |
| | <i>Wilsonia pusilla</i> | <i>Cardellina pusilla</i> | |

| Familia | Nombre antiguo | Nombre actual | Referencia |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | <i>Zarhynchus wagleri</i> | <i>Psarocolius wagleri</i> | Transferido de <i>Zarhynchus</i> (Ridgely & Tudor 1989). |
| | <i>Gymnostinops guatimozinus</i> | <i>Psarocolius guatimozinus</i> | <i>Gymnostinops</i> fue fusionado dentro de <i>Psarocolius</i> (Ridgely & Tudor 1989). |
| | <i>Psarocolius yuracares</i> | <i>Psarocolius bifasciatus</i> | <i>P. yuracares</i> es una subespecie de <i>P. bifasciatus</i> (Ridgely & Tudor 1989). |
| | <i>Cacicus leucoramphus</i> | <i>Cacicus chrysonotus</i> | Controversial. El grupo <i>leucoramphus</i> es considerado una especie distinta del grupo <i>chrysonotus</i> (Jaramillo & Burke 1999), aunque también han sido tratados como conespecíficos (debido a cierto flujo), en tal caso <i>chrysonotus</i> tiene prioridad (Remsen <i>et al.</i> 2011). |
| | <i>Ocyalus latirostris</i> | <i>Cacicus latirostris</i> | Transferidos a <i>Cacicus</i> (Powell <i>et al.</i> 2014). |
| | <i>Clypichterus oseryi</i> | <i>Cacicus oseryi</i> | |
| | <i>Icterus jamacaii</i> | <i>Icterus croconotus</i> | Separado de <i>I. jamacaii</i> (Ridgely & Tudor 1989, Jaramillo & Burke 1999). |
| | <i>Icterus cayanensis</i> | <i>Icterus cayanensis</i> | <i>I. chrysocephalus</i> es considerado una subespecie de <i>I. cayanensis</i> (Omland <i>et al.</i> 1999, D'Horta <i>et al.</i> 2008). |
| | <i>Icterus chrysocephalus</i> | | Transferido a <i>Chrysomus</i> (Lanyon 1994, Johnson & Lanyon 1999). |
| | <i>Agelaius icterocephalus</i> | <i>Chrysomus icterocephalus</i> | |
| | <i>Scaphydura oryzivora</i> | <i>Molothrus oryzivorus</i> | Transferido de <i>Scaphidura</i> (Johnson & Lanyon 1999). |
| | <i>Molothrus armenti</i> | <i>Molothrus aeneus</i> | <i>M. armenti</i> es considerado una subespecie de <i>M. aeneus</i> (Dugand & Eisenmann 1983). |
| Fringillidae | | <i>Euphonia</i> | Transferido a Fringillidae (Burns 1997, Burns <i>et al.</i> 2002, Klicka <i>et al.</i> 2000, Sato <i>et al.</i> 2001, Yuri and Mindell 2002). |
| | <i>Euphonia musica</i> | <i>Euphonia cyanocephala</i> | Separada de <i>E. musica</i> (Sibley & Monroe 1990); |
| | | <i>Chlorophonia</i> | Transferido a Fringillidae (Burns 1997, Burns <i>et al.</i> 2002, Klicka <i>et al.</i> 2000, Sato <i>et al.</i> 2001, Yuri and Mindell 2002). |
| Estrildidae | | Estrildidae | Nueva familia para Colombia con base en poblaciones en libertad y establecidas de <i>Lonchura malacca</i> (Carantón-Ayala <i>et al.</i> 2008). |
| Passeridae | Ploceidae | Passeridae | <i>Passer</i> y otros géneros no están relacionados con <i>Ploceidae</i> , por lo que fueron transferido a su propia familia (Barker <i>et al.</i> 2002). |

Anexo 3. Lista de especies cuya presencia o estado en el país no ha sido documentada formalmente, o corresponden a separaciones taxonómicas no implementadas en el SACC.

| Orden | Familia | Especie | Anotaciones |
|------------------|----------------|--------------------------------|---|
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas platyrhynchos</i> | Observaciones de individuos en áreas urbanas y rurales han sido asumidas como evidencia de establecimiento de la especie (Salaman <i>et al.</i> 2008). Sin embargo, evidencia de poblaciones criando en estado silvestre y con poblaciones viables no es contundente (ABO 2000, Baptiste & Múnera 2010, Remsen <i>et al.</i> 2016). |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Chordeiles gundlachii</i> | Citado por varios autores (Cleere & Nurley 1998, McNish 2003) pero sin evidencia. |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Schistes albogularis</i> | Separado de <i>S. geoffroyi</i> (del Hoyo & Collar 2014, Donegan <i>et al.</i> 2015). No implementado por el SACC. |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Coeligena conradii</i> | Separado de <i>C. torquata</i> (del Hoyo & Collar 2014, Donegan <i>et al.</i> 2015). No implementado por el SACC. |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Coeligena consita</i> | Separado de <i>C. bonapartei</i> (del Hoyo & Collar 2014, Donegan <i>et al.</i> 2015). No implementado por el SACC. |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Urochroa leucura</i> | Separado de <i>U. bougueri</i> (del Hoyo & Collar 2014, Donegan <i>et al.</i> 2015). No implementado por el SACC. |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Archilochus colubris</i> | Reportado en <i>McNish</i> (2003); sin embargo, la foto reportada fue tomada en Texas, USA (Donegan <i>et al.</i> 2014). |
| Gruiformes | Psophidae | <i>Psophia leucoptera</i> | Registro fotográfico de baja calidad que limita la identificación taxonómica (van Leeuwen & Hoogeland 2004). |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus belcheri</i> | Especie probable para el país, pero sin registros confirmados (Estela <i>et al.</i> 2010). |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Pseudastur occidentalis</i> | Observación no documentada incluida en una lista de observación (Donegan <i>et al.</i> 2010). |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Megascops sp</i> | Corresponde al <i>Megascops</i> conocido como "Santa Marta Screech-Owl"; un taxón aún no descrito. |
| Galbuliformes | Galbulidae | <i>Galbula cyanescens</i> | Registro del PNN Amacayacu, Amazonas, sin evidencia o descripción del registro (Salaman <i>et al.</i> 2001). |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Hypnelus bicinctus</i> | Separado de <i>H. ruficollis</i> (del Hoyo & Collar 2014, Donegan <i>et al.</i> 2015). No implementado por el SACC. |
| Galbuliformes | Bucconidae | <i>Monasa atra</i> | Registros al Este de Colombia (Hilty 2003) y Puerto Inírida, Guainía (Gallo-Cajiao 2002) requieren confirmación. |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Pteroglossus aracari</i> | Sin evidencia o descripción del registro (Salaman <i>et al.</i> 2001). |
| Piciformes | Picidae | <i>Campephilus splendens</i> | Separado de <i>C. haematogaster</i> (del Hoyo & Collar 2014, Donegan <i>et al.</i> 2015). No implementado por el SACC. |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura pacifica</i> | Separado de <i>P. melanura</i> (del Hoyo & Collar 2014). No implementado por el SACC. |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura chapmani</i> | Separado de <i>P. melanura</i> (Donegan <i>et al.</i> 2015). No implementado por el SACC. |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Euchrepomis humeralis</i> | Sin evidencia o descripción del registro (Ridgely & Tudor 1994; Salaman <i>et al.</i> 2001). |
| Passeriformes | Thamnophilidae | <i>Frederickena unduliger</i> | Especie probable para el país (Isler <i>et al.</i> 2009), pero sin registros confirmados. |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Sclerurus obscurior</i> | Separado de <i>S. mexicanus</i> (Donegan <i>et al.</i> 2014). No implementado por el SACC. |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Sclerurus peruvianus</i> | Separado de <i>S. mexicanus</i> (Donegan <i>et al.</i> 2014). No implementado por el SACC. |
| Passeriformes | Furnariidae | <i>Automolus virgatus</i> | Separado de <i>A. subulatus</i> (Ridgely & Tudor 2001; Hilty 2003; Donegan <i>et al.</i> 2014). No implementado por el SACC. |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Zimmerius improbus</i> | Separado de <i>Z. vilissimus</i> (Ridgely & Tudor 1994; Hilty 2003; Donegan <i>et al.</i> 2010). No implementado por el SACC. |

| Orden | Familia | Especie | Anotaciones |
|---------------|--------------|--------------------------------|--|
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Zimmerius minimus</i> | Separado de <i>Z. chrysops</i> (Ridgely & Tudor 1994; Hilty 2003; Donegan <i>et al.</i> 2010). No implementado por el SACC. |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Todirostrum pictum</i> | Registro del Leticia, Amazonas, sin evidencia o descripción del registro (Salaman <i>et al.</i> 2001). No coincide con la distribución de la especie. |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiophobus roraimae</i> | Especímenes (ICN e IAVH) atribuídos a <i>M. roraimae</i> (Olivares 1964, Álvarez <i>et al.</i> 2003) corresponden a <i>Lathrotriccus euleri</i> y <i>Cnemotriccus fuscatus duidae</i> (Stiles & Naranjo en imprenta). Se retira del listado. |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannus couchii</i> | Especimen digitalizado en el FMNH, pero ya no existe para su corroboración (Lobo & Henriques (2014). |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Tachycineta albilinea</i> | Turner & Rose (1989) y Restall <i>et al.</i> (2007) incluyen a <i>T. albilinea</i> para Colombia. Registros sin confirmar. |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Petrochelidon fulva</i> | Especímen dudoso (Lobo & Henriques (2014). |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus maculirostris</i> | Especímenes atribuídos a <i>T. maculirostris</i> (Donegan <i>et al.</i> 2009), corresponden a un taxón diferente (Avendaño <i>et al.</i> datos no publicados) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus debilis</i> | Separado de <i>T. ignobilis</i> (Cerdeira <i>et al.</i> 2016; Donegan <i>et al.</i> 2016). No implementado por el SACC. |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus arthuri</i> | Separado de <i>T. ignobilis</i> (Cerdeira <i>et al.</i> 2016; Donegan <i>et al.</i> 2016). No implementado por el SACC. |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara varia</i> | Registro de Puerto Inírida, sin evidencia o descripción del registro (Salaman <i>et al.</i> 2001). |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Atlapetes nigrifrons</i> | Separado de <i>A. latinuchus</i> (Donegan <i>et al.</i> 2014). No implementado por el SACC. |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Basileuterus tacarcunae</i> | Separado de <i>B. tristriatus</i> (Donegan 2014; Donegan <i>et al.</i> 2014). No implementado por el SACC. |

Anexo 4. Literatura sobre ampliaciones de distribución y especies adicionadas a la avifauna colombiana entre 1986 y agosto de 2017.

1. ACEVEDO-CHARRY, O. 2014. Aves de Quindicocha-Valle de Sibundoy, Putumayo-Colombia: Potencial área de conservación. *Universitas Scientiarum*, 19: 29-41.
2. ACEVEDO-CHARRY, O. A. & L. ECHEVERRI-MALLARINO. 2013. Notes of Records about Yellow-Green Vireo (*Vireo flavoviridis*: Vireonidae) at the Sabana de Bogotá, Cundinamarca (Colombia). *Acta Biológica Colombiana* 18: 517-522.
3. ACEVEDO-CHARRY, O. A., A. CÁRDENAS, B. CORAL-JARAMILLO, W. DAZA DÍAZ, J. JARAMILLO & J. F. FREILE. 2015. First record of Subtropical Pygmy Owl *Glaucidium parkeri* in the Colombian Andes. *Bulletin of the British Ornithologists Club* 135: 77-79.
4. ACEVEDO-CHARRY, O. A., E. MATIZ-GONZÁLEZ, K. E. PÉREZ-ALBARRACÍN, S. RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ & C. J. VALENCIA-VERA. 2015. El águila arpía (*Harpia harpyja*) y el águila iguanera (*Spizaetus tyrannus*) en el ecotono entre los Andes y los Llanos de la Orinoquia, Arauca, Colombia. *Spizaetus* 19: 2-11.
5. ALARCÓN-NIETO, G. & E. PALACIOS. 2005. Confirmación de una segunda población del Pavón Moquirrojo (*Crax globulosa*) para Colombia en el bajo río Caquetá. *Ornitología Colombiana* 3: 97-99.
6. ÁLVAREZ-LÓPEZ, H. & M. D. HEREDIA. 1996. Primer registro de la Reinita Gorginegra (*Dendroica virens*) en el occidente colombiano. *Boletín SAO* 7: 5-7.
7. ÁLVAREZ-R, M. 2000. Aves de la Isla Malpelo. *Biota Colombiana* 1: 203-207.
8. ÁLVAREZ-R, M., A. M. UMAÑA, G. D. MEJÍA, J. CAJAO, P. VON HILDEBRAND, & F. GAST. 2003. Aves del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, Amazonía-Provincia de la Guyana, Colombia. *Biota Colombiana* 4: 49-63.
9. ANDRADE, G. I. & I. E. LOZANO. 1997. Ocurrencia del Hormiguero de Corona Pizarra *Grallaricula nana* en la Reserva Biológica Carpanta, Macizo de Chingaza, Cordillera Oriental Colombiana. *Cotinga* 7: 37-38.
10. ARANGO, G. 1986. Distribución del género *Gallinago* Brisson 1760 (Aves: Scolopacidae) en los Andes Orientales de Colombia. *Caldasia* 15: 669-706.
11. ARBELÁEZ-CORTÉS, E. & O. BAENA-TOVAR. 2006. Primer registro del Azulejo de Wetmore (*Butthraupis wetmorei*: Thraupinae) para el Quindío, Andes centrales de Colombia. *Ornitología Colombiana* 4: 78-81.
12. ARBELÁEZ-CORTÉS, E., O. H. MARÍN-GÓMEZ, O. BAENA-TOVAR & J. C. OSPINA-GONZÁLEZ. 2011. Aves, Finca Estrella de Agua-Páramo de Frontino, municipality of Salento, Quindío, Colombia. *Check List* 7: 64-70.
13. ARBELÁEZ-CORTÉS, E., O. H. MARÍN-GÓMEZ, D. DUQUE-MONTOYA, P. CARDONA-CAMACHO, L. M. RENJIFO & H. F. GÓMEZ. 2011. Birds, Quindío Department, Central Andes of Colombia. *Check List* 7: 227-247.
14. ARBELÁEZ-CORTÉS, E., G. PATIÑO, J. GARZÓN, Y. BELTRÁN-ÁRCILA, D. DUQUE-MONTOYA, M. S. SIERRA, F. FORERO, L. URREA, P. CARDONA-CAMACHO, J. MORALES-SÁNCHEZ, A. BAYER & O. H. MARÍN-GÓMEZ. 2015. Fourteen new additions to the list of birds of Quindío department, Colombia. *Check List* 11: 1-9.
15. ARIAS-FIGUEROA, A. 1998. Caracterización de la avifauna en cinco localidades del proyecto vial carretera alterna Buga-Buenaventura Tramo: Madroñal-Córdoba-Valle del Cauca. *Cespedesia* 23:85-116.
16. ARZUZA, D. E., M. I. MORENO & P. SALAMAN. 2008. Conservación de las aves acuáticas en Colombia. *Conservación Colombiana* 6:1-72.
17. ASOCIACIÓN BOGOTANA DE ORNITOLOGÍA. 2000. Aves de la Sabana de Bogotá, guía de campo. ABO, CAR. Bogotá, Colombia.
18. AVENDAÑO, J. E. 2012. La avifauna de las tierras bajas del Catatumbo, Colombia: inventario preliminar y ampliaciones de rango. *Boletín SAO* 21: 1-14.
19. AVENDAÑO, J. E., J. O. CORTÉS-HERRERA, E. R. BRICEÑO-LARA & D. A. RINCÓN-GUARÍN. 2013. Crossing or bypassing the Andes: a commentary on recent range extensions of cis-Andean birds to the West of the Andes of Colombia. *Orinoquia* 17: 207-214.
20. AVENDAÑO, J. E., A. M. CUERVO, J. P. LÓPEZ-O, N. GUTIÉRREZ-PINTO, A. CORTÉS-DIAGO & C. D. CADENA. 2015. A new species of tapaculo (Rhinocryptidae: *Scytalopus*) from the Serranía de Perijá of Colombia and Venezuela. *Auk* 132: 450-466.
21. AVENDAÑO, J. E., F. G. STILES & C. D. CADENA. 2013. A new subspecies of Common Bush-Tanager (*Chlorospingus flavopectus*, Emberizidae) from the east slope of the Andes of Colombia. *Ornitología Colombiana* 13: 44-58.
22. ÁVILA-CAMPOS, J. E. 2016. Lista de aves de alta montaña de la serranía de Los Picachos, San Vicente del Caguán, Caquetá (Colombia). *Biota Colombiana* 17: 103-113.
23. ÁVILA-CAMPOS, J. E., A. M. ECHEVERRY-ARIAS & N. J. BONILLA-SÁNCHEZ. 2014. Nuevo registro de Halcón Pechirrojo (*Falco*

- deiroleucus) Para Bogotá, Colombia.* Spizaetus 17: 24-27.
24. AYERBE-GONZÁLEZ, S. & P. LEHMANN-ALBORNOZ. 2005. Redescubrimiento del Pato Pico de Oro de Nicéforo (*Anas georgica niceforoi*). Novedades Colombianas 8:45-52.
 25. AYERBE-QUIÑONES, F. & J. P. LÓPEZ-ORDÓÑEZ. 2011. Adiciones a la avifauna del valle alto del río Patía, un área interandina del suroccidente colombiano. Boletín SAO 20: 1-17.
 26. AYERBE-QUIÑONES, F. & H. RAMÍREZ-CHAVES. 2008. Primeros registros de *Ammodramus savannarum caucae* (Emberizidae) en el valle alto del Patía, suroccidente de Colombia. Ornitología Colombiana 6: 82-85.
 27. AYERBE-QUIÑONES, F., L. G. GÓMEZ, J. P. LÓPEZ, M. B. RAMÍREZ, J. V. SANDOVAL & M. F. GONZÁLEZ. 2009. Avifauna de Popayán y municipios aledaños. Novedades Colombianas 9: 1-27.
 28. AYERBE-QUIÑONES, F., L. G. GÓMEZ-BERNAL, & J. RAMÍREZ-MOSQUERA. 2009. Nuevos registros del Frutero Pigmeo (*Pipreola chlorolepidota*), primer ejemplar colectado en Colombia. Novedades Colombianas 9: 38-41.
 29. BALLANCE, L. T. 2007. Understanding seabirds at sea: why and how? Marine Ornithology 35:127-135.
 30. BALLANCE, L. T., R. L. PITMAN & P. C. FIEDLER. 2006. Oceanographic influences on seabirds and cetaceans of the eastern tropical Pacific: a review. Progress in Oceanography 69: 360-390.
 31. BARRETO, M. & M. E. BURBANO. 1996. *Mesembrinibis cayennensis* (Aves: Threskiornithidae) en Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia. Cespedesia 21:175-178.
 32. BAYLY, N. J. 2015. Primer registro de la Gaviota de Franklin (*Leucophaeus pipixcan*) en la Cordillera Oriental de Colombia. Boletín SAO 24: 13-14.
 33. BELTRÁN, W. & G. H. KATTAN. 2001. First record of the Slaty-backed Nightingale-Thrush in the Central Andes of Colombia, with notes on its ecology and geographical variation. Wilson Bulletin 113: 134-139.
 34. BENNETT-DEFLER, S. 1994. Las aves de la Estación Biológica Caparú: una lista preliminar de especies. Trianea 5: 379-400.
 35. BORJA, R., W. NÚÑEZ, D. RODRÍGUEZ & A. BOLÍVAR. 2011. Reporte del Torito *Molothrus armenti* en el departamento del Atlántico, Caribe colombiano. Boletín SAO 12:84-87.
 36. BOTERO, C. A. 2001. First specimen of the Ecuadorian Cacique from Colombia with notes on its nesting behavior. Wilson Bulletin 113: 327-328.
 37. BOTERO, J. E., G. M. LENTJO, A. M. LÓPEZ, O. CASTELLANOS, C. ARISTIZÁBAL, N. FRANCO & D. ARBELÁEZ. 2005. Adiciones a la lista de aves del municipio de Manizales. Boletín SAO 15: 69-88.
 38. BRAN-CASTRILLÓN, C., C. GAVIRIA-ZAPATA & J. L. PARRA. 2014. Avifauna de los hábitats de la desembocadura del Río Atrato (Turbo, Antioquia). Ornitología Colombiana 14: 94-111.
 39. BRINKHUIZEN, D. M. & T. SEIMOLA. 2014. First record of Pacific Parrotlet *Forpus coelestis* in Colombia. Conservación Colombiana 21: 30-32.
 40. BUELVAS-MEZA, C., J. E. MAYORGA, & R. STREWE. 2006. Primer registro del Ala de Cera (*Bombycilla cedrorum*) para el Caribe Colombiano. Boletín SAO 16: 71-75.
 41. CABOT, J., T. DE VRIES & F. G. STILES. 2006. Aberrant distributional records of Cordilleran Buzzard (Hawk) *Buteo poecilochrous* in Colombia reflect confusion with White-tailed Buzzard (Hawk) *B. albicaudatus*. Bulletin of the British Ornithologists' Club 126: 65-68.
 42. CADENA, C. D., M. ÁLVAREZ-R, J. L. PARRA, I. JIMÉNEZ, C. A. MEJÍA, M. SANTAMARÍA, A. M. FRANCO, C. A. BOTERO, G. D. MEJÍA, A. M. UMAÑA, A. CALIXTO, J. ALDANA & G. A. LONDOÑO. 2000. The birds of CIEM, Tinigua National Park, Colombia: an overview of 13 years of ornithological research. Cotinga 13: 46-54.
 43. CALDERÓN, D. & L. AGUDELO. 2014. Primer registro de *Bombycilla cedrorum* en los Andes de Colombia. Boletín SAO 23: 18-21.
 44. CALDERÓN-FRANCO, D., J. D. RAMÍREZ, & J. C. SAENZ. 2017. First record of the Ash-throated Crake, *Mustelirallus albicollis* Vieillot, 1819 (Aves, Rallidae) in the Cordillera Central of the Colombian Andes. Check List 13: 2089.
 45. CALDERÓN-FRANCO, D., J. A. ZULETA-MARÍN & F. AYERBE-QUIÑONES. 2012. *Atlapetes flaviceps* también se encuentra en la cordillera Occidental de los Andes en Colombia. Boletín SAO 21: 1-6.
 46. CALDERÓN-LEYTON, J. J., Y. ROSERO-MORA, Y. CASTILLO-RODRÍGUEZ & R.A. FERNÁNDEZ. 2015. Avifauna amenazada de la región Andino Amazónica de Nariño, Colombia. Revista de Ciencias 5: 1-16.
 47. CARANTÓN-AYALA, D., G. D. BERMEO & A. R. BURBANO. 2016. Primeros registros del carpintero cabecirrufo (*Celeus spectabilis*; Picidae) en Colombia. Acta Biológica Colombiana 21: 649-652.
 48. CARANTÓN-AYALA, D. & K. CERTUCHE-CUBILLOS. 2010. A new species of Antpitta (Grallariidae: *Grallaria*) from the northern sector of the western Andes of Colombia. Ornitología Colombiana 9: 56-70.

49. CARANTÓN-AYALA, D., K. CERTUCHE-CUBILLOS, C. DÍAZ-JARAMILLO, R. PARRA-HERNÁNDEZ, J. SANABRÍA-MEJÍA & M. MORENO-PALACIOS. 2008. Aspectos biológicos de una nueva población del Capuchino Cabeza Negra (*Lonchura malacca*, Estrildidae) en el alto valle del Magdalena, Tolima. Boletín SAO 18: 54-63.
50. CASAS-CRUZ, C. & F. AYERBE-QUINONES. 2006. Primer registro para el departamento del Cauca de *Leptotila conoveri* (Columbidae), una especie endémica y en peligro. Ornitología Colombiana 4: 73-75.
51. CASTAÑO-R, A. M. & G. J. COLORADO-Z. 2002. First records of Red-tailed Hawk *Buteo jamaicensis* in Colombia. Cotinga 18: 102.
52. CASTRO-VÁSQUEZ, L. 2016. Aproximación al estado actual del conocimiento de la avifauna del departamento del Atlántico, Colombia. Biota Colombiana 17: 90-117.
53. CASTRO-LIMA, F. & N. OCAMPO-PEÑUELA. 2011. Primer registro del Jilguero Cara Amarilla (Fringillidae: *Carduelis yarrellii*) en Colombia. Ornitología Colombiana 10: 69-71.
54. CAYCEDO-ROSALES, P., P. J. CARDONA, AND P. PULIDO-SANTACRUZ. 2004. El nido del Tapaculo Ocelado (*Acropternis orthonyx*). Ornitología Colombiana 2: 41-44.
55. CHAPARRO-HERRERA, S. & O. LAVERDE. 2014. Una nueva localidad para el Águila Solitaria (*Buteogallus solitarius*) en Colombia. Boletín SAO 23:15-17.
56. CHÁVES-PORTILLA, G., A. HERNÁNDEZ-JARAMILLO, O. CORTÉS-HERRERA, D. X. VILLAGRAN-CHAVARRO, J. DRIGELIO-GIL, S. M. ALARCÓN-BERNAL, N. RODRÍGUEZ & C. GAMBA-TRIMIÑO. 2007. Tercer registro del Vencejo Frente Blanca (*Cypseloides cherriei*, Apodidae) para Colombia. Boletín SAO 17: 47-49.
57. CHÁVES-PORTILLA, G. & O. CORTÉS-HERRERA. 2006. Nueva localidad para la Quincha de Soatá (*Amazilia castaneiventris*) en el municipio de San Gil, Santander, Colombia. Boletín SAO 16: 1-6.
58. CHIRIVÍ-GALLEGO, H. 1988. Fauna tetrápoda y algunos aspectos ecológicos de los cayos del archipiélago de San Andrés y Providencia, Colombia. Trianea 2: 227-237.
59. CIFUENTES-SARMIENTO, Y. 2010. Nuevas localidades para la Corocora (*Eudocimus ruber*) y el Correlimos Zancón (*Calidris himantopus*) en Colombia. Boletín SAO 20: 24-28.
60. CIFUENTES-SARMIENTO, Y. 2016. Registros importantes de anátidos en humedales artificiales del valle alto del Río Cauca, Colombia. Ornitología Colombiana 15: 3-11.
61. COLLAZOS-GONZÁLEZ, S. A. & O. CORTES-HERRERA. 2015. Listado de las aves de las reservas las Tángaras, Gorrión-Andivia y Lora Carirosada de los Andes Occidentales de Colombia. Conservación Colombiana 23: 58-81.
62. COLLINS, C.T. 2006. Further records of Elegant Terns *Sterna elegans* in Colombia and their geographic source. Ornitología Colombiana 4: 76-77.
63. COLORADO-Z, G. J. 2008. Rediscovery of the Recurve-billed Bushbird for the Cordillera Central of Colombia. Ornitología Neotropical 19: 467-471.
64. COLORADO-Z, G. J. & J. D. RAMÍREZ. 2005. Registro del Pelícano Pardo (*Pelecanus occidentalis*) en el área de la central hidroeléctrica Porce II, Nordeste de Antioquia, Colombia. Boletín SAO 15: 39-42.
65. COLORADO-Z, G. J. & P. C. PULGARÍN. 2003. Snowy-bellied Hummingbird *Saucerottia edward*, new to Colombia and South America. Cotinga 20: 99-101.
66. COLORADO-Z, G. J., J. L. TORO-MURILLO & C. M. MAZO. 2006. Redescubrimiento del Loro Orejiamarillo (*Ognorhynchus icterotis*) en el norte de Antioquia. Boletín SAO 16: 9-19.
67. CÓRDOBA-CÓRDOBA, S. 2016. Aves en páramos de Colombia: características ecológicas de acuerdo a grupos de dieta y peso corporal. Biota Colombiana 17: 77-102.
68. CÓRDOBA-CÓRDOBA, S. & J. A. AHUMADA. 2005. Confirmation of Buff-fronted Owl *Aegolius harrisii* for the Cordillera Oriental of Colombia. Bulletin of the British Ornithologists' Club 125: 56-58.
69. CÓRDOBA-CÓRDOBA, S. & M. Á. ECHEVERRY-GALVIS. 2006. Two new hummingbirds for Colombia, Many-spotted Hummingbird *Taphrospilus hypostictus* and Violet-chested Hummingbird *Sternoclyta cyanopectus*. Bulletin of the British Ornithologists' Club 126: 194-195.
70. CÓRDOBA-CÓRDOBA, S., M. Á. ECHEVERRY-GALVIS, & F. A. ESTELA. 2008. Nuevos registros de distribución para el Águila Crestada (*Spizaetus isidori*) y el Águila Iguanera (*S. tyrannus*) para Colombia, con anotaciones para su identificación. Ornitología Colombiana 7: 66-74.
71. CORTÉS-DIAGO, A., L. A. ORTEGA, L. MAZARIEGOS-HURTADO, & A. A. WELLER. 2007. A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from Southwest Colombia. Ornitología Neotropical 18: 161-170.
72. CORTÉS-HERRERA, J. O., G. A. CHAVES-PORTILLA, A. HERNÁNDEZ-JARAMILLO, C. GAMBA-TRIMIÑO, S. M. ALARCÓN-BERNAL & D. X. VILLAGRAN-CHAVARRO. 2006. Redescubrimiento de *Macroagelaius subalaris* en el municipio de Soatá, Boyacá,

- Colombia. Boletín SAO 16: 85-92.
73. CORTÉS-HERRERA, O., A. HERNÁNDEZ-JARAMILLO, & E. BRICEÑO-BUITRAGO. 2004. Redescubrimiento del colibrí *Amazilia castaneiventris*, una especie endémica y amenazada de Colombia. Ornitología Colombiana 2:47-49.
74. CORTÉS-HERRERA, O., A. HERNÁNDEZ-JARAMILLO, G. CHÁVES-PORTILLA, O. LAVERDE-R, C. GAMBA-TRIMIÑO, D. X. VILLAGRAN-CHAVARRO & S. M. ALARCÓN-BERNAL. 2007. Nuevos registros de poblaciones de aves amenazadas en Soatá (Boyacá), Colombia. Cotinga 27: 74-77.
75. CORTÉS-HERRERA, O., H. D. BENÍTEZ-CASTAÑEDA, F. BECERRA-GALINDO & S. VILLAMARÍN. 2006. Un nuevo registro del Loro Orejiamarillo (*Ognorhynchus icterotis*) para el departamento del Tolima. Boletín SAO 16: 4-8.
76. COSTA T.V.V., K.V.C. BARBOSA & L.F. SILVEIRA. 2016. Range extension for Swallow-tailed Nightjar *Uropsalis segmentata* in northern Colombia. Cotinga 38: 35.
77. CUADROS, T. 1991. Registro visual del Cuco Terrestre Piquirojo (*Neomorphus pucheranii*) en Colombia. Boletín SAO 4: 26-27.
78. CUADROS, T. 1993. Distribución ecológica de la avifauna de Araracuara (Amazonas). Revista ICNE 4: 15-30.
79. CUAO-CARRANZA, E. A. 2007. El primer registro para Colombia de la Oropéndola de Casco, *Clypicterus oseryi* (Icteridae). Ornitología Colombiana 5: 78-80.
80. CUERVO, A. M., C. D. CADENA, N. KRABBE, & L. M. RENJIFO. 2005. *Scytalopus stilesi*, a new species of tapaculo (Rhinocryptidae) from the Cordillera Central of Colombia. Auk 122: 445-463.
81. CUERVO, A. M. & C. A. DELGADO. 2001. Adiciones a la avifauna del Valle de Aburrá y comentarios sobre la investigación ornitológica local. Boletín SAO 12: 52-65.
82. CUERVO, A. M., A. HERNÁNDEZ-JARAMILLO, O. CORTÉS-HERRERA, & O. LAVERDE-R. 2007. Nuevos registros en la parte alta de la Serranía de las Quinchas, Magdalena medio, Colombia. Ornitología Colombiana 5: 94-98.
83. CUERVO, A. M., P. C. PULGARÍN, & D. CALDERÓN. 2008. New distributional bird data from the Cordillera central of the Colombian Andes, with implications for the biogeography of northwestern South America. Condor 110: 526-537.
84. CUERVO, A. M., P. SALAMAN, T. M. DONEGAN, & J. M. OCHOA. 2001. A new species of Piha (Cotingida: *Lipaugus*) from the Cordillera Central of Colombia. Ibis 143: 353-368.
85. CUERVO, A. M., F. G. STILES, C. D. CADENA, J. L. TORO-MURILLO, & G. A. LONDOÑO. 2003. New and noteworthy bird records from the northern sector of the Western Andes of Colombia. Bulletin of the British Ornithologists' Club 123: 7-2
86. CUERVO, A. M., F. G. STILES, M. LENTINO, R. T. BRUMFIELD & E. P. DERRYBERRY. 2013. Geographic variation and phylogenetic relationships of *Myiopagis olallai* (Aves: Passeriformes; Tyrannidae), with the description of two new taxa from the Northern Andes. Zootaxa 3873: 1-24.
87. DARWIN DATABASE. 2014. Database: BioMap. Available: <<http://biomap.net/>>
88. DE BRUIN, A. 2006. Long-billed Curlew at Riohacha, Colombia in March 2006. Dutch Birding 28: 301-302.
89. DE LAS CASAS, J. C., F. G. STILES, I. A. BOLÍVAR, & J. I. MURILLO. 2004. Range extensions of two species of "Red-breasted" Meadowlarks (Icteridae: *Sturnella*) in Colombia. Ornitología Colombiana 2:37-40.
90. DE SOYE, Y., K.L. SCHUCHMANN & J.C. MATHEUS. 1997. Field notes on Giant Antpitta *Grallaria gigantea*. Cotinga 7: 35-36
91. DELGADO, C. A. 2000. Ampliación distribucional del Saltarín Mayor (*Schiffornis major*) en Colombia. Boletín SAO 11: 38-4
92. DELGADO-CH., A. C., J. J. CALDERÓN, Y. ROSERO-M, R. FERNÁNDEZ-G & C. FLÓREZ-P. 2014. Ampliaciones de distribución de aves en el suroccidente colombiano. Ornitología Colombiana 14: 112-124.
93. DIGBY, A., P. LÓPEZ, I. RIBEIRO, J. ALARCÓN & A. GARTNER. 2015. Caribbean Colombia: Pelagic Bird observations in 2014 and 2015. Conservación Colombiana 23: 50-57.
94. DONEGAN, T. M. 2007. A new species of brush finch (Emberizidae: *Atlapetes*) from the northern Central Andes of Colombia. Bulletin of the British Ornithologists' Club 127: 225-268.
95. DONEGAN, T. M. 2012. Range extensions and other notes on the birds and conservation of the Serranía de San Lucas, an isolated mountain range in northern Colombia. Bulletin of the British Ornithologists' Club 132: 140-161.
96. DONEGAN, T. M. & J. E. AVENDAÑO. 2008. Notes on tapaculos (Passeriformes: Rhinocryptidae) of the Eastern Andes of Colombia and the Venezuelan Andes, with a new subspecies of *Scytalopus griseicollis* from Colombia. Ornitología Colombiana 6: 24-65.
97. DONEGAN, T. M., J. E. AVENDAÑO, E. R. BRICEÑO-L, & B. HUERTAS. 2007. Range extensions, taxonomic and ecological notes from Serranía de los Yarigués, Colombia's new national park. Bulletin of the British Ornithologists' Club 127: 172-213.

98. DONEGAN, T. M., J. E. AVENDAÑO, E. R. BRICEÑO-L, J. C. LUNA, C. ROA, R. PARRA, C. TURNER, M. SHARP, & B. HUERTAS. 2010. Aves de la Serranía de los Yariguíes y tierras bajas circundantes, Santander, Colombia. *Cotinga* 32: 72-89.
99. DONEGAN, T., J. E. AVENDAÑO, B. HUERTAS & P. FLÓREZ. 2009. Avifauna de San Pedro de los Milagros, Antioquia: una comparación entre colecciones antiguas y evaluaciones rápidas. *Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural* 13: 63-72.
100. DONEGAN, T. M., J. E. AVENDAÑO & F. LAMBERT. 2013. A new tapaculo related to *Scytalopus rodiguezi* from Serranía de los Yariguíes, Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 133: 4-19.
101. DONEGAN, T. M., N. J. COLLAR, T. ELLERY, O. A. R. GILES, B. HUERTAS, C. OLACIREGUI, P. SALAMAN, B. SWIFT & J. L. TORO-M. 2010. Photographic record of Cedar Waxwing *Bombycilla cedrorum* from the Santa Marta Mountains, Colombia. *Cotinga* 32: 105-106.
102. DONEGAN, T. M. & L. M. DÁVALOS. 1999. Ornithological observations from Reserva Natural Tambito, Cauca, south-west Colombia. *Cotinga* 12: 48-55.
103. DONEGAN, T. M. & B. HUERTAS. 2011. The subspecies of Brown-throated Parakeet *Aratinga pertinax* on San Andres island. *Conservación Colombiana* 15: 35-37.
104. DONEGAN, T. M. & B. HUERTAS. 2002. First mainland record of Worm-eating Warbler *Helmitheros vermivorus* for Colombia. *Cotinga* 17: 77-78.
105. DONEGAN, T. & B. HUERTAS. 2015. Noteworthy bird records on San Andrés island, Colombia. *Conservación Colombiana* 22: 8-12.
106. DONEGAN, T. M., B. HUERTAS & E. R. BRICEÑO. 2005. Discovery of a population stronghold of Gorgeted Wood-Quail *Odontophorus strophium*, a critically endangered Colombian endemic, with notes on ecology and vocalisations. *Cotinga* 23: 74-77.
107. DONEGAN, T. M., M. McMULLAN, A. QUEVEDO & P. SALAMAN. 2013. Revision of the status of bird species occurring or reported in Colombia 2013. *Conservación Colombiana* 19: 3-10.
108. DONEGAN, T. M., A. QUEVEDO, M. McMULLAN & P. SALAMAN. 2011. Revision of the status of bird species occurring or reported in Colombia 2011. *Conservación Colombiana* 15: 4-21.
109. DONEGAN, T. M., A. QUEVEDO, M. McMULLAN & P. SALAMAN. 2014. Revision of the status of bird species occurring or reported in Colombia 2014. *Conservación Colombiana* 21: 3-11.
110. DONEGAN, T. M. & P. SALAMAN. 2011. Vocal differentiation and conservation of Indigo-crowned Quail-Dove *Geotrygon purpurata*. *Conservación Colombiana* 17: 15-19.
111. DONEGAN, T. M., P. SALAMAN & D. CARO. 2009. Revision of the status of various bird species occurring or reported in Colombia. *Conservación Colombiana* 8: 80-86.
112. DONEGAN, T. M., P. SALAMAN, D. CARO & M. McMULLAN. 2010. Revision of the status of bird species occurring in Colombia 2010. *Conservación Colombiana* 13: 25-54.
113. DONEGAN, T. M., P. SALAMAN, A. M. CUERVO, J. C. LUNA, & A. CORTÉS. 2002. Recent records from Tambito Nature Reserve and Munchique National Park, south-west Colombia. *Cotinga* 17: 77.
114. DONEGAN, T. M., P. SALAMAN, & J. DEAN. 2009. Overlooked first record of Leach's Petrel *Oceanodroma leucorhoa* for Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 129: 198-201.
115. DOWNING, C. 2005. New distributional information for some Colombian birds, with a new species for South America. *Cotinga* 24:13-15.
116. DOWNING, C. & J. HICKMAN. 2002. The first White-chested Swift *Cypseloides lemosi* in Amazonian Colombia. *Cotinga* 18:102-103.
117. DURÁN, S. M., G. LENTJO, A. M. LÓPEZ & J. E. BOTERO. 2009. Nuevos registros de la distribución y uso de hábitat del Tororoi Dorsiescamado (*Grallaria guatimalensis*) en Colombia. *Ornitología Neotropical* 20: 285-290.
118. ECHEVERRY-GALVIS, M. Á. & MORALES-ROZO, A. 2007. Lista anotada de algunas especies de la vereda "Cerca de Piedra", Chía, Colombia. *Boletín SAO* 17: 87-93.
119. ECHEVERRY-GALVIS, M. Á. & S. CÓRDOBA-CÓRDOBA. 2007. New distributional and other bird records from Tatamá massif, West Andes, Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 127: 213-224.
120. ELLERY, T. 2013. First mainland record of Caribbean Coot *Fulica caribaea* for Colombia. *Conservación Colombiana* 19: 42-43.
121. ELLERY, T., D. HAHN, G. FOULKS, C. OLACIREGUI & T. M. DONEGAN. 2009. First confirmed locality of Yellow-throated Warbler *Dendroica dominica* for Colombia. *Conservación Colombiana* 8: 82-83.
122. ESPINOSA-BLANCO, A. S., J. R. SALAMANCA, & P. RODRÍGUEZ-A. 2009. Una nueva localidad para el Cucarachero de

- Pantano (*Cistothorus apolinari*: Troglodytidae) en Sogamoso, Boyacá. *Ornitología Colombiana* 8: 78-82.
123. ESTELA, F. A. 2002. Observaciones de dos especies de aves migratorias poco frecuentes en Colombia. *Boletín SAO* 13: 35-37.
124. ESTELA, F. A. 2004. Observaciones del Págalo del Polo sur (*Catharacta maccomicki*) en el Caribe colombiano. *Ornitología Colombiana* 2: 50-52.
125. ESTELA, F. A. 2006. Aves de Isla Fuerte y Tortugilla, dos islas de la plataforma continental del Caribe colombiano. *Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras* 35: 267-272.
126. ESTELA, F. A. & C. GARCÍA. 2010. Primer registro del Petrel de Westland (*Procellaria westlandica*) en aguas del Pacífico colombiano. *Boletín SAO* 20: 50-54.
127. ESTELA, F. A. & M. LÓPEZ-VICTORIA. 2005. Aves de la parte baja del río Sinú, Caribe colombiano. *Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras* 34: 7-42.
128. ESTELA, F. A., C. GARCÍA, R. JOHNSTON-GONZÁLES, G. SOLER & S. BESSUDO. 2007. Confirmation of Parkinson's Petrel *Procellaria parkinsoni* in the Colombian Pacific. *Cotinga* 28: 60-61.
129. ESTELA, F. A., E. R. BRICEÑO-L, J. H. RESTREPO & D. RODRÍGUEZ. 2000. Ampliación del rango altitudinal de la Tángara (*Nemosia pileata*). *Boletín SAO* 11: 85-88.
130. ESTELA, F. A., F. AYERBE-QUIÑONES & I. ANGARITA. 2009. Nuevos registros del Águila Rabiblanca (*Parabuteo unicinctus*) en el suroccidente de Colombia. *Novedades Colombianas* 9: 42-47.
131. ESTELA, F. A., J. D. SILVA & L. F. CASTILLO. 2005. El Pelícano Blanco Americano (*Pelecanus erythrorhynchus*) en Colombia, con comentarios sobre los efectos de los huracanes en el Caribe. *Caldasia* 27: 271-275.
132. ESTELA, F. A., J. G. JARAMILLO & A. MEJÍA-TOBÓN. 2005. Ampliación de distribución de la Tortolita Escamada (*Columbina squammata*) en el Caribe colombiano. *Boletín SAO* 15: 105-111.
133. ESTELA, F. A., L. G. NARANJO & R. FRANKE-ANTE. 2004. Registros de Págalo (Aves: Stercoriidae) en las costas de Colombia. *Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras* 33: 245-250.
134. ESTELA, F. A., M. LÓPEZ-VICTORIA, L. F. CASTILLO & L. G. NARANJO. 2010. Estado del conocimiento sobre aves marinas en Colombia, después de 110 años de investigación. *Boletín SAO* 20: 2-21.
135. FAGAN, J. & M. McMULLAN. 2013. First confirmed records of Kelp Gull *Larus dominicanus* and Dunlin *Calidris alpina* for Colombia. *Conservación Colombiana* 19: 39-41.
136. FIERRO-CALDERÓN, K. & C. MONTEALEGRE. 2010. Nuevo registro del Buhito Nubícola (*Glaucidium nubicola*) en la Cordillera Occidental de Colombia. *Boletín SAO* 20: 29-33.
137. FITZPATRICK, J. W. & J. P. O'NEILL. 1986. *Otus petersoni*, a new Screech-Owl from the Eastern Andes, with systematic notes on *O. columbianus* and *O. ingens*. *Wilson Bulletin* 98: 1-14.
138. FJELDSA, J. & N. KRABBE. 1990. Birds of the High Andes. Zoological Museum, Univ. of Copenhagen and Apollo Books, Svendborg, Denmark.
139. FLÓREZ, P. & G. M. KIRWAN. 2017. Yellow-crowned Elaenia *Myiopagis flavivertex*, new to Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, 137: 150-151.
140. FRANKE-ANTE, R. & L. G. NARANJO. 1994. Primer registro del Pinguino de Magallanes en costas colombianas. *Trianea* 5: 401-406.
141. FREEMAN, B. G. & C. JULIO. 2010. The nest and egg of Cinnamon Schreech Owl *Megascops petersoni* in Central Colombia. *Cotinga* 32:107.
142. FREEMAN, B. G., S. L. HILTY, D. CALDERÓN-F, T. ELLERY & L. E. URUEÑA. 2012. New and noteworthy bird records from central and northern Colombia. *Cotinga* 34: 5-16.
143. GALLO-CAJAO, E. 2002. Sobre las especies del género *Monasa* (Bucconidae) en el departamento del Guainía, oriente colombiano. *Boletín SAO* 13: 38-40.
144. GALLO-CAJAO, E. & C. J. IDROBO-MEDINA. 2005. Observación reciente del Quetzal de Cresta (*Pharomachrus antisianus* [D'orbigny, 1837]), en un bosque aledaño a Popayán, Cordillera Central de Colombia. *Novedades Colombianas* 8: 53-56.
145. GARCÉS-RESTREPO, M. F., X. MORENO-GUTIÉRREZ & N. F. OSPINA-REINA. 2014. Un nuevo registro del Colimbo Selvático (*Helioornis fulica*) en el Valle del Río Cauca. *Boletín SAO* 23: 11-14.
146. GARCÉS-RESTREPO, M. F., C. A. SAAVEDRA-RODRÍGUEZ, G. CÁRDENAS-CARMONA, V. VIDAL-ASTUDILLO, F. AYERBE-QUIÑONES, L. F. ORTEGA, J. E. LÓPEZ-SOLARTE, R. JOHNSTON-GONZÁLEZ & C. A. RÍOS-FRANCO. 2012. Expansión de la distribución y datos ecológicos del Carpintero Habado (*Melanerpes rubricapillus*) en el valle del río Cauca, Colombia. *Ornitología Colombiana* 12: 54-60.

147. GARCÍA, J. M. & E. BOTERO-DELGADILLO. 2013. Nuevos registros de distribución del Cabezón Cinéreo (*Pachyramphus rufus*) en Colombia. *Ornitología Colombiana* 13: 69-73.
148. GARIZÁBAL, J. A., C. A. DELGADO, A. ARIAS-ALZATE, S. BOTERO-CAÑOLA, J. D. SÁNCHEZ-LONDOÑO, L. M. TABÁREZ, P. X. LIZARAZO-M. & J. L. PARRA. 2014. Nuevos registros de la Paloma-perdiz Lineada (*Geotrygon linearis*) en el Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia. *Boletín SAO* 23: 1-5.
149. GÓMEZ-BERNAL, L.G., F. AYERBE-QUIÑONES & P. J. NEGRET. 2016. Nuevos registros de aves en el piedemonte amazónico colombiano. *Cotinga* 38: 23-32.
150. GONZÁLEZ-PRIETO, A. M., N. ESPEJO, J. SANABRIA-MEJÍA, C. GONZÁLEZ-PRIETO, D. CORMIER & K. HOBSON. 2014. First record of Tolima Dove *Leptotila conoveri* in the Colombian East Andes. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 134: 307 -310.
151. GRAVES, G. R. 1988. *Phylloscartes lanyoni*, a new species of Bristle-Tyrant (Tyrannidae) from the lower Cauca valley of Colombia. *Wilson Bulletin* 100: 529-534.
152. GRAVES, G. R. 1989. A new allopatric taxon in the *Hapalopsittaca amazonina* (Psittacidae) superspecies from Colombia. *Wilson Bulletin* 101: 369-376.
153. GRAVES, G. R. 1993. Relic of a lost World: A new species of Sunagel (Trochilidae: *Heliangelus*) from "Bogotá". *Auk* 110: 1-8.
154. GRAVES, G. R. 1997. Colorimetric and morphometric gradients in Colombian populations of Dusky Antbirds (*Cercomacra tyrannina*), with a description of a new species, *Cercomacra parkeri*. *Ornithological Monographs* 48: 21 -35.
155. HERRERA-ORDÓÑEZ, R. & D.A. GUARÍN-RINCÓN. 2014. Nuevo registro del Hormiguero Pico de Hacha *Clytoctantes alixii* para el departamento de Santander, Colombia. *Cotinga* 36: 54-55.
156. HILTY, S. L. & D. ASCANIO. 2009. A new species of Spinetail (Furnariidae: *Synallaxis*) from the río Orinoco of Venezuela. *Auk* 126: 485-492.
157. HILTY, S. L. & W. L. BROWN. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 996 pp.
158. HILTY, S. L. & W. L. BROWN. 2001. Guía de las aves de Colombia. Princeton University Press, American Bird Conservancy-ABC, Universidad del Valle, Sociedad Antioqueña de Ornitología-SAO, Cali. 1030 pp.
159. HOELL, P. 2012. Curious Migration of Shining Sunbeam (*Aglaeactis cupripennis*) In Colombia's Western Cordillera. *Boletín SAO* 21: 61-62.
160. HUERTAS, B., A. MOORWOOD, F. FORERO, R. KIRBY, A. RODRÍGUEZ & T. DOYER. 2015. Cada punto cuenta. Nuevos registros encontrados durante una evaluación rápida de diversidad en uno de los tepuyes del Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, durante la filmación del documental de National Geographic 'Wild Colombia' y de la película 'Colombia Magia Salvaje'. *Conservación Colombiana* 23: 82-90.
161. ISLER, M. L., J. ALVAREZ-ALONSO, P. R. ISLER, T. VALQUI, A. BEGAZO, & B. M. WHITNEY. 2002. Rediscovery of a cryptic species and description of a new subspecies in the *Myrmeciza hemimelaena* complex (Thamnophilidae) of the Neotropics. *Auk* 119: 362-378.
162. ISLER, M. L. & P. R. ISLER. 1999. The tanagers: natural history, distribution, and identification. Smithsonian Institution Press., Washington, D.C.
163. JANNI, O., L. DE TEMMERMAN & S. COOLEMAN. 2013. Range extension for Rio Negro Gnatcatcher *Polioptila (guianensis) facilis* in Colombia. *Cotinga* 35: 108-109.
164. JARAMILLO, A. 1999. Registro de la Reinita de Pensilvania (*Dendroica pensylvanica*) en Antioquia. *Boletín SAO* 10: 81-82.
165. JARAMILLO, J. G. 2001. Observaciones del Azulillo Norteño (*Passerina cyanea*) en Tolú. *Boletín SAO* 12: 82-83.
166. JOHNSTON-GONZÁLES, R., D. ARBELÁEZ-ALVARADO & I. ANGARITA. 2005. Primeros registros de reproducción del Gavotín Blanco (*Gelochelidon nilotica*) en Colombia. *Ornitología Colombiana* 3: 84-87.
167. JOHNSTON-GONZÁLES, R., C. J. RUIZ-GUERRA, C. E. HERNÁNDEZ, L. F. CASTILLO & Y. CIFUENTES-SARMIENTO. 2006. *Sturnella bellicosa* sigue aumentando su distribución en Colombia. *Ornitología Colombiana* 4: 64-65.
168. JOHNSTON-GONZÁLES, R., C. A. SAAVEDRA-RODRÍGUEZ & C. VALDERRAMA-ARDILA. 2008. Presencia de Guardacaminos Rabimanchado (*Caprimulgus maculicaudus*) en el valle del río Cauca, Colombia. *Ornitología Colombiana* 6: 74-77.
169. KESLEY, M. 1999. Tercer registro del ave playera (*Aphriza virgata*) en Colombia. *Boletín SAO* 10: 53-54.
170. KIRWAN, G. M., D. BRINKHUIZEN, D. CALDERÓN-F. B. DAVIS & J. MINNS. 2015. Neotropical Notebook. *Neotropical Birding* 16: 43-62.

171. KIRKCONNELL, A. & O. H. GARRIDO. 1991. The Thick-billed Vireo, *Vireo crassirostris* (Aves: Vireonidae), a new addition to the Cuban avifauna. *Ornitología Neotropical* 2: 99-100.
172. KRABBE, N. K. 2008. Vocal evidence for restitution of species rank to a Santa Marta endemic: *Automolus rufipectus* Bangs (Furnariidae), with comments on its generic affinities. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 128: 219-227.
173. KRABBE, N. 2009. A significant northward range extension of Munchique Wood-Wren (*Henicorhina negreti*) in the Western Andes of Colombia. *Ornitología Colombiana* 8: 76-77.
174. KRABBE, N. & C. D. CADENA. 2010. A taxonomic revision of the Paramo Tapaculo *Scytalopus canus* Chapman (Aves: Rhinocryptidae), with description of a new subspecies from Ecuador and Peru. *Zootaxa*, 2354: 56-66.
175. KRABBE, N. K., P. FLÓREZ, G. SUÁREZ, J. CASTAÑO, J. D. ARANGO & A. DUQUE. 2006. The birds of páramo de Frontino, western Andes. *Ornitología Colombiana* 4: 39-50.
176. KRABBE, N. K., P. FLÓREZ, G. SUÁREZ, J. CASTAÑO, J. D. ARANGO, P. C. PULGARÍN, W. A. MÚNERA, F. G. STILES & P. SALAMAN. 2005. Rediscovery of the Dusky Starfrontlet *Coeligena orina*, with a description of the adult plumages and a reassessment of its taxonomic status. *Ornitología Colombiana* 3: 28-35.
177. KRABBE, N., P. SALAMAN, A. CORTÉS, A. QUEVEDO, L. A. ORTEGA & C. D. CADENA. 2005. A new species of *Scytalopus* tapaculo from the upper Magdalena Valley, Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 125: 93-108.
178. KRABBE, N. & T. S. SCHULENBERG. 1997. Species limits and natural history of *Scytalopus* tapaculos (Rhinocryptidae), with descriptions of the Ecuadorian taxa, including three new species. Pp. 47-88 en *Studies in Neotropical Ornithology Honoring Ted Parker* (J. V. Remsen, Ed.). *Ornithological Monographs*, no. 48.
179. LARA, C. E., A. M. CUERVO, S. V. VALDERRAMA, D. CALDERÓN-F. & C. D. CADENA. 2012. A new species of wren (Troglodytidae: *Thryophilus*) from the dry Cauca River canyon, northwestern Colombia. *The Auk* 129: 537-550.
180. LARA-VÁSQUEZ, C. E., A. M. CASTAÑO-RIVAS & R. JONKER. 2007. Notas acerca de las guacamayas (Psittacidae: *Ara*) introducidas en el municipio de Medellín, Colombia. *Boletín SAO* 17: 104-110.
181. LAVERDE-R, O. & F. G. STILES. 2007. Apuntes sobre el Hormiguero Pico de Hacha (Thamnophilidae: *Clytoctantes alixii*) y su relación con un bambú en un bosque secundario de Colombia. *Ornitología Colombiana* 5: 83-90.
182. LAVERDE-R, O., F. G. STILES & C. MÚNERA-R. 2005. Nuevos registros e inventario de la avifauna de la Serranía de las Quinchas, un área importante para la conservación de las aves (AICA) en Colombia. *Caldasia* 27: 247-265.
183. LEAL, C. A., H. S. MENESES, O. GEREDA, A. M. CUERVO & E. BONACCORSO. 2011. Ampliación de la distribución conocida y descripción del plumaje juvenil del Azulejo de Wetmore (*Butthraupis wetmorei*, Thraupidae). *Ornitología Colombiana* 11: 91-97.
184. LEÓN-LLERAS, J. S. & D. R. RODRÍGUEZ-VILLAMIL. 2015. Registros del Ibis pico de hoz, *Plegadis falcinellus* (Linnaeus 1776) (Pelecaniformes: Threskiornithidae) en Colombia. *Biota Colombiana* 16: 158-161.
185. LOBO-Y-HENRIQUES, J. C., Y., J. BATES & D. WILLARD. 2012. First Record for the Black-and-white Tanager *Conothraupis speculigera* in Colombia. *Conservación Colombiana* 17: 45-51.
186. LONDOÑO, G. V. A. 2005. A description of the nest and eggs of the Pale-eyed Thrush (*Platycichla leucops*), with notes on incubation behavior. *The Wilson Bulletin* 117: 394-399.
187. LÓPEZ-LANÚS, B., O. LAVERDE, R. OMENA & L. G. OLARTE. 1999. New Records of Pale-Footed Swallow *Notiochelidon flavipes* in the Cordillera Central, Colombia. *Cotinga* 12: 72.
188. LÓPEZ-LANÚS, B., K. S. BERG, R. STREWE & P. SALAMAN. 1999. The ecology and vocalisations of Banded Ground-cuckoo *Neomorphus radiolosus*. *Cotinga* 11:42-45.
189. LÓPEZ-LANÚS, B., O. LAVERDE-R, R. OMENA & L. G. OLARTE. 2009. Lack of evidence for the presence of macaws of the *Anodorhynchus* genus in the Colombian-Brazilian river basin of the Vaupés. *Hornero* 24: 37-41.
190. LÓPEZ-O, J. P., J. E. AVENDAÑO, N. GUTIÉRREZ-PINTO & A. M. CUERVO. 2014. The birds of Serranía de Perijá: The northernmost avifauna of the Andes. *Ornitología Colombiana* 14: 62-93.
191. LÓPEZ-O. J. P., J. O. CORTÉS-HERRERA, C. A. PAEZ-ORTÍZ & M. F. GONZÁLEZ-ROJAS. 2013. Nuevos registros y comentarios sobre la distribución de algunas especies de aves en los Andes Occidentales de Colombia. *Ornitología Colombiana* 13:21-36.
192. LÓPEZ-O, J. P., C. A. PÁEZ, V. SANDOVAL & P. SALAMAN. 2008. Una segunda localidad para *Eriocnemis mirabilis* en la Cordillera Occidental de Colombia. *Cotinga* 29: 77-79.
193. LÓPEZ-VICTORIA, M. & F. A. ESTELA. 2006. Additions to the breeding seabirds of Malpelo Island, Colombia. *Marine Ornithology* 34: 83-84.
194. LOSADA-PRADO, S., A. M. GONZÁLEZ-PRIETO, A. M. CARVAJAL-LOZANO & Y. G. MOLINA-MARTÍNEZ. 2005. Especies endémicas y amenazadas registradas en la cuenca del río Coello (Tolima) durante estudios rápidos en 2003.

- Ornitología Colombiana 3: 76-80.
195. LOSADA-PRADO, S., R. PARRA-HERNÁNDEZ & A. M. CARVAJAL-LOZANO. 2004. Nuevos registros del Turpial amarillo (*Icterus nigrogularis*) en la parte alta del valle del Magdalena. Boletín SAO 14: 33-35.
196. LOSADA, S. & Y. MOLINA. 2012. Avifauna del Bosque Seco Tropical en el departamento del Tolima (Colombia): análisis de la comunidad. Caldasia 33: 271-294.
197. LUNA, J. C. 2011. Primeros registros de la Viudita Enmascarada *Fluvicola nengeta* en Colombia. Conservación Colombiana, 15: 38-39.
198. LUNA, J. C. & E. A. CUAO-CARRANZA. 2011. First records of White-bellied Parrot *Pionites leucogaster* for Colombia. Conservación Colombiana 15: 34.
199. LUNA, J. C., T. ELLERY, K. KNUDSEN & M. McMULLAN. 2011. First confirmed records of Yellow-bellied Sapsucker *Sphyrapicus varius* for Colombia and South America. Conservación Colombiana 15: 29-30.
200. LUNA, J. C. & A. QUEVEDO. 2012. Primera fotografía en su hábitat y nuevo avistamiento del Cucarachero de Santa Marta *Troglodytes monticola*, especie en peligro crítico. Conservación Colombiana 17: 31-32.
201. MACANA, D. C. & J. E. ZULUAGA-BONILLA. 2006. Presencia de la Alondra cachudita, *Eremophila alpestris peregrina* en cultivos de cebolla en el lago de Tota, Boyacá, Colombia. Boletín SAO 16: 26-30.
202. MANGEL, J. C., J. ADAMS, J. ALFARO-SHIGUETO, P. HODUM, K. D. HYRENBACH, V. COLODRO & J. H. NORRIS. 2013. Conservation implications of Pink-footed Shearwater (*Puffinus creatopus*) movements and fishery interactions assessed using multiple methods. Fifth Meeting of the Seabird Bycatch Working Group. La Rochelle, France. SBWG5 Doc 06 Agenda Item 18, 19.
203. MARÍN, M. 1997. Species limits and distribution of some New World Spine-tailed Swifts (*Chaetura spp.*). Ornithological Monographs 78: 431-443.
204. MARÍN, M. 2000. Species limits, distribution, and biogeography of some New World Gray-rumped Spine-tailed Swifts (*Chaetura*, Apodidae). Ornitología Neotropical 11: 93-107.
205. MARÍN, M. & F. G. STILES. 1993. Notes on the biology of the Spot-fronted Swift. Condor 95: 479-483.
206. MARÍN-GÓMEZ, O. H. 2005. Avifauna del campus de la Universidad del Quindío. Boletín SAO 15: 42-60.
207. MARÍN-GÓMEZ, O. H., J. M. POLANCO, D. ARANGO GIRALDO & A. OSPINA DUQUE. 2015. A new population of the Hooded Antpitta (*Grallaricula cucullata*: Grallariidae) for the Colombian Central Andes. Acta Biológica Colombiana 20: 229-232.
208. MÁRQUEZ, J. C. & M. LÓPEZ-VICTORIA. 2010. Aves marinas en las plataformas de explotación de gas de Chuchupa, Guajira, Colombia. Boletín SAO 20: 33-38.
209. MARTÍNEZ, F. J. C. & V. H. SERRANO-CARDOZO. 2017. First record of Scarlet-thighed Dacnis, *Dacnis venusta* (Lawrence, 1862) (Aves: Thraupidae) for the middle Magdalena valley of Santander, Colombia. Check List 13: 2124.
210. MARTINEZ, Y. G. M. 2014. Birds of the Totare River basin, Colombia. Check List 10: 269-286.
211. MARTÍNEZ-GÓMEZ, J., V. ROJAS-DÍAZ, C. A. SAAVEDRA-RODRÍGUEZ & P. FRANCO. 2013. Noteworthy records of the birds *Neomorphus radiolosus* Slater and Salvin, 1878 (Cuculiformes: Cuculidae), *Geotrygon frenata* (Tschudi, 1843) (Columbiformes: Columbidae) and *Odontophorus hyperythrus* Gould, 1858 (Galliformes: Odontophoridae) in the Western Cordillera of the Colombian Andes. Check List 9: 1584-1587.
212. MAZAR BARNETT, J., G. M. KIRWAN & J. TOBIAS. 1996. Neotropical notebook: Colombia. Cotinga 9: 91.
213. McNISH, T. 2003. Lista de chequeo de la fauna terrestre del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. M & B Producciones y Servicios Ltds, Bogotá.
214. MEDINA, W., D. C. MACANA GARCÍA & F. SÁNCHEZ. 2015. Aves y mamíferos de bosque altoandino-páramo en el páramo de Rabanal (Boyacá-Colombia). Ciencia en Desarrollo 6: 185-198.
215. MOLINA-MARTÍNEZ, Y., J. E. GARCÍA-MELO & S. LOSADA PRADO. 2015. Evaluación rápida de las aves de la parte baja de la cuenca del río Anamichú, Rio Blanco, Tolima. Revista Tumbaga 2: 72-93.
216. MONCADA-ÁLVAREZ, L. I. 2013. Registros nuevos o poco conocidos de aves migratorias en la laguna del Otún, Parque Nacional Natural Los Nevados, Risaralda, Colombia. Acta Biológica Colombiana 18: 191-198.
217. MORALES, G. & A. LEÓN. 2000. La avifauna asociada a un manglar: Golfo de Tortugas, Pacífico Colombiano. Boletín SAO 9: 20-21.
218. MORALES SÁNCHEZ, J. E. 1988. Confirmación de la presencia de *Spheniscus humboldti* Meyen (Aves: Spheniscidae) para Colombia. TRIANA (Act. Cient. Técn. INDERENA) 1: 141-143.
219. MORALES, G., L. CHASQUI-V. & A. LEÓN. 2003. Primer registro del Ibis Verde *Mesembribis cayennensis* (Aves: Threskiornithidae) para el Pacífico colombiano. Caldasia 25: 199-200.

220. MORENO, J. G., R. M. DE AYALA & L. G. NARANJO. 1999. Expansión del rango de la Paloma Coroniblanca *Columba leucocephala* al territorio continental de Colombia. *Caldasia* 21: 112-113.
221. MORENO-PALACIOS, M. & S. LOSADA-PRADO. 2016. Avifauna del complejo de páramos Chilí-Barragán (Tolima, Colombia). *Biota Colombiana* 17: 114-133.
222. MORENO-PALACIOS, M. & E. RODRÍGUEZ-ORTÍZ. 2008. Nuevo registro del Mochuelo Cabecigrís (*Glaucidium griseiceps*) en el valle medio del río Magdalena, Colombia. *Ornitología Colombiana* 6: 92-95.
223. MÚNERA, W. A. 2004. Nuevo registro del pato de torrentes (*Merganetta armata colombiana*) en Antioquia y comentarios sobre su distribución en el norte de la Cordillera Central. *Boletín SAO* 14: 21-24.
224. MURCIA-NOVA, M. & D. BELTRÁN-ALVARADO. 2009. Un nuevo registro del Loro Orejamarillo (*Ognorhynchus icterotis*. Psittacidae) en la Cordillera Oriental Colombiana. *Ornitología Colombiana* 8: 94-99.
225. MURILLO-PACHECO, J. I. & W. F. BONILLA-ROJAS. 2016. New records and distribution extensions of some bird species in the Colombian Andean-Orinoco, department of Meta. *Check List* 12: 1876.
226. MURILLO-PACHECO, J. I., W. F. BONILLA-ROJAS & J. C. DE LAS CASAS. 2013. Listado y anotaciones sobre la historia natural de las aves del litoral de San Andrés de Tumaco, Nariño (Colombia). *Biota Colombiana* 14: 273-287.
227. MURILLO-PACHECO, J. I., W. F. BONILLA-ROJAS & G. LÓPEZ-IBORRA. 2014. El Flamenco Americano (*Phoenicopterus ruber*) en la Orinoquia Colombiana: ¿Ampliación de Rango o introducción de especie? *Orinoquia* 18: 105-112.
228. NARANJO, L. G. 1991. Confirmación de la presencia de *Limnodromus scolopaceus* (Aves: Scolopacidae) en Colombia. *Trianea* 4: 559-561.
229. NARANJO, L. G. 2004. Presencia de la Corocora (*Eudocimus ruber*) en el valle del río Cauca, Occidente de Colombia. *Ornitología Colombiana* 2: 45-46.
230. NARANJO, L. G. 2010. Dos registros desapercibidos de aves marinas en Colombia. *Boletín SAO* 20: 39-41.
231. NARANJO, L. G. & F. A. ESTELA. 1999. Inventario de la avifauna de un área suburbana de Cali. *Boletín SAO* 10: 11-27.
232. NARANJO, L. G. & R. FRANKE-ANTE. 1995. Registros inusuales de gaviotas para el occidente colombiano. *Boletín SAO* 6: 13-15.
233. NEGRET, A. J. 1992. La avifauna del Valle del Patía. *Novedades Colombianas, Nueva Época* 5: 45-65.
234. NEGRET, A. J. 1989. Aves del Parque Nacional Natural Gorgona. *Novedades Colombianas, Nueva Época* 1: 29-42.
235. NEGRET, A. J. 1991. Reportes recientes en el Parque Nacional Munchique de aves consideradas raras o amenazadas de extinción. *Novedades Colombianas, Nueva Época* 3: 39-45.
236. NEGRET, A. J. 1994. Notas sobre los chorlitos migratorios en los alrededores de Popayán. *Boletín SAO* 10: 8-10.
237. NEGRET, A. J. 1995. El Vencejo Negro (*Cypseloides niger*): una nueva adición a la avifauna colombiana. *Caldasia* 18: 145-146.
238. NEGRET, A. J. 1997. Adiciones a la avifauna del Parque Nacional Natural Munchique, Cauca. *Novedades Colombianas* 7: 88.
239. NEGRET, A. J. 1997. Notas sobre la avifauna del suroccidente colombiano. *Novedades Colombianas* 7: 45-50.
240. NEGRET, A. J. & C. ACEVEDO. 1990. Reportes recientes de *Leptosittaca branickii*, ave colombiana amenazada de extinción. *Novedades Colombianas, Nueva Época* 2: 70-71.
241. NEGRET, A. J. & B. ORTIZ. 1989. Historia de la colonización del Gorrión Europeo (*Passer domesticus*) en América y los primeros ejemplares para Colombia. *Novedades Colombianas, Nueva Época* 1: 21-28.
242. NEWMAN, J. 1992. Birds in Amazon 1992 - Final Report. A Cambridge - RHBNC expedition to Colombia.
243. NEWMAN, J. 2008. Sight records of five bird species new to Colombia from Serranía de Naquén, dpto. Guainía. *Cotinga* 29: 160-161.
244. OCAMPO-PEÑUELA, N. & A. ETTER. 2013. Contribution of different forest types to the bird community of a savanna landscape in Colombia. *Ornitología Neotropical* 24: 35-53.
245. OCAMPO-TOBÓN, S. 2005. La Reinita Gorrinegra *Wilsonia pusilla* (Parulidae), nuevo registro para los Andes Colombianos. *Ornitología Colombiana* 3: 74-75.
246. OCHOA-QUINTERO, J. M., I. MELO-VÁSQUEZ, J. A. PALACIO-VIEIRA & A. M. PATIÑO. 2005. Nuevos registros y notas sobre la historia natural del Paujil colombiano *Crax alberti* al nororiente de la cordillera Central colombiana. *Ornitología Colombiana* 3: 42-50.
247. OLACIREGUI, C., A. QUEVEDO, F. GONZÁLEZ & L. F. BARRERA. 2016. Range extensions and noteworthy records of birds from the Serranía de Abibe, north-west Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 136: 243-262.
248. OLACIREGUI, C. & F. GUZMAN. 2011. First record of Rufous-breasted Wood-Quail *Odontophorus speciosus* for Colombia. *Conservación Colombiana* 15: 31-33.

249. OLARTE, L. G. 1997. Registros muy importantes en Medellín. Boletín SAO 8: 61.
250. O'NEILL, J. P., D. F. LANE & L. N. NAKA. 2011. A cryptic new species of thrush (Turdidae: *Turdus*) from western Amazonia. Condor 113: 869-880.
251. ORTIZ-VON HALLE, B. 1990. Adiciones a la avifauna de Colombia de especies arribadas a la Isla Gorgona. Caldasia 16: 209-214.
252. OSBORN, S. & C. OLSON. 2015. New record and known-range extension of Undulated Antpitta (*Grallaria squamigera*) in the Sierra Nevada de Santa Marta of Colombia. Boletín SAO 24: 9-12.
253. PARRA-HERNÁNDEZ, R. M., Y. TOLOSA & W. E. FIGUEROA. 2015. Nuevos registros y estado actual de las especies introducidas en Ibagué. Revista Tumbaga 1: 58-75.
254. PARRA-HERNÁNDEZ, R., D. CARANTÓN-AYALA, M. MORENO-PALACIOS & J. S. SANABRIA. 2008. Primer registro del Vencejo Cuatro Ojos (*Cypseloides cherriei*) para la Cordillera Central de los Andes (Colombia). Ornitología Colombiana 6: 66-68.
255. PEARMAN, M. 1993. Some range extensions and five species new to Colombia, with notes on some scarce or little known species. Bulletin of the British Ornithologists' Club 113: 66-75.
256. PEÑA, M. 1997. Ornitofauna presente en una zona de construcción carretera Florencia - Altamira. Interventora Integral S.A. Boletín SAO 8: 30-45.
257. PEÑA, M. & W. H. WEBER. 2000. Reencuentro del Saltarín Cabecidorado (*Chloropipo flavigapilla*) en Antioquia. Boletín SAO 11: 46-48.
258. PERAZA, C. A. 2011. Aves, Bosque Oriental de Bogotá Protective Forest Reserve, Bogotá, DC, Colombia. Check List 7: 057-063.
259. PERAZA, C., Y. CIFUENTES, Y. ALAYON & C. CLAVIJO. 2004. Adiciones a la avifauna de un cafetal con sombrío en la Mesa de Los Santos (Santander, Colombia). Universitas Scientiarum 9: 19-32.
260. PINEDA-GUERRERO, A., J. P. LÓPEZ-ORDÓÑEZ & P. CAMARGO-MARTÍNEZ. 2014. Migración y primer registro del Caracolero Selvático (*Chondrohierax uncinatus*) en la ciudad de Bogotá, Colombia. Spizaetus 18: 33-39.
261. PITMAN, R. K., L. B. SPEAR & D. G. AINLEY. 1995. The marine birds of Malpelo Island. Colonial Waterbirds 18: 113-119.
262. PITMAN, R. L. & J. R. JEHL, JR. 1998. Geographic variation and reassessment of species limits in the "Masked" Boobies of the Eastern Pacific Ocean. Wilson Bulletin 110: 155-170.
263. POLANCO, J. M., A. OSPINA DUQUE, D. ARANGO GIRALDO, J. SNAIDER GRANADA & O. H. MARÍN GÓMEZ. Efectividad de las redes de niebla para determinar la riqueza de aves en un bosque montano de los Andes centrales (Salento, Quindío, Colombia). Rev. Invest. Univ. Quindío 27: 75-88.
264. PULGARÍN, P. C. & W. A. MÚNERA. 2006. New bird records from Farallones de Citará, Colombian western Cordillera. Boletín SAO 16: 44-53.
265. PULGARÍN, P. C., N. J. BAYLY & T. ELLERY. 2015. New records of Chimney Swift (*Chaetura pelagica*) in Bogotá, Eastern Andes of Colombia. Boletín SAO 24: 1-3.
266. QUEVEDO, A. & J. C. LUNA. 2012. Dos nuevas especies de aves para Colombia en el departamento del Guainía. Conservación Colombiana 17: 26-27.
267. QUEVEDO, A. & B. LÓPEZ-LANÚS. 2002. Registro extralimital de *Sturnella magna* en Colombia: Tolima, Cordillera Central. Boletín SAO 13: 46-47.
268. RAMÍREZ, J. D. 2006. Redescubrimiento de *Grallaria rufocinerea* (Formicariidae) en el valle de Aburrá, Antioquia, Colombia. Boletín SAO 16: 17-23.
269. RAMÍREZ-GÓMEZ, O. & S. OCAMPO-TOBÓN. 2006. Nuevo registro del Vencejo Pierniblanco (*Aeronautes montivagus*) en el Valle del Cauca. Boletín SAO 16: 55-57.
270. REMSEN, J. V., JR. 2008. First specimens for Colombia of *Furnarius torridus* (Furnariidae) and *Myrmotherula assimilis* (Thamnophilidae). Ornitología Colombiana 6: 89-81.
271. RENJIFO, L. M. 1991. Discovery of the Masked Saltator in Colombia, with notes on its ecology and behavior. Wilson Bulletin 103: 685-690.
272. RENJIFO, L. M. 1991. First record of the Bay-vented Cotinga *Doliornis sclateri* in Colombia. Bulletin of the British Ornithologists' Club 114: 101-103.
273. RENJIFO, L. M., A. REPIZO, J. M. RUIZ-OVALLE, S. OCAMPO, S. & J. E. AVENDAÑO. 2017. New bird distributional data from Cerro Tacarcuna, with implications for conservation in the Darién highlands of Colombia. Bulletin of the British Ornithologists' Club 137: 46-66.
274. RESTREPO-CARDONA, J. S., L. VARGAS MARÍN & H. D. RODRÍGUEZ LASSO. Nuevos registros del poco conocido Azor

- Collarejo *Accipiter collaris* en Colombia. *Cotinga* 38: 36-37.
275. REYES, J. 2003. Primer registro de anidación del Gaviotín o Charrancito Americano *Sterna antillarum* en el Caribe colombiano. *Ornitología Colombiana* 1: 66-67.
276. RIDGELY, R. S. & G. TUDOR. 1989. *The Birds of South America. Volume 1: The Oscine Passerines*. University of Texas Press, Austin, USA.
277. RIDGELY, R. S. & G. TUDOR. 1994. *The Birds of South America. Volume 2: The Suboscine Passerines*. University of Texas Press, Austin, USA.
278. RIVERA-PEDROZA, L. & M. P. RAMÍREZ. 2005. Una extensión de la distribución del Tororoi Medialuna *Grallaria llineifrons* (Formicariidae) en Colombia. *Ornitología Colombiana* 3: 81-83.
279. ROBBINS, M. B., T. A. PARKER, & S. A. ALLEN. 1985. The avifauna of Cerro Pirre, Darién, Panamá. Págs. 198-232 en P. A. Buckley, M. S. Foster, E. S. Morton, R. S. Ridgely & F. G. Buckley (eds.) *Neotropical ornithology. Ornithological Monographs* 36.
280. ROBBINS, M. B. & F. G. STILES. 1999. A new species of Pymy-Owl (Strigidae: *Glaucidium*) from the Pacific slope of the northern Andes. *Auk* 116: 305-315.
281. ROBBINS, M. B. & R. S. RIDGELY. 1992. Taxonomy and natural history of *Nyctiphrynus rosenbergi* (Caprimulgidae). *Condor* 94: 984-987.
282. ROJAS-R, R., W. PIRAGUA-A, F. G. STILES & T. McNISH. 1997. Primeros registros para Colombia de cuatro taxones de la familia Tyrannidae (Aves: Passeriformes). *Caldasia* 19: 523-525.
283. ROSELLI, L., S. DE LA ZERDA & J. CANDIL. 2017. Cambios en la avifauna de un relictto de bosque en la franja periurbana de Bogotá a lo largo de catorce años. *Acta Biológica Colombiana* 22: 181-190.
284. ROSELLI, L., F. G. STILES & P. A. CAMARGO. 2017. Changes in the avifauna in a high Andean cloud forest in Colombia over a 24-year period. *Journal of Field Ornithology* (early view).
285. ROWLAND, F. & B. MASTER. 2011. First published record of Scissor-tailed Flycatcher *Tyrannus forficatus* for Colombia and South America. *Conservación Colombiana* 15: 44.
286. ROWLAND, F. & B. MASTER. 2012. New records of Forster's Tern *Sterna forsteri* for Colombia. *Colombiana* 17: 28-30.
287. RUEDA, M. 2015. Un registro confirmado de *Picumnus exilis* para Colombia. *Conservación Colombiana* 23: 49.
288. RUIZ-GUERRA, C. 2012. Occurrence of Red Knot and Marbled Godwit in Colombia. *Wader Study Group Bull.* 118: 194-195.
289. RUIZ-GUERRA, C. 2012. El Chorlito nival (*Charadrius nivosus*), el Chorlo de los rompientes (*Aphriza virgata*), el Falaropo tricolor (*Phalaropus tricolor*) y la Cigüeña (*Himantopus mexicanus*) en las costas colombianas. *Boletín SAO* 21: 19-26.
290. RUIZ-GUERRA, C. & Y. CIFUENTES-SARMIENTO. 2011. Primer registro del Petrel de Cory (*Calonectris diomedea*) para Colombia. *Ornitología Colombiana* 10: 65-68.
291. RUIZ-GUERRA, C., D. EUSSE-GONZÁLEZ, C. ARANGO, L. MIRANDA & Y. A. BELTRÁN. 2013. Spring status of Buff-breasted Sandpipers in Colombia. *Wader Study Group Bulletin* 120: 202.
292. RUIZ-GUERRA, C., R. JOHNSTON-GONZÁLES, Y. CIFUENTES-SARMIENTO, F. A. ESTELA, L. F. CASTILLO, C. E. HERNÁNDEZ & L. G. NARANJO. 2007. Noteworthy bird records from the southern Chocó of Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 127: 283-293.
293. RUIZ-OVALLE, J. M. 2005. El Carpinterito Castaño (*Picumnus cinnamomeus*) en el bosque de manglar del antiguo delta del río Sinú, departamento de Córdoba, noroeste de Colombia. *Boletín SAO* 15: 112-115.
294. RUIZ-OVALLE, J. M. & S. CHAPARRO-HERRERA. 2016. Nuevas localidades para el Tachurí barbado (*Polystictus pectoralis*) en la Orinoquía Colombiana. *Ornitología Colombiana* 15: 111-116.
295. RUIZ-OVALLE, J. M. & A. HURTADO-GUERRA. 2014. Primeros registros de *Bangsia arcae* y *Chrysothlypis chrysomelas* (Thraupidae) para Colombia. *Ornitología Colombiana* 14: 130-135.
296. SAÉN-JIMÉNEZ, F., F. CIRI-LEÓN, J. PAREDES-GÓMEZ & S. ZULUAGA. 2014. Registros recientes de Cóndor andino (*Vultur gryphus*) en los Andes nororientales colombianos. ¿Evidencia de su recuperación en el país? *Spizaetus* 17: 19-23.
297. SALAMAN, P. 1995. The rediscovery of the Tumaco Seedeater *Sporophila insulata*. *Cotinga* 4: 33-35.
298. SALAMAN, P. G. W., N. BAYLY, R. BURRIDGE, M. GRANTHAM, M. GURNEY, A. QUEVEDO, L. E. UREÑA & T. M. DONEGAN. 2008. Sixteen bird species new for Colombia. *Conservación Colombiana* 5: 80-85.
299. SALAMAN, P. G. W., P. COOPMANS, T. M. DONEGAN, M. MULLIGAN, A. CORTÉS, S. L. HILTY & L. A. ORTEGA. 2003. A new species of Wood-Wren (Troglodytidae: *Henicorhina*) from the Western Andes of Colombia. *Ornitología Colombiana* 1: 4-21.

300. SALAMAN, P. G. W., L. M. DÁVALOS & G. M. KIRWAN. 1998. The first breeding records of White-rimmed Brush-finches, *Atlapetes leucopis*, with ecological notes. *Cotinga* 9: 24-26.
301. SALAMAN, P. G. W., T. M. DONEGAN & A. M. CUERVO. 2002. New distributional bird records from Serranía de San Lucas and adjacent Central Cordillera of Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 122: 285-303.
302. SALAMAN, P. G. W., T. M. DONEGAN, D. DAVISON & J. M. OCHOA. 2007. Birds of Serranía de los Churumbelos, their conservation and elevational distribution. *Conservación Colombiana* 3: 29-58.
303. SALAMAN, P. G. W., T. M. DONEGAN & R. PRÝS-JONES. 2009. A new subspecies of Brown-banded Antpitta *Grallaria milleri* from Antioquia, Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 129: 5-17.
304. SALAMAN, P. G. W., & L. MAZARIEGOS-HURTADO. 1998. The hummingbirds of Nariño, Colombia. *Cotinga* 10: 30-36.
305. SALAMAN, P. G. W. & F. G. STILES. 1996. A distinctive new species of vireo (Passeriformes: Vireonidae) from the Western Andes of Colombia. *Ibis* 138: 610-619.
306. SALAMAN, P. G. W., F. G. STILES, C. I. BOHÓRQUEZ, M. ÁLVAREZ-R, A. M. UMAÑA, T. M. DONEGAN & A. M. CUERVO. 2002. New and noteworthy bird records from the east slope of the Andes of Colombia. *Caldasia* 24: 157-189.
307. SCHUCHMANN, K. L. 1978. Notes on the Rufous-capped Thornbill *Chalcostigma ruficeps*, a new hummingbird species for Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, 98, 115-116.
308. SCHULENBERG, T. S. & T. A. PARKER III. 1997. A new species of tyrant-flycatcher (Tyrannidae: *Tolmomyias*) from the western Amazon basin. *Ornithological Monographs* 48: 723-732.
309. SERNA, M. A. 1990. Algunas aves observadas en la ciénaga de Ayapel, Córdoba. *Boletín SAO* 1: 2-21.
310. SERNA, M. A. 1990. Novedades sobre aves de Medellín. *Boletín SAO* 1: 37-38.
311. SERNA, M. A. 1992. Notas sobre algunas especies de aves de Colombia, algunas de ellas potencialmente amenazadas. *Boletín SAO* 5: 9-23.
312. SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD DE COLOMBIA [SiB-COLOMBIA]. 2013. Available from: <http://www.sibcolombia.net/web/sib/>
313. SMITH, P. W. & S. A. SMITH. 1989. The Bahama Swallow *Tachycineta cyaneoviridis*, a summary. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 109: 170-180.
314. SPEAR, L. B. & D. G. AINLEY. 1999. Seabirds of the Panama Bight. *Waterbirds* 22: 175-198.
315. STILES, F. G. 1992. A new species of Antpitta (Formicariidae: *Grallaria*) from the Eastern Andes of Colombia. *Wilson Bulletin* 104: 389-399.
316. STILES, F. G. 1996. A new species of Emerald hummingbird (Trochilidae, *Chlorostilbon*) from the Sierra de Chiribiquete, southeastern Colombia, with a review of the *C. mellisugus* complex. *Wilson Journal of Ornithology* 108: 1-27.
317. STILES, F. G. 1998. Notes on the biology of two threatened species of *Bangsia* tanagers in northwestern Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 118: 25-31.
318. STILES, F. G. 2001. Primer registro del Porrón Collarejo *Aythya collaris* (Anatidae) y de la anidación del Ibis Morito *Plegadis falcinellus* (Threskiornithidae) en el Caribe colombiano. *Caldasia* 23: 559-561.
319. STILES, F. G. 2003. Notas taxonómicas sobre aves colombianas I: el rango taxonómico de *Hylocharis humboldtii* (Trochilidae). *Ornitología Colombiana* 1: 68-70.
320. STILES, F. G. 2004. The Tumaco Seedeater (*Sporophila insulata*, Emberizidae): a species that never was? *Ornitología Neotropical* 15: 17-30.
321. STILES, F. G. 2005. El Trepatroncos de Zimmer *Xyphorhynchus kienerii* (Dendrocolaptidae) en la Amazonía colombiana. *Ornitología Colombiana* 3: 104-106.
322. STILES, F. G. 2010. La avifauna de la parte media del Río Apaporis, departamentos de Vaupés y Amazonas, Colombia. *Revista Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* 132: 381-390.
323. STILES, F. G. 2017. Avifauna de Tumaco y alrededores, Nariño, Colombia. En preparación.
324. STILES, F. G & J. BECKERS. 2015. Un inventario de las aves de la región de Inírida, Guainía, Colombia. *Ornitología Colombiana* 15: 21-52.
325. STILES, F. G. & C. I. BOHÓRQUEZ. 2000. Evaluando el estado de la Biodiversidad: el caso de la avifauna de la Serranía de las Quinchas, Boyacá, Colombia. *Caldasia* 22: 61-92.
326. STILES, F. G. & H. ÁLVAREZ-LÓPEZ. 1995. La situación del Tororoi Pechicanelo [*Grallaria haplonota*, Formicariidae] en Colombia. *Caldasia* 17: 607-610.
327. STILES, F. G., N. K. KRABBE & T. S. SCHULENBERG. 2006. Species limits in the genus *Urosticte* (Trochilidae). *Ornitología Colombiana* 4: 59-63.
328. STILES, F. G., O. A. LAVERDE & C. D. CADENA. 2017. A new species of tapaculo Rhinocryptidae; (*Scytalopus*) from the Western Andes of Colombia. *The Auk* 134: 377-392.

329. STILES, F. G. & A. J. NEGRET. 1994. The nonbreeding distribution of the Black Swift: a clue from Colombia and unsolved problems. *Condor* 96: 1091-1094.
330. STILES, F. G., L. ROSELLI & C. I. BOHÓRQUEZ. 1999. New and noteworthy records of birds from the middle Magdalena valley of Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 119: 113-129.
331. STILES, F. G., L. ROSELLI & S. DE LA ZERDA. 2017. Changes over 26 years in the avifauna of the Bogotá region, Colombia: has climate change become important? *Frontiers in Ecology and Evolution* 5:58.
332. STILES, F. G., J. L. TELLERÍA & M. DÍAZ. 1995. Observaciones sobre la composición, ecología y zoogeografía de la avifauna de la Sierra de Chiribiquete, Caquetá, Colombia. *Caldasia* 17: 481-500.
333. STOTZ, D. F. 1990. First specimens of *Drymophila devillei* from Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 110: 37-38.
334. STREWE, R. 1999. Notes on the rediscovery of the Baudó Oropendola *Psarocolius cassini* in Chocó, Colombia. *Cotinga* 12: 40-43.
335. STREWE, R. 2000. New distributional sightings of 28 species of birds from Dpto. Nariño, SW Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 120: 189-195.
336. STREWE, R. 2001a. First record of the Rufous-headed Chachalaca for Colombia. *Cotinga* 15: 63.
337. STREWE, R. 2001b. Segundo registro de *Buteo jamaicensis* para Colombia. *Boletín SAO* 12: 80-81.
338. STREWE, R. 2002. Primeros informes de anidación con notas ecológicas de *Capito quinticolor* y *C. squamatus* (Aves: Capitonidae) del Pacífico colombiano. *Caldasia* 24: 221-224.
339. STREWE, R. 2004. Notas sobre una colonia de anidación del Vencejo pierniblanco (*Aeronautus montivagus*) en la Serranía de Perijá. *Boletín SAO* 14: 2-4.
340. STREWE, R. 2006. Primer registro de la Golondrina de Bahamas *Tachycineta cyaneoviridis* para Suramérica. *Boletín SAO* 16: 54-58.
341. STREWE, R. & S. KREFT. 1999. First records of Masked Mountain-Tanager (*Butyrupis wetmorei*) and Black-backed Bush-Tanager (*Urothraupis stolzmanni*) (Thraupinae) for Nariño, southwestern Colombia. *Ornitología Neotropical* 10: 111-113.
342. STREWE, R. & C. NAVARRO. 2003. New distributional records and conservation importance of the San Salvador valley, Sierra Nevada de Santa Marta, northern Colombia. *Ornitología Colombiana* 1: 29-41.
343. STREWE, R. & C. NAVARRO. 2004. New and noteworthy records of birds from the Sierra Nevada de Santa Marta region, north-eastern Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 124: 38-51.
344. STREWE, R., C. NAVARRO & J. BELTRÁN. 2008. Primer registro de la Gaviota Cabecigrís (*Chroicocephalus cirrocephalus*) para la región del Caribe y Colombia. *Ornitología Colombiana* 7: 75-77.
345. STREWE, R., C. VILLA-DE LEÓN, G. LOBATÓN, A. MORALES ROZO & F. AYERBE QUIÑONES. 2006. Ampliación del rango de distribución del chango llanero *Quiscalus lugubris* (Icteridae) en Colombia. *Revista Intropica* 3: 109-112.
346. STREWE, R., C. VILLA-DE LEÓN, C. NAVARRO, J. ALZATE & G. UTRÍA. 2016. Primer registro documentado de la Torcaza aliblanca (*Zenaida asiatica*) en América del Sur. *Ornitología Colombiana* 15: 90-93.
347. SUÁREZ-SANABRIA, N. & C. D. CADENA. 2014. Diversidad y estructura de la avifauna del Valle de Lagunillas, Parque Nacional Natural El Cocuy, Colombia. *Ornitología Colombiana* 14: 48-61.
348. TORO, J. L. & P. FLÓREZ. 2001. Una nueva población de Loro Orejiamarillo (*Ognorhynchus icterotis*) en los Andes de Colombia. *Boletín SAO* 12: 46-51.
349. TOVAR-MARTÍNEZ, A. E. 2010. Redescubrimiento y notas sobre la ecología y vocalizaciones del Periquito de Todd (*Pyrrhura picta cæruleiceps*) en el nororiente de Colombia. *Ornitología Colombiana* 9: 48-55.
350. TRONCOSO, F., P. A. J. VAN DER WOLF & J. A. AHUMADA. 1995. The Lilac-Tailed Parrotlet (*Touit batavica*), a new record for Colombia. *Caldasia* 18: 147-148.
351. URIBE, D. 2011. Confirmada la presencia del Tororoi media luna en el departamento de Caldas. *Merganetta* 48.
352. VAN LEEUWEN, M. & C. HOOGLAND. 2004. The first Pale-winged Trumpeter *Psophia leucoptera* in Colombia. *Cotinga* 21: 76-77.
353. VAN OOSTEN, H. & O. CORTES. 2009. First record of Munchique Wood-Wren *Henicorhina negreti* in dpto. Chocó, Colombia. *Cotinga* 31: 64.
354. VERHELST, J. C., J. E. BOTERO, Ó. ORREGO & D. FAJARDO. 2002. El Carpinterito Punteado, *Picumnus granadensis*, en las regiones cafeteras de Colombia. *Caldasia* 24: 201-208.
355. WARD-BOLIVAR, V. & J. LASSO-ZAPATA. 2012. Primeros registros del Pato Serrucho Pechicastaño (*Mergus serrator*) para las islas de Providencia y San Andrés, Caribe Colombiano. *Ornitología Colombiana* 12: 47-50.

356. WILLIAMS, R. 2016. Neotropical Notebook. *Neotropical Birding* 18: 45-52.
357. WILLIS, E. O. 1988. Behavioral notes, breeding records, and range extensions for Colombian birds. *Revista Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* 16: 137-150.
358. WOODS, S., F. ORTIZ-CRESPO & P. M. RAMSAY. 1998. Prescence of Giant Hummingbird *Patagona gigas* and Ecuadorian Hillstar *Oreotrochilus chimborazo jamesoni* at the Ecuador-Colombia border. *Cotinga* 10: 37-40.
359. ZULUAGA-BONILLA, J. E. 2006. Registros de *Icterus icterus* y *Machetornis rixosa* en un pequeño humedal artificial de Tunja, Boyacá, Colombia. *Boletín SAO* 16: 64-69.
360. ZULUAGA-BONILLA, J. E. & D. C. MACANA-GARCÍA. 2016. La avifauna actual del lago de Tota, Boyacá, Colombia: área importante para la conservación de las aves. *Biota Colombiana* 17(2): 138-162.