

Una nueva localidad y observaciones ecológicas del “Batará del Inírida” (Thamnophilidae) del género *Thamnophilus* en el Guaviare, Colombia

A new locality and ecological observations of the “Unnamed Antshrike” (Thamnophilidae) of the genus *Thamnophilus* in Guaviare, Colombia

Santiago Vargas García ¹ & Mónica Castillo Aguilar ²

¹Fundación BMC Colombia. Bogotá, Colombia

²Grupo de investigación en biología (GRIB), Universidad el Bosque. Bogotá, Colombia

> svargas@bmccol.org

DOI: 10.59517/oc.e637

Recibido

2 de junio de 2025

Aceptado

10 de junio de 2026

Publicado

1 de octubre de 2026

ISSN 1794-0915

Citación

VARGAS GARCÍA, S. & M. CASTILLO AGUILAR. 2026. Una nueva localidad y observaciones ecológicas del “Batará del Inírida” (Thamnophilidae) del género *Thamnophilus* en el Guaviare, Colombia. *Ornitología Colombiana* 30:25-31

<https://doi.org/10.59517/oc.e637>



Resumen

En marzo del 2023 y en abril del 2024, registramos al “Batará del Inírida” (*Thamnophilus* sp.) en una nueva localidad en el municipio San José del Guaviare, extendiendo su distribución conocida más de 450 km al oeste sobre el cauce del río Guaviare. Se incluye la descripción del hábitat, comportamiento, vocalizaciones y dieta, información importante para evaluar el estado ecológico y de conservación de esta población.

Palabras clave: Amazonía, comportamiento, distribución, Guaviare, Thamnophilidae

Abstract

In March 2023 and April 2024, we recorded the “Unnamed Antshrike” (*Thamnophilus* sp.) in a new locality in the municipality of San José del Guaviare, extending its known distribution more than 450 km westward along the Guaviare River. We include descriptions of the habitat, behavior, vocalizations, and diet, important information for assessing the ecological and conservation status of this population.

Key words: Amazonia, behavior, distribution, Guaviare, Thamnophilidae

El “Batará del Inírida” consiste en una población distintiva y aparentemente residente del género *Thamnophilus* (familia Thamnophilidae) descubierta recientemente en el extremo nordeste de Colombia, principalmente en los alrededores de Puerto Inírida, departamento de Guainía. En términos generales, parece similar a la especie *Thamnophilus palliatus* (Chestnut-backed Antshrike) de Perú, Bolivia y el este y centro de Brasil, pero difiere llamativamente en el plumaje de la cabeza del macho: véase la ilustración del “unnamed Antshrike” en Hilty (2021). El “Batará del Inírida” fue registrado por primera vez en 2007 en las Selvas de Matavén, al sur del Vichada, y posteriormente observado por varios ornitólogos en el bajo Río Guaviare, en el departamento del Guainía cerca de Puerto Inírida. Se trata de una población aún poco estudiada, considerada por algunos autores como *Thamnophilus palliatus*, documentada mediante

fotografías, videos y grabaciones de audio en plataformas como eBird y Xeno-canto (Echeverry-Galvis *et al.* 2022). También existen dos especímenes, depositados en las colecciones científicas colombianas del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) y el Instituto Alexander von Humboldt (IAvH), relevantes para su determinación taxonómica.

El Batará dorsicastaño (*Thamnophilus palliatus*) tiene una distribución altamente disyuntiva, abarcando desde el centro y este de Perú hasta el norte de Bolivia y de manera estrecha, a través del centro y este de la Amazonía brasileña y en la Mata Atlántica al extremo oriente de Brasil (Zimmer & Isler 2020). Históricamente, esta especie fue considerada conoespecífica con el Lined Antshrike (*Thamnophilus tenuepunctatus*), el cual habita las estribaciones orientales de los Andes. Sin embargo, en el centro de

Perú ambas especies coexisten sin evidencia de integradación. Actualmente *T. palliatus* comprende cuatro subespecies, diferenciadas principalmente por la tonalidad de sus partes superiores; todas estas distribuidas a distancias desde 1600 hasta más de 2000 km de Inírida. Nuestro descubrimiento de una población en Guaviare reduce esta distancia mínima de separación a ca. 1400 km. Se requiere realizar un estudio taxonómico para poder determinar si esta población representa una especie o una subespecie nueva de *T. palliatus*, lo cual implica hacer comparaciones detalladas genéticas y de vocalizaciones entre las dos.

El 28 mar 2023, encontramos una nueva localidad de esta población del "Batará del Inírida" dentro del departamento del Guaviare, municipio de San José del Guaviare, vereda Caño Guarnizo, en las coordenadas 2°50,7' N, 72° 08, 4' O, ampliando así su distribución conocida a más de 450 km al oeste por el cauce del río Guaviare, en comparación con el registro más al oeste reportado previamente, a 20 km de Puerto Inírida, en las coordenadas 3°59,5' N, -68° 06.3' O (Imani *et al.* 2025), localidad de Caño Cacao, en el departamento del Vichada (Fig. 1). Volvemos a encontrar a la misma población el 09 de abr 2024. Adicionalmente, documentamos su hábitat, comportamiento, vocalizaciones y dieta, y capturamos un macho adulto en la zona transicional de arbustales densos, entre un bosque de várzea y matorrales destinados al uso ganadero (Fig. 2C). Dicho individuo fue recolectado y depositado en el Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque.

Las observaciones realizadas en ambos años, correspondiente a la temporada de transición entre la estación seca y la de lluvias, se registraron 4 individuos (3 machos y 1 hembra). Dos de estos machos se observaron durante 3 días en una zona de arbustales dispersos de uso ganadero que se encuentra en medio de un bosque de várzea donde predomina el yarumo (*Cecropia* sp.) (Fig. 2). Estos dos individuos se observaron siempre en compañía de una pareja de Batará barrado o Barred Antshrike (*Thamnophilus doliatus*) con los que se desplazaban entre arbustos en busca de alimento. Su actividad empezaba entre las 0550 - 0610h, con cantos del macho de *T. doliatus*,



Figura 1. Mapa de distribución del "Batará del Inírida" (*Thamnophilus* sp. nov.?). Los puntos negros representan las localidades confirmadas conocidas para esta población ubicadas en el departamento del Vichada (Cuenca del Matavén) y en el departamento del Guainía (Puerto Inírida a ambos lados del río Guaviare) y la estrella celeste representa la nueva localidad en el departamento del Guaviare (San José del Guaviare Vereda Caño Guarnizo).

seguidos por respuestas de la hembra, aproximadamente entre 0700 - 0715 h, los dos individuos de "Batará del Inírida" se unían con pequeños reclamos y cantos, a lo que el macho de *T. doliatus* respondía de forma agonística intentando alejarlos de la zona más elevada (Fig. 3B). Alrededor de las 0740 - 0800 h se observaba a la hembra de *T. doliatus*, movilizarse entre los arbustos en busca de invertebrados sobre las hojas y las ramas; los dos individuos del "Batará del Inírida" seguían a ésta, realizando pequeños saltos y vuelos cortos entre ramas horizontales capturando los insectos que eran espantados por la pareja de *T. doliatus*. Los otros dos individuos observados en abril de 2023 fueron una pareja que se escuchaba en el interior del bosque de




Figura 2. Hábitats donde fue registrado el "Batará del Inírida" (*Thamnophilus sp.nov.?*) en la vereda Caño Guarnizo en el departamento del Guaviare (A) Vista al borde de bosque de várzea hacia arbustales dispersos con predominancia de Yarumos (*Cecropia sp.*) (B) vista al interior del bosque de várzea (C) Zona transicional entre los bosques de várzea y los arbustales enmalezados de uso ganadero.

várzea en horas de la mañana de 0600 a 0730 am. El 29 mar 2020 a las 1637 h en el interior de bosque, en la zona más tupida, se logró grabar la vocalización del macho (<https://xeno-canto.org/934476>). El macho se movilizaba entre ramas horizontales expuestas desde las cuales vocalizaba, erizando la cresta, estirándose y realizando "movimientos tambaleantes" de lado a lado simultáneos a un movimiento con la cola abierta de adelante hacia atrás, mientras que la hembra realizaba movimientos cortos y sigilosos a no más de 1 m de altura (Fig. 4). Este comportamiento de "temblar" durante el canto es similar a lo documentado en *Thamnophilus doliatus* y otras especies de *Thamnophilus*, donde los individuos combinan señales acústicas con movimientos corporales evidentes, los cuales pueden tener funciones territoriales o de atracción de pareja (Kolloff & Mennill 2012). En una segunda ocasión, el 9 abr 2024 se volvió a registrar una pareja del Batará del Inírida, en un matorral denso al borde de un bosque de várzea a 500m al norte del punto donde fue recolectado el individuo en el 2023; esta pareja también se observó siguiendo otra pareja de *T. doliatus*, en una bandada mixta en la cual también estaban 2 individuos de *Ramphocelus carbo*, 1 *Synallaxis albescens* y 1 *Hemitriccus striaticollis*. Estos

patrones de comportamiento sugieren una interacción interespecífica compleja entre *T. doliatus* y el "Batará del Inírida" en el cual este último se beneficia indirectamente de la actividad de forrajeo del primero, aprovechando las presas que son espantadas durante su búsqueda activa en el follaje. Este tipo de asociación se ha descrito en otras especies de aves insectívoras como una estrategia de "flush-foraging" (Remsen & Robinson 1990), en la cual un individuo incrementa su eficiencia de captura siguiendo a otro que moviliza las presas potenciales. Sin embargo, la respuesta agonística del macho de *T. doliatus* frente a la proximidad de los individuos del "Batará del Inírida" sugiere que, aunque existe un beneficio trófico, también hay competencia por el uso del espacio o de recursos, particularmente en sitios de percha expuestos utilizados durante la vocalización. En conjunto, estas observaciones indican que la relación entre ambas especies podría oscilar entre facilitación y competencia, dependiendo del contexto comportamental y del microhábitat en el que ocurre la interacción.

Dentro de las observaciones realizadas en estos periodos de tiempo, el "Batará del Inírida" fue registrado forrajeando tanto en el dosel como en el



Figura 3. Individuos de "Batará del Inírida" registrados en la vereda Caño Guarnizo (A) Macho adulto capturado el 30 mar 2023 (B) Macho adulto observado sobre el dosel del borde de bosque de várzea sobre los yarumos (*Cecropia* sp.).

interior del sotobosque y estratos medios y bajos en los arbustales, empleando diversas estrategias de captura de presas. Este comportamiento puede sugerir cierto grado de flexibilidad en la selección del microhábitat de alimentación, también documentada en otros miembros de *Thamnophilidae* como el Black-crowned Antshrike (*Thamnophilus atrinucha*) en la cual se ha encontrado que la altura y movilidad en la búsqueda de alimento pueden variar dependiendo de la estructura del bosque y la disponibilidad de presas (De Zwaan & Roitberg 2016). Aunque no se tienen datos cuantitativos sobre la variabilidad del hábitat o la proporción de presas consumidas por el "Batará del Inírida", su presencia en diferentes estratos sugiere que podría presentar una estrategia de forrajeo similar, adaptándose a la estructura del bosque en su entorno. Además, se ha documentado que especies del género *Thamnophilus* como *T. doliatus* muestran una fuerte preferencia por desplazarse a través de corredores de vegetación densa, evitando áreas abiertas o fragmentadas (Gillies & St. Clair 2010). Aunque el "Batará del Inírida" ha sido registrado en áreas de vegetación continua, su selección de microhábitat, caracterizada por el uso de arbustales densos y bordes de bosque de várzea, podría indicar una estrategia similar de selección de hábitat, en la cual la conectividad y estructura del sotobosque juegan un papel clave en su movilidad y

comportamiento de forrajeo.

Las estrategias de forrajeo observadas en el "Batará del Inírida" se clasificaron en dos categorías y tres comportamientos distintos, basados en la tipología propuesta por Remsen & Robinson (1990). La primera categoría y el primer comportamiento corresponde a la maniobra de alcance ("reach"), donde el individuo posado en una percha horizontal o vertical extiende completamente el cuello y las patas para acceder a presas estáticas ubicadas en superficies cercanas, principalmente sobre hojas (Fig. 5B). Las otras dos estrategias se agrupan dentro de la categoría maniobras impulsadas por las piernas ("leaps" o brincos) que incluye saltos cortos mediante los cuales el ave se lanza al aire para capturar presas fuera de su alcance. Se observaron dos tipos de "leaps": saltos verticales, donde el individuo se impulsa brevemente hacia arriba para capturar presas y regresa a la misma percha (Fig. 5A), y saltos entre perchas, empleados para capturar presas estáticas sobre superficies cercanas o ahuyentadas por su propio movimiento o por otros miembros en bandadas mixtas (Fig. 5C). Estas estrategias han sido ampliamente documentadas en otros miembros de *Thamnophilidae*, cuando la caza activa de artrópodos en vegetación densa depende de la combinación de movimientos rápidos y exploración visual (Schulenberg 1983). Dentro de las




Figura 4. Canto del "Batará del Inírida" (*Thamnophilus* sp. nov.?) (A) Sonograma del canto grabado 29 mar 2023 (B) Ilustración del comportamiento del comportamiento realizado por el "Batará del Inírida" al momento de cantar.

presas que se observaron ser capturadas por los individuos del "Batará del Inírida" fueron saltamontes (Orthoptera: Locustidae), larvas e individuos adultos de polillas (Lepidoptera) y arañas (Araneae).

Esta nueva localidad y observaciones de esta población de "Batará del Inírida" en Guaviare resaltan la complejidad biogeográfica del oriente colombiano, lo que obliga a reconsiderar la distribución de muchas especies de la región. Los registros previos en el Vichada y Guainía indicaban una distribución restringida al extremo oriental del país, pero este nuevo registro exhibe una mayor distribución, principalmente por la cuenca del río Guaviare hacia el centro del país, y también recorta la distancia entre la población de Inírida hasta el registro más cercano de la subespecie *T. p. similis* a menos de 1400 km. Estudios recientes han destacado cómo las barreras biogeográficas, como grandes ríos o cambios en la estructura del hábitat, pueden influir en la divergencia de poblaciones de Thamnophilidae (Bolívar-Leguizamón *et al.* 2024). En el caso del "Batará del Inírida" esta ampliación a través del margen del río Guaviare, podría estar relacionada al carácter de "aguas blancas" por su origen andino y la alta carga de sedimentos, lo que genera aluviales dinámicos y relativamente más fértiles, que podría ofrecer mayor heterogeneidad del sotobosque más rico y con mayor disponibilidad de alimento, en contraste con ríos de "aguas negras", típicamente más pobres y con llanuras inundables de baja fertilidad (Suárez & Usma Oviedo 2014). Su aparente aislamiento de otras poblaciones

de *Thamnophilus palliatus* plantea interrogantes sobre su identidad taxonómica, como una especie o una subespecie diferenciada. De acuerdo con Bolívar-Leguizamón *et al.* (2024), la distribución circumamazónica de varias especies de Thamnophilidae ha estado moldeada por interacciones entre fluctuaciones climáticas y la presencia de corredores ecológicos que facilitan el flujo genético entre poblaciones, incluso a través de barreras geográficas como los Andes y grandes ríos. Algunos estudios indican que estas divergencias, en el caso de *T. palliatus* pueden haber sido más resultado de procesos de diferenciación ecológica, que de una especiación incompleta (Bolívar-Leguizamón *et al.* 2024). Esto sugiere que la variabilidad genética dentro del complejo *T. palliatus* podría no estar completamente delimitada por barreras físicas, sino también por factores como los gradientes ambientales y la especialización ecológica. Investigaciones en complejos de especies cercanas han mostrado que las diferencias en las vocalizaciones y los patrones de plumaje pueden ser clave para delimitar especies dentro del género (Isler *et al.* 2001).

La información presentada resalta los vacíos de conocimiento sobre la distribución, la historia natural, el hábitat y el estado de conservación de esta población de batarás. Junto con la reciente ampliación de las distribuciones conocidas de especies como *Hylopezus macularius*, *Myiopagis flavivertex* y *Herpsilochmus dugandi* en Guaviare (Ramírez *et al.* 2018a, 2018b), estos hallazgos evidencian la necesidad de continuar explorando la región para comprender mejor la biogeografía del oriente colombiano. Además, refuerzan la importancia de estudios integrales que combinen genética, bioacústica y ecología para esclarecer el estado taxonómico y ecológico de esta población del Batará del Inírida, así como de otras poblaciones aisladas en la Amazonía y la Orinoquía.

Agradecimientos

Agradecemos a la Junta de Acción Comunal de Caño Guarnizo por su hospitalidad y apoyo logístico en campo, a A. Dueñas-Santafé, D. Ramírez y a O. Barbosa-Trujillo por su acompañamiento en campo y




Figura 5. Ilustraciones comportamentales de las estrategias de forrajeo utilizadas por el "Batará del Inírida" (*Thamnophilus sp. nov.*) (A) Saltos verticales aterrizando en la misma percha, para capturar presas que pasan volando cerca (B) Alcanzada o "Reach", utilizada para capturar presas que se encuentran ubicadas en hojas o ramas cercanas (C) Saltos entre perchas, empleado para capturar presas ubicadas lo suficientemente lejos para no poder capturarlas con una "alcanzada" o que son ahuyentadas al moverse junto a las bandadas mixtas.

ayuda al momento de la preparación del espécimen en campo; y al programa de Biología Universidad el Bosque, a la Fundación BMC Colombia y al Programa Amazonía Mía, por la financiación y apoyo logístico durante el proyecto "Conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las veredas Damas del Nare, Nare y Caño Guarnizo, municipio de San José del Guaviare; a través del diseño e implementación del modelo de desarrollo sostenible basado en la gobernanza comunitaria, medios de vida y conservación" gracias al cual fue posible la toma de estos datos, a IdeaWILD por el apoyo con materiales cruciales para la toma de datos y por último agradecemos a los revisores por dedicar su tiempo y aportes finales al manuscrito.

Literatura citada

BOLÍVAR-LEGUIZAMÓN, S.D., F. BOCALINI, L.F. SILVEIRA & G.A. BRAVO. 2024. The role of biogeographical barriers on the

- historical dynamics of passerine birds with a circum-Amazonian distribution. *Ecology and Evolution* 14(3): e10860. <https://doi.org/10.1002/ece3.10860>
- DE ZWAAN, D. & B. ROITBERG. 2016. Variation in foraging strategy with forest age for the Black-crowned Antshrike (*Thamnophilus atrinucha*). *Ornithología Neotropical* 26(3): 265–282. <https://doi.org/10.58843/ornneo.v26i3.57>
- ECHVERRY-GALVIS, M.Á., O. ACEVEDO-CHARRY, J.E. AVENDAÑO, C. GÓMEZ, F.G. STILES, F.A. ESTELA & A.M. CUERVO. 2022. Lista oficial de las aves de Colombia 2022: adiciones, cambios taxonómicos y actualizaciones de estado. *Ornithología Colombiana* (22): 25–51. <https://doi.org/10.59517/oc.e548>
- GILLIES, C.S. & C.C. ST. CLAIR. 2010. Functional responses in habitat selection by tropical birds moving through fragmented forest. *Journal of Applied Ecology* 47(1): 182–190. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2009.01756.x>
- HILTY, S.L. 2021. *Birds of Colombia*. Lynx and Birdlife Field Guides. Lynx Editions, Barcelona.
- IMANI, J., C. AUDETTE, T. AUER, S. BARKER, J. BARRY, M. CHARNOKY, C. CROWLEY, J. CURTIS, I. DAVIES, C. DAVIS, R. DIAZ, A. FEINBERG, D. FINK, J. GANGER, J. GARRETT, J. GERBRACHT, C. HANKS, M. HAYES, W. HOCHACHKA, M. ILIFF, A. JORDAN, S. LIGOCKI, T. LONG, W. MORRIS, S. MORROW, L. OLDHAM, F.P. OBREGON, O. ROBINSON, A. RODEWALD, V. RUIZ-GUTIERREZ, M. SCHLOSS, A. SMITH, J. SMITH, A. STILLMAN, M. STOKOWSKI, M. STRIMAS-MACKEY,

- B. SULLIVAN, A. TEDESCHI, D. WEBER, H. WOLF & C. WOOD. 2025. EOD – eBird Observation Dataset. Cornell Lab of Ornithology. <https://doi.org/10.15468/AOMFNB>
- ISLER, M.L., P.R. ISLER, B.M. WHITNEY & B. WALKER. 2001. Species limits in antbirds: the *Thamnophilus punctatus* complex, continued. *The Condor* 103: 278–286. <https://doi.org/10.1093/condor/103.2.278>
- KOLOFF, J. & D.J. MENNILL. 2012. Vocal behaviour of Barred Antshrikes, a Neotropical duetting suboscine bird. *Journal of Ornithology* 154(1): 55–68. <https://doi.org/10.1007/s10336-012-0867-6>
- RAMÍREZ, W.A., C. ARREDONDO, R.C. LÓPEZ, A. LOPERA-SALAZAR & S. CHAPARRO-HERRERA. 2018a. Range extensions for Yellow-crowned *Elaenia Myiopagis flavivertex* and Dugand's Antwren *Herpsilochmus dugandi* in eastern Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 138(1): 6–10. <https://doi.org/10.25226/bboc.v138i1.2018.a2>
- RAMÍREZ, W.A., S. CHAPARRO-HERRERA, C. CARRILLO LÓPEZ, C. ARREDONDO & A. SUEA-BECERRA. 2018b. Ampliación del rango de distribución del Tororoi Carimanchado *Hylopezus macularius* en Colombia. *Cotinga* 40: 93–95.
- REMSEN, J.V. & S.K. ROBINSON. 1990. A classification scheme for foraging behavior of birds in terrestrial habitats. Páginas 144–160 en: M.L. Morrison, C.J. Ralph, J. Verner & J.R. Jehl Jr. (eds.). *Avian foraging: theory, methodology, and applications*. Cooper Ornithological Society, Studies in Avian Biology 13, Los Angeles.
- SCHULENBERG, T.S. 1983. Foraging behavior, eco-morphology, and systematics of some antshrikes (Formicariidae: Thamnomanes). *Wilson Bulletin* 95(4): 505–521.
- SUÁREZ, C.F. & J.S. USMA OVIEDO. 2014. Geografía de la Estrella Fluvial Inírida. Páginas 24–45 en: F. Trujillo, J.S. Usma Oviedo & C.A. Lasso (eds.). *Biodiversidad de la Estrella Fluvial Inírida*. WWF Colombia / Corporación Autónoma Regional del Norte de la Amazonía (CDA), Bogotá D.C.
- ZIMMER, K. & M.L. ISLER. 2020. Batará dorsicastaño (*Thamnophilus palliatus*), version 1.0. En: T.S. Schulenberg (ed.). *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY. <https://doi.org/10.2173/bow.chbant2.01>