

Primer registro de la Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) en los Andes colombianos

First record of the Kelp Gull (*Larus dominicanus*) in the colombian Andes

Yecsika Pachón Patiño ¹, Sofía Díaz Castelblanco ² & Loreta Rosselli ³

¹ Fundación Humedales. Bogotá, Colombia

² Universidad Pedagógica Nacional UPN. Bogotá, Colombia

³ Asociación Colombiana de Ornitología ACO. Bogotá, Colombia

<jpachon@fundacionhumedales.org

DOI: 10.59517/oc.e648

Recibido

3 de septiembre de 2025

Aceptado

24 de junio de 2026

Publicado

8 de octubre de 2026

ISSN 1794-0915

Citación

PACHÓN PATIÑO, Y., S. DÍAZ CASTELBLANCO & L. ROSSELLI. 2026. Primer registro de la Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) en los Andes colombianos. *Ornitología Colombiana* 30:32-37

<https://doi.org/10.59517/oc.e648>



Resumen

Presentamos el primer registro de la Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) en la cordillera Oriental de Colombia, en la laguna de Fúquene a 2540m. Este constituye el registro de mayor elevación y más septentrional en los Andes para la especie. La observación resalta el valor de la participación continua de la comunidad local en el monitoreo de la biodiversidad y la aparición continua de registros inusuales y poco documentados.

Palabras clave: humedales altoandinos, Laguna de Fúquene, Laridae, movimientos errantes

Abstract

We present the first record of the Kelp Gull (*Larus dominicanus*) in the Eastern Cordillera of Colombia, at Lake Fúquene at 2540m. This is the highest and northernmost record in the Andes for the species. This record highlights the value of continued participation of the local community in biodiversity monitoring and the continuous appearance of poorly documented unusual records.

Key words: Andean wetlands, Fuquene lake, Laridae, vagrant movements

La Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) es una especie de amplia distribución y de mayor abundancia en las zonas costeras del hemisferio sur incluyendo África, Madagascar, Australia, Nueva Zelanda y Suramérica. Como otros miembros de la familia es una especie adaptable a diferentes hábitats y tiene una dieta variada (BirdLife International 2018, Garrido 2018), con poblaciones residentes y otras migratorias. En América las colonias de anidación se extienden desde Tierra del Fuego hasta Río de Janeiro en el Atlántico y hasta Ecuador en el Pacífico (Yorio *et al.* 2016, Burger *et al.* 2024a) con desplazamientos hacia el norte en la época no reproductiva alcanzando América Central y Norteamérica de manera cada vez más frecuente (Burger *et al.* 2024a).

El primer registro documentado de esta especie en Colombia se llevó a cabo en marzo de 2013 en la costa Caribe (Fagan & MacMullan 2013), con registros adicionales documentados en la plataforma eBird en

la costa pacífica nariñense (Góngora-Fuenmayor 2014, Estela 2017) y el Caribe, en La Guajira y Atlántico (Maynard 2015, Anderson 2016, Padilla *et al.* 2017). El objetivo de esta nota es presentar un nuevo registro de la Gaviota cocinera *Larus dominicanus* en el norte de los Andes orientales de Colombia. La observación se hizo en la Laguna de Fúquene, ubicada entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El cuerpo de agua tiene un área de aproximadamente 3.260 ha, y una profundidad media de 2,5 m (JICA 2000). Se encuentra a 2.540 m y es uno de los ecosistemas acuáticos de alta montaña más importantes en los Andes del norte, al ser un "hotspot" local por su alta diversidad de flora y fauna (Pinilla-Vargas & Valderrama-Barco 2022). Desde el año 2003 se ha estudiado la avifauna de Fúquene de manera periódica con la participación de la comunidad, aficionados y expertos (Morales Roza *et al.* 2007, Fundación Humedales 2013, Rosselli *et al.* 2020), lo que da un número de especies de aves registradas en

la laguna de 147 entre residentes y migratorias (Gamba & Reyes 2024).

Las observaciones de *Larus dominicanus* fueron realizadas durante recorridos en embarcación con turistas entre el 20 y 26 feb 2025, además de un recorrido expreso para buscarla durante dos horas en la mañana del 24 de febrero. Se tomaron fotografías con un celular a una distancia aproximada de 15 m y con una cámara a una distancia de 7 m. Tan pronto se obtuvo el primer registro, autores y pescadores comenzaron a hacer seguimiento con binoculares, también desde tierra, hasta la primera semana de marzo, en diferentes momentos del día a una distancia aproximada de 200 m. Durante este período se registró la gaviota en cuatro ocasiones; juzgando por el aspecto, estado de muda y ubicación en el mismo sector de la Laguna, pensamos que se trató del mismo individuo. El primer registro fue el día 20 en un recorrido en lancha turística entre las 15:00 y 16:00. La gaviota estaba posada en un poste cercano al puerto de la laguna (N 05° 27.497' W 073° 45.756'). El segundo registro, fue hecho por lancheros de la comunidad el día 23 entre las 14:00 y 16:00 horas hacia el mismo sector. En el tercer registro (25 de febrero), el individuo nuevamente estaba sobre un poste en el espejo de agua (N 05°27.816' W 073° 45.948') (Fig. 1A y 1B). Finalmente, el cuarto registro fue hecho por un pescador el día 26 a las 16:00 aproximadamente, nuevamente en un poste en el interior del espejo de agua en otro sector cercano a El Peñón en el que se observó cerca de 20 minutos durante los cuales se mostró atento.

Confirmamos la identificación de la especie con las fotografías obtenidas consultando guías impresas (Harrison 1983, Sibley 2000, Ayerbe 2018) y con expertos reconocidos en el grupo (E. Soler, C. Jensen y A. Cama). El individuo observado es una gaviota de tamaño grande con relación a las otras especies de la familia Laridae registradas en la laguna, como la Gaviota reidora (*Leucophaeus atricilla*) y el charrán o gaviotín de pico grande (*Phaetusa simplex*). Además del tamaño, presenta caracteres diagnósticos como espalda oscura (Fig. 1A, 1B) borde blanco en las alas visible en vuelo (Fig. 1C, 1D), cola y cabeza blancas (Fig. 1B, 1D), una mancha blanca en la punta de las

alas (Fig. 1B, 1D), patas largas amarillentas y claras (1B), y una marca roja en el pico, largo y grueso, con un ángulo pronunciado en el gonio (Fig.1A, 1B, Sibley 2000). Otras especies similares con alguna probabilidad de estar en el área son *Larus fuscus* y *Larus belcheri* (Harrison 1983). *L. fuscus* es más pequeña y tiene el pico más delgado, mientras que *L. belcheri* también es de menor tamaño, difiere en el color del pico que tiene la punta roja y una mancha negra en el gonio, y tiene una banda negra en la cola (Harrison 1983, Burger *et al.* 2024b). El registro de *Larus dominicanus* aquí reportado, constituye un hallazgo relevante, dado que se trata de una especie típicamente costera y ampliamente distribuida en el sur del hemisferio (Burger & Gochfeld 1996), lo cual hace inusual su presencia a esta altitud BirdLife International (2026).

Tanto este registro, como la mayoría de los reportes al norte de Suramérica, ocurrieron entre enero y marzo, coincidiendo con el periodo post reproductivo de dispersión o invernación en zonas tropicales (Yorio *et al.* 2016, Burger *et al.* 2024a). Durante los primeros meses de 2025 según NASA (2025) se presentó una ola de calor en Suramérica que estuvo asociada a un sistema de alta presión sobre el Atlántico Sur, lo que provocó temperaturas máximas de hasta 40°C en algunas provincias del norte de Argentina. Estos eventos extremos forman parte de alteraciones climáticas que pueden afectar la distribución y rutas migratorias de diversas especies de animales, incluidas las aves migratorias (Shamoun-Baranes *et al.* 2017, Cohen *et al.* 2020, WWF Colombia 2024). De esta manera, la presencia de individuos fuera de su distribución habitual podría estar relacionada con cambios en las condiciones meteorológicas. De manera similar, Hernández *et al.* (2021) sugirieron que la presencia de individuos fuera de su distribución normal en Venezuela podría estar relacionada con la ocurrencia de tormentas recientes en la región, las cuales habrían actuado como un posible factor de desviación de rutas migratorias tradicionales. En este contexto, la ocurrencia del registro podría explicarse por una combinación de procesos de dispersión natural y/o posibles eventos de deriva asociados a condiciones climáticas, aunque no se cuenta con evidencia directa que permita vincularlo a un evento



Figura 1. Registros fotográficos de *Larus dominicanus* en la Laguna de Fúquene del 20 al 25 de febrero de 2025. Las diferentes imágenes evidencian caracteres clave para su identificación. Fotos: Wilmar Hair Rodríguez, Yecsika Pachón.

específico.

Se conocen pocos registros de esta especie en zonas andinas lejos de la costa al norte de Suramérica, el más cercano a nuestra área de estudio, con evidencia documentada, se reportó en el aeropuerto de Quito (Ecuador), a 2.400 m a 800 km de nuestro sitio de observación, en enero de 2017 (Jumbo 2017). Asimismo, se ha registrado la presencia de la especie a 2.200 m en la Laguna Maule, Chile (Garrido 2018). Este registro corresponde a la máxima altura registrada para la especie en el continente antes del caso que presentamos acá (Fig. 2).

La singularidad del registro aquí presentado se refleja también en la presencia de especies poco comunes de aves marinas y costeras en los Andes colombianos. Por ejemplo, en el lago de Tota se han reportado observaciones de Gaviota reidora (*Leucophaeus*

atricilla), incluyendo el registro de un individuo muerto en 2004 y un ejemplar perchedo en mayo de 2008, a lo que se suman nuevas observaciones en 2025 con 12 individuos en febrero y uno en junio (Zuluaga-Bonilla & Macana-García 2016, Zuluaga-Bonilla, J. com. pers.). De manera similar, hacia 2005 se reportó la presencia de un Pelicano pardo (*Pelecanus occidentalis*) en la laguna de Fúquene (Morales - Rozo *et al.* 2007), así como registros posteriores en el interior del país (Chaparro-Herrera *et al.* 2022). Asimismo, se han registrado otras gaviotas típicamente marino-costeras en el interior del país, como en el alto valle árido del río Magdalena en Huila (Padilla 2020), así como el primer registro de la Gaviota de Franklin (*Leucophaeus pipixcan*) en la cordillera Oriental (Bayly 2015), además de extensiones altitudinales y de distribución documentadas en Ecuador (Henry 2012). En conjunto, estos registros sugieren que los humedales




Figura 2. Izquierda: Mapa de distribución de *Larus dominicanus* en Suramérica. Derecha: Registros de ciencia participativa eBird en Colombia y Ecuador incluyendo nuevo registro en los Andes orientales (triángulos amarillos). Nuevo registro en la Laguna de Fúquene - departamento de Cundinamarca (círculo verde). Fuente: Burger et al. 2024a. Elaboración de los mapas: Alexi Cusva.

altoandinos pueden acoger especies de amplia distribución, aunque inusuales y poco publicados en este tipo de ambientes.

Con este registro, invitamos a la comunidad a conocer, analizar y documentar este tipo de ocurrencias atípicas en Colombia y en otras regiones del continente, con el fin de comprender mejor la dinámica de los migratorios australes, tanto en ambientes costeros como interiores. Se resalta también la importancia de la Laguna de Fúquene designada como AICA -Área Importante para la Conservación de las Aves- (Cifuentes-Sarmiento y Ruiz-Guerra 2022, BirdLife International 2026), y parte del Distrito Regional de Manejo Integrado Fúquene, Cucunubá y Palacio (CAR 2017) como un sitio estratégico para la observación de la avifauna andina.

Asimismo, consideramos que este hallazgo resalta la necesidad de evaluar el posible cambio en el estatus migratorio de la especie dentro de la lista oficial del Comité de Registros Ornitológicos de Colombia.

Agradecimientos

Extendemos nuestros agradecimientos para el desarrollo del manuscrito a Wilmar Rodríguez Pachón, Fredy Rodríguez Pachón y José Esaú Pachón Rodríguez por el acompañamiento en la embarcación, apoyo en la toma de Fotografías e información acerca de las zonas de ubicación de la gaviota. Jonathan Buitrago, Eduardo Soler, Cristian Jensen y Albert Cama ayudaron con la identificación de la gaviota. A Alexi Cusva por la elaboración de los mapas, y Eugenio Valderrama por los comentarios realizados al

documento. Agradecemos a los evaluadores anónimos que contribuyeron con la mejora de este manuscrito.

Literatura citada

- ANDERSON, D. 2016. eBird Checklist. <https://ebird.org/checklist/S28254990>. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accessed: June 5, 2026).
- AYERBE-QUIÑONES, F. 2018. Guía de aves de Colombia. Wildlife Conservation Society (WCS).
- BAYLY, N.J. 2015. Primer registro de la gaviota de Franklin (*Leucophaeus pipixcan*) en la cordillera Oriental de Colombia. Boletín SAO 24(1-2):13-14.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2018. Species factsheet: Kelp Gull *Larus dominicanus*. Downloaded from <https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/kelp-gull-larus-dominicanus> on 09/06/2026
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2026. Site factsheet: Complejo Lacustre de Fúquene, Cucunubá y Palacio. Downloaded from <https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/14404-fuquene-cucunuba-cifand-palacio-lake-complex> on 07/06/2026
- BURGER, J. & M. GOCHFELD. 1996. Family Laridae (Gulls). En J. del Hoyo, A. Elliott & J. Sargatal (Eds.), Handbook of the Birds of the World, Lynx Edicions 3: 572 – 623. Barcelona.
- BURGER, J., M. GOCHFELD, E. GARCÍA, G.M. KIRWAN, & V. PANTOJA-MAGGI. 2024a. Kelp Gull (*Larus dominicanus*), version 1.1. En J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, E. de Juana & F. Medrano (Eds.), Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology. <https://doi.org/10.2173/bow.kelgul.01.1>
- BURGER, J., M. GOCHFELD, G.M. KIRWAN & E. GARCIA. 2024b. Belcher's Gull (*Larus belcheri*), version 1.1. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, E. de Juana, and F. Medrano, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.belgul.01.1>
- CAR. 2017. Acuerdo N.º 018 de 11 de julio. Por medio del cual se declara Distrito Regional de Manejo Integrado Fúquene, Cucunubá y Palacio. Corporación Autónoma Regional (CAR). <https://www.car.gov.co/uploads/files/5f385b0c956a4.pdf>
- CIFUENTES-SARMIENTO, Y & C. RUIZ-GUERRA. 2022. Programa AICA en Colombia. Asociación Calidris. Santiago de Cali, Colombia.
- COHEN, J.M., D. FINK, B. ZUCKERBERG. 2020. Avian responses to extreme weather across functional traits and temporal scales. Global Change Biology 26: 4240-4250. <https://doi.org/10.1111/gcb.15133>
- CHAPARRO-HERRERA, S., D.A. LUCENA & W. RAMÍREZ. 2022. El Pelicano Pardo (*Pelecanus occidentalis*) en Colombia: Revisión de su presencia al interior del país. Boletín de la Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO) 31; 1-6.. <https://sao.org.co/publicaciones/el-pelicano-pardo-pelecanus-occidentalis-en-colombia-revision-de-su-presencia-al-interior-del-pais/>
- ESTELA, F. 2017. eBird Checklist. <https://ebird.org/checklist/S33776295>. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accessed: June 5, 2026).
- FAGAN, J. & M. MACMULLAN. 2013. First confirmed records of Kelp Gull *Larus dominicanus* and Dunlin *Calidris alpina* for Colombia. Conservación Colombiana 19: 39-41. <https://www.proaves.org/wp-content/uploads/2013/12/First-confirmed-records-of-Kelp-Gull-Larus-dominicanus-and-Dunlin-Calidris-alpina-for-Colombia.pdf>
- FUNDACIÓN HUMEDALES. 2013. Del páramo a la laguna. Conocimiento y gestión participativa de la biodiversidad asociada a humedales y el sistema hídrico de la cuenca del río y la Laguna de Fúquene. Convenio de Colaboración DHS No. 521141 Informe Final. 187 pp.
- GARRIDO, M. 2018. *Larus dominicanus*. Páginas 238-239. en: F. Medrano, R. Barros, H. V. Norambuena, R. Matus & F. Schmitt (eds.). Atlas de las aves nidificantes de Chile. Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, Santiago, Chile. Disponible en: https://estrategia-aves.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2023/03/Medrano_etal_2018_Atlas-de-las-aves-nidificantes-de-Chile.pdf
- GÓNGORA-FUENMAYOR, V. 2014. eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S38198086>. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accessed: June 5, 2026).
- HARRISON, P. 1983. Seabirds an identification guide. Croom Helm Ltd. Great Britain.
- HENRY, P.Y. 2012. Distributional and altitudinal range extensions for birds from Ecuador. Boletín SAO 20(2): 89 -106.
- HERNÁNDEZ, L., F.J. CONTRERAS, F.A. VELÁZQUEZ, V. SALAS & A.J. MORA. 2021. Primer registro de la Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) en Venezuela. Revista Venezolana de Ornitología 11(1):33-33. <https://digitalcommons.usf.edu/rvo/vol11/iss1/5>
- JICA. 2000. Estudio sobre el plan de mejoramiento ambiental regional para la cuenca de la laguna de Fúquene, CAR (Resumen ejecutivo). CTI Engineering Co. Ltd., Japón. Disponible en: https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/11572872_01.pdf
- JUMBO, D. 2017. eBird Checklist. <https://ebird.org/checklist/S33878662>. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accessed: June 5, 2026).
- MAYNARD, B. 2015. eBird Checklist. <https://ebird.org/checklist/S37704881>. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accessed: June 5, 2026).
- MORALES - ROZO A., G. ANDRADE & M.L. ROSAS. 2007. Aves Acuáticas en las lagunas de Fúquene, Cucunuba y Palacio. Inventario, estado actual e importancia para la conservación. Páginas 155-184 en: L. Franco Vidal y G. Andrade (eds). Fúquene, Cucunubá y Palacio. Conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de un ecosistema lagunar andino. Fundación Humedales e Instituto de Investigación y Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá D.C. Colombia.
- NASA. 2025. Ola de calor de verano en Sudamérica. Disponible en: <https://ciencia.nasa.gov/ciencias-terrestres/ola-de-calor-de-verano-en-sudamerica>
- PADILLA, O. 2020. Nuevos registros de avifauna en el alto valle árido del río Magdalena en Huila, Colombia.

- Intropica 15: 24-33. <https://doi.org/10.21676/23897864.3395>
- PADILLA, O., C. OLACIREGUI, M.T. PACHECO & P. SÁNCHEZ. 2017. Primer registro de la Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) para el departamento del Atlántico, Colombia. Boletín SAO 26(1-2): 5-8. https://sao.org.co/publicaciones/boletinsao/26_1n2/BS2017-02.pdf
- PINILLA-VARGAS, M. & M. VALDERRAMA-BARCO. 2022. Lake Fúquene, Cundinamarca, Colombia: ecological degradation and management mistakes in an Andean lake. Capítulo 4. Páginas 61-73 en: C. Baigún, P. Minotte & B. Lamizana (eds.), Wetlands and people at risk. IUCN, Gland, Suiza. Disponible en: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2022-042-En.pdf>
- ROSSELLI, L., J.C. RODRÍGUEZ-LINARES, H.D. BENÍTEZ-CASTAÑEDA, F.G. STILES, C.M. LÓPEZ, A.C. LÓPEZ, J. REYES, M.F. FORERO, N.L. GUTIÉRREZ, C.C. PUSEY & L.C. CORREA. 2020. Llamado urgente para la conservación de la laguna de Fúquene, clave para la preservación de las aves acuáticas del Altiplano Cundiboyacense. Revista Científica ITTPA 2(1):69-90.
- SHAMOUN-BARANES, J., F. LIECHTI & W.M.G. VANSTEELANT. 2017. Atmospheric conditions create freeways, detours and tailbacks for migrating birds. Journal of Comparative Physiology A 203:509-529
- SIBLEY, D.A. 2000. National Audubon Society The Sibley Guide to Birds. Chanticleer Press. Inc. New York.
- WWF COLOMBIA. 2024. Cambio climático y especies migratorias: una relación que puede cambiar nuestra biodiversidad. Disponible en: <https://www.wwf.org.co/?388990/peces-migratorios-y-sus-amenazas-en-el-mundo>
- YORIO, P., O.J. BRANCO, J. LENZI, G. LUNA-JORQUERA & C. ZAVALAGA. 2016. Distribución y tendencias de la Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*): poblaciones reproductoras costeras en América del Sur. Waterbirds 39(1):114-135. <https://doi.org/10.1675/063.039.sp103>
- ZULUAGA-BONILLA, J.E. & D.C. MACANA-GARCÍA. 2017. La avifauna actual del lago de Tota, Boyacá (Colombia): área importante para la conservación de las aves. Biota Colombiana 17(2):138-162. <https://doi.org/10.21068/C2016.v17n02a10>